

Deltentamen godkäntdelen, del 1

TMA043 Flervariabelanalys E2

2013-09-21 kl. 8:30-11:30

Examinator: Peter Hegarty , Matematiska vetenskaper, Chalmers

Telefonvakt: Matteo Molteni, telefon: 0703 088 304

Hjälpmaterial: bifogat formelblad, ordlistan från kurswebbsidan, ej räknedosa

Tentamen på kursen består av tre delar; del 1 och del 2 av godkäntdelen samt överbetygssdelen. Denna deltenta täcker endast den första av dessa tre delar. För godkänt på tentamen som helhet krävs antingen 25 poäng på godkäntdelens två delar sammanlagt, eller att båda delarna är godkända var för sig. För godkänt på del 1 krävs minst 10 poäng, för godkänt på del 2 krävs 13 poäng. Erhälلن poäng på någon av delarna får ersätta poäng på motsvarande del på senare tentamen tills kursen ges nästa läsår. För godkänt på kursen skall också Matlabmomentet vara godkänt. För betyg 4 eller 5 krävs dessutom 33 resp. 42 poäng sammanlagt på tentamens alla delar.

Lösningar läggs ut på kursens webbsida första vardagen efter tentamensdagen. Tentan rättas och bedöms anonymt. Resultat meddelas i samband med undervisningen senast tre veckor efter tentamenstillfället.

Godkäntdelen, del 1

se uppgift 1:abc och 2 på nästa blad

Lycka till!
Peter Hegarty

Formelblad för TMA043 och MVE085, 13/14

Trigonometri.

$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$$

$$\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$$

$$\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y))$$

$$\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y))$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}$$

Integralkatalog

$\int x^a dx$	=	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$, $a \neq -1$	$\int \frac{1}{x} dx$	=	$\ln x + C$
$\int \sin x dx$	=	$-\cos x + C$	$\int \cos x dx$	=	$\sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	=	$\tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	=	$-\cot x + C$
$\int e^x dx$	=	$e^x + C$	$\int a^x dx$	=	$\frac{a^x}{\ln a} + C$, $0 < a \neq 1$
$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx$	=	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$, $a \neq 0$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	=	$\ln f(x) + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{a-x^2}} dx$	=	$\arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + C$, $a > 0$	$\int \sqrt{a-x^2} dx$	=	$\frac{1}{2}x\sqrt{a-x^2} + \frac{a}{2} \arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + C$, $a > 0$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx$	=	$\ln x+\sqrt{x^2+a} + C$, $a \neq 0$	$\int \sqrt{x^2+a} dx$	=	$\frac{1}{2}(x\sqrt{x^2+a} + a \ln x+\sqrt{x^2+a}) + C$

Maclaurinutvecklingar

e^x	=	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	=	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$	=	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$
$\cos x$	=	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	=	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$
$(1+x)^\alpha$	=	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	=	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots$, $ x < 1$, $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k(k-1)\dots 1}$
$\ln(1+x)$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$	=	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$, $-1 < x \leq 1$
$\arctan x$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}$	=	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$, $ x \leq 1$

Övrigt

Masscentrum (x_T, y_T, z_T) för Ω ges av $x_T = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$, analogt för y_T, z_T . $\rho(x, y, z)$ är densiteten.

Anonym kod	TMA043 Flervariabelanalys E2 2013-09-21	sid.nummer	Poäng
------------	--	------------	-------

Godkäntdelen: del 1

1. Till nedanstående deluppgifter skall korta lösningar redovisas, samt svar anges, på anvisad plats (endast lösningar och svar på detta blad, och på anvisad plats, beaktas).

- (a) Visa att $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y$ endast har en kritisk punkt och bestäm dess karaktär. (2p)

Lösning:

Svar:

- (b) Uttryck $\frac{d^2}{ds^2}f(x, y)$, där $x = s^2$ och $y = 2s + 1$, i de partiella derivatorna till f . (3p)

Lösning:

Svar:

- (c) Beskriv/skissa banan givet av parametriseringen $\mathbf{r}(t) = (1 - t^2)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$. Antag att parametriseringen beskriver rörelsen hos en partikel. Vad är då partikelns fart i punkten $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. (3p)

Lösning:

Svar:

Till följande uppgift skall fullständig lösning redovisas på separat skrivpapper.
Motivera och förklara så väl du kan.

2. (a) Bestäm Jacobimatrisen $D\mathbf{F}(x, y)$ till den funktion från \mathbb{R}^2 till \mathbb{R}^3 som ges av $\mathbf{F}(x, y) = (x^2y, x \ln y, x + 2y)$. Beräkna speciellt $D\mathbf{F}(3, 1)$ och använd bl.a. denna matris för att bestämma ett approximativt värde på $\mathbf{F}(3.03, 0.99)$. (3p)
- (b) Bestäm Taylorpolynomet av grad 2 till funktionen $f(x, y) = x \ln y$ i punkten $(3, 1)$. (2p)
- (c) Använd Taylorpolynomet i deluppgift (b) för att bestämma en bättre approximation av funktionsvärdet $f(3.03, 0.99)$ än den som följer från deluppgift (a). (1p)