

# Symbolisk linjär algebra

## 1 Inledning

Vi har redan sett att verktygslådan SYMBOLIC MATH TOOLBOX i MATLAB kan utföra symbolisk matematik inom analys. Nu skall vi se på några exempel på symboliska beräkningar inom linjär algebra.

## 2 Linjära ekvationssystem

Vi löser det linjära ekvationssystemet  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  med

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Vi skriver in  $\mathbf{A}$  och  $\mathbf{b}$  med funktionen `sym` som gör att talen lagras som rationella tal.

```
>> A=sym([2 3; 5 4])  
A =  
[ 2, 3]  
[ 5, 4]
```

```
>> b=sym([8; 13])  
b =  
8  
13
```

Vi gör `rref` exakt med

```
>> rref([A b])  
ans =  
[ 1, 0, 1]  
[ 0, 1, 2]
```

och läser av lösningen

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vi kan också lösa exakt med backslash-kommandot (`\`)

```
>> x=A\b  
x =  
1  
2
```

Vi kontrollerar att ekvationssystemet är uppfyllt med

```
>> r=A*x-b
r =
  0
  0
```

Vi kan också ha ett helt symboliskt ekvationssystem  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  med

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

```
>> syms a b c d
>> A=[a b; c d]
A =
 [ a, b]
 [ c, d]
```

```
>> syms e f
>> b=[e; f]
b =
 e
 f
```

```
>> x=A\b
x =
 -(b*f - d*e)/(a*d - b*c)
 (a*f - c*e)/(a*d - b*c)
```

Notera att vi får division med noll om matrisen singular, dvs. om  $\det(\mathbf{A}) = 0$ .

```
>> det(A)
ans =
 a*d - b*c
```

Vi ser på residualen med

```
>> r=simplify(A*x-b)
r =
  0
  0
```

Här använde vi `simplify` för att få ett förenklat uttryck. Prova gärna `r=A*x-b` själva för att se hur det annars ser ut.

Vi kan beräkna inversen  $\mathbf{A}^{-1}$  av en matris  $\mathbf{A}$  enligt

```
>> A=sym([2 3; 5 4])
A =
 [ 2, 3]
 [ 5, 4]
```

```
>> B=inv(A)
B =
[ -4/7,  3/7]
[  5/7, -2/7]
```

```
>> A*B
ans =
[ 1, 0]
[ 0, 1]
```

Vi ser att  $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$  som förväntat. Kontrollera gärna att även  $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$ .

### 3 Nollrum och kolonnrum

Vi beräknar nollrummet  $\text{Nul}(\mathbf{A})$  och kolonnrummet  $\text{Col}(\mathbf{A})$  till en matris

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

```
>> A=sym([-3  6 -1  1 -7
          1 -2  2  3 -1
          2 -4  5  8 -4])
```

```
A =
[ -3,  6, -1,  1, -7]
[  1, -2,  2,  3, -1]
[  2, -4,  5,  8, -4]
```

```
>> N=null(A)
N =
[  2,  1, -3]
[  1,  0,  0]
[  0, -2,  2]
[  0,  1,  0]
[  0,  0,  1]
```

```
>> R=colspace(A)
R =
[  1,  0]
[  0,  1]
[ 1/5, 13/5]
```

Vi har alltså  $\text{Nul}(\mathbf{A}) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  där

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

och  $\text{Col}(\mathbf{A}) = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$  där

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 13 \end{bmatrix}$$

## 4 Egenvärdesproblem

Vi löser egenvärdesproblemet  $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$  med

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

```
>> A=sym([2 3 1; 5 4 6; 1 0 2])
```

```
A =  
[ 2, 3, 1]  
[ 5, 4, 6]  
[ 1, 0, 2]
```

```
>> [V,D]=eig(A)
```

```
V =  
[ 2 - 2*3^(1/2), 2*3^(1/2) + 2, -2]  
[ 5 - (8*3^(1/2))/3, (8*3^(1/2))/3 + 5, 1]  
[ 1, 1, 1]
```

```
D =  
[ 4 - 2*3^(1/2), 0, 0]  
[ 0, 2*3^(1/2) + 4, 0]  
[ 0, 0, 0]
```

Får alltså egenvärdena  $\lambda_{1,2} = 4 \pm 2\sqrt{3}$  och  $\lambda_3 = 0$  med motsvarande egenvektorer

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 + 2\sqrt{3} \\ 5 + \frac{9}{3}\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 - 2\sqrt{3} \\ 5 - \frac{9}{3}\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vi kan lösa det linjära systemet av ODE från ett exempel i laboration 2.

$$\begin{cases} \mathbf{u}' = \mathbf{A}\mathbf{u}, & t > 0 \\ \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

där

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 2.9 \\ 2.6 \end{bmatrix}$$

```

>> A=sym([4 -5; -2 1]);
>> [V,D]=eig(A)
V =
[ 1, -5/2]
[ 1,    1]

D =
[ -1, 0]
[  0, 6]

>> u0=sym([2.9; 2.6]);
>> c=V\u0
c =
 94/35
-3/35

>> syms t
>> u=c(1)*V(:,1)*exp(D(1,1)*t)+c(2)*V(:,2)*exp(D(2,2)*t)
u =
 94/(35*exp(t)) + (3*exp(6*t))/14
 94/(35*exp(t)) - (3*exp(6*t))/35

```

dvs. lösningsformeln

$$\mathbf{u}(t) = \frac{-3}{70} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \end{bmatrix} e^{6t} + \frac{188}{70} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$