

Tentamensskrivning i
Matematisk Analys i Flera Variabler, LMA017
26 oktober 2015, 14⁰⁰ – 18⁰⁰

1. Beräkna gränsvärdena

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2},$ (5p)

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4+y^4}{\ln(1+x^2+y^2)}.$ (2p)

2. (a) Beräkna krökningsradien för cykloiden

$\bar{r}(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t, 0).$ (5p)

(b) För vilket t är radien maximal? (2p)

3. Bestäm lokala extrempunkter samt terrasspunkter (sadelpunkter) för

$f(x, y) = x^3 + 6y^2 + 6xy.$ (6p)

4. Beräkna längden av kurvan $\bar{r}(t) = (t^3 - 3t, 3t^2), 1 \leq t \leq 2.$ (6p)

5. Beräkna dubbelintegralen

$$\iint_D \frac{x}{1+x^2+y^2} dx dy,$$

där D är cirkelsektorn $x^2 + y^2 < 1, -x < y < x.$ (6p)

6. Planet $x/2 + y/2 + z/9 = 1$ delar ellipsoiden $x^2/4 + y^2/4 + z^2/81 < 1$ i två delar. Bestäm volumen av den mindre delen. (7p)

7. Beräkna den följande kurvintegralen $\int_C 2xy dx + x^2 y^2 dy$ längst kurvan $C : x = 2\sqrt{1 - y^2/9}$ mellan punkterna $(0, -3)$ och $(0, 3).$ (6p)

8. Beräkna normalytintegralen av vektorfältet \bar{F} över ytan $S : \iint_S \bar{F} \bullet \bar{dS},$ där $\bar{F} = (x^2 y, y - xy^2, 3z), S : x^2 + y^2 + z^2 = 4, x > 0, y > 0, z > 0.$ (7p)

Betygsgränser: för 3 krävs 20p, för 4 krävs 60% av totala poängsumman, för 5 krävs 80%. Lycka till!

Lycka till

FORMELSAMLING I FLERVARIABELANALYS

Kurva i rummet på parameterform:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ eller med vektorb\u00e9t. } \quad \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad \begin{array}{l} \text{Speciellt} \\ \text{R\u00e4ta linjens ekvation:} \\ \text{(tangent och normal)} \end{array} \quad \begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t \\ z = z_0 + v_z t \end{cases}$$

Area under plan kurva p\u00e5 parameterform: $\int_{x_1}^{x_2} y \, dx = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \dot{x}(t) \, dt$.

Pol\u00e4r form $r = r(\theta)$ skrivs p\u00e5 parameterform: $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$

B\u00e5gl\u00e4ngd f\u00f6r kurva p\u00e5 parameterform: $L = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{\mathbf{r}}(t)| \, dt$, speciellt

i planet: $L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt$, eller $L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$

och i rummet: $L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \, dt$.

Tyngdpunkt f\u00f6r kurva i planet:

$$x_T = \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_2} x(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt, \quad y_T = \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt$$

Kr\u00f6kning f\u00f6r kurva: $K(t) = \frac{|\dot{\mathbf{r}}(t) \times \ddot{\mathbf{r}}(t)|}{|\dot{\mathbf{r}}(t)|^3}$,

speciellt i planet: $K(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$.

Kr\u00f6kningsradie: $R = \frac{1}{K}$

Torsion: $\tau = \frac{(\dot{\mathbf{r}}(t) \times \ddot{\mathbf{r}}(t)) \cdot \dddot{\mathbf{r}}(t)}{|\dot{\mathbf{r}}(t) \times \ddot{\mathbf{r}}(t)|^2}$

Approximationssatsen: $\underbrace{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}_{\Delta f \text{ differens}} \approx \underbrace{f'_x(x, y) \Delta x + f'_y(x, y) \Delta y}_{df \text{ differential}}$

Kedjeregeln: $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$, $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \text{och} \\ \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \text{och} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \end{array} \right.$$

Taylor's formel i två variabler:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(a, b) + f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b) + \\ & \frac{1}{2!} [f''_{xx}(a, b)(x - a)^2 + 2f''_{xy}(a, b)(x - a)(y - b) + f''_{yy}(a, b)(y - b)^2] + \\ & \frac{1}{3!} [f'''_{xxx}(a, b)(x - a)^3 + 3f'''_{xxy}(a, b)(x - a)^2(y - b) + \\ & 3f'''_{xyy}(a, b)(x - a)(y - b)^2 + f'''_{yyy}(a, b)(y - b)^3] + \dots \end{aligned}$$

Max.- , min.- och sadelpunkter:

$$f'_x(a, b) = f'_y(a, b) = 0, \quad D = \begin{vmatrix} f''_{xx}(a, b) & f''_{xy}(a, b) \\ f''_{yx}(a, b) & f''_{yy}(a, b) \end{vmatrix}$$

$$D > 0 \text{ och } \begin{cases} f''_{xx}(a, b) > 0 \Rightarrow (a, b) \text{ lok. minp.} \\ f''_{xx}(a, b) < 0 \Rightarrow (a, b) \text{ lok. maxp.} \end{cases}, \quad D < 0 \Rightarrow (a, b) \text{ sadelp.}$$

Lagranges multiplikatormetod:

$f(x, y)$ maximeras eller minimeras under bivillkoret $g(x, y) = 0$.

Bilda $H = f - \lambda g$ och lös ekv.syst. $H'_x = 0$, $H'_y = 0$ och $g = 0$.

Gradient: $\text{grad } f = (f'_x, f'_y, f'_z)$ **Riktungsderivata:** $f'_e = \mathbf{e} \cdot \text{grad } f(a, b, c)$

$$[-|\text{grad } f(a, b, c)| \leq f'_e \leq |\text{grad } f(a, b, c)|]$$

Nivåyta: $g(x, y, z) = z - f(x, y) = C$, **Normalvektor:** $\mathbf{n} = \text{grad } g$,

(Tangent-) planets ekvation: $n_x(x - x_0) + n_y(y - y_0) + n_z(z - z_0) = 0$.

Skivformeln: $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} [f(x)]^2 dx$ där x-axeln är rotationsaxel.

Guldins regel: Rotationsvolymen = Arean \cdot Tyngdpunktens väg .

Dubbelintegral, speciellt: $\iint_D dx dy = A_D$.

Variabelsubstitution: $dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$.

Speciellt polära koordinater: $\begin{cases} x = r \cos v \\ y = r \sin v \end{cases}$, $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy = r dr dv$.

Geometriskt moment med avseende på linjen $x = a$ resp. $y = b$:

$M_y = \iint_D (x - a) dx dy$ resp. $M_x = \iint_D (y - b) dx dy$.

Tyngdpunkt för yta i planet: $x_T = \frac{1}{A_D} \iint_D x dx dy$, $y_T = \frac{1}{A_D} \iint_D y dx dy$.

Tröghetsmoment med avseende på linjen $x = a$ resp. $y = b$:

$I_y = \iint_D (x - a)^2 dx dy$ resp. $I_x = \iint_D (y - b)^2 dx dy$.

Polärt tröghetsmoment med avseende på punkten (a, b) :

$I_\theta = \iint_D [(x - a)^2 + (y - b)^2] dx dy = I_y + I_x$.

Trippelintegral, speciellt: $\iiint_D dx dy dz = V_D$.

Variabelsubstitution, speciellt sfäriska (rymdpolära) koordinater:

$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos v \\ y = r \sin \theta \sin v \\ z = r \cos \theta \end{cases}$, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, $dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta dv$.

och cylinderkoordinater:

$\begin{cases} x = r \cos v \\ y = r \sin v \\ z = w \end{cases}$, $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy dz = r dr dv dw$.

Tyngdpunkt för kropp i rummet:

$$x_T = \frac{1}{V_D} \iiint_D x \, dx \, dy \, dz, \quad y_T = \frac{1}{V_D} \iiint_D y \, dx \, dy \, dz, \quad z_T = \frac{1}{V_D} \iiint_D z \, dx \, dy \, dz.$$

Kurvintegral: $W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P \, dx + Q \, dy$.

Greens formel: $\int_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D (Q'_x - P'_y) \, dx \, dy$.

där C är sluten, ett varv moturs, runt D .

$\mathbf{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ gradientfält om potentialfunktion $\Phi(x,y)$:

$$\mathbf{F} = (P, Q) = (\Phi'_x, \Phi'_y) = \text{grad } \Phi.$$

Exakt differentialform: $d\Phi = \Phi'_x \, dx + \Phi'_y \, dy = P \, dx + Q \, dy$.

Då gäller: $\int_C P \, dx + Q \, dy = \int_C d\Phi = [\Phi]_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)}$

Exakt differentialekvation: $d\phi(x,y) = P(x,y) \, dx + Q(x,y) \, dy = 0$

har allmän lösning $\phi(x,y) = C$.

Yta i rummet på parameterform:

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad \text{eller med vektorbeteckning} \quad \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

har normalvektorn: $\mathbf{n} = \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v$.

Arean av en yta på parameterform: $A_S = \iint_{D_{uv}} |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| \, du \, dv$.

Arean av en funktionsyta: $A_S = \iint_D \sqrt{(f'_x)^2 + (f'_y)^2 + 1} \, dx \, dy$.

Arean av en rotationsyta: $A_S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$

där x -axeln är rotationsaxel.

Ytintegral av funktionen g över ytan S :

$$\iint_S g \, dS = \iint_{D_{uv}} g(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| \, du \, dv$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{eller} \\ \text{spec.} \end{array} \right\} = \iint_D g(x, y, f(x, y)) \sqrt{(f'_x)^2 + (f'_y)^2 + 1} \, dx \, dy$$

Tyngdpunkt för yta i rummet:

$$x_T = \frac{1}{A_S} \iint_S x \, dS \quad , \quad y_T = \frac{1}{A_S} \iint_S y \, dS \quad , \quad z_T = \frac{1}{A_S} \iint_S z \, dS$$

Normalytintegral av vektorfältet \mathbf{F} över ytan S :

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{D_{uv}} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v) \, du \, dv$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{eller} \\ \text{spec.} \end{array} \right\} = \iint_S P(x, y, z) \, dy \, dz + Q(x, y, z) \, dz \, dx + R(x, y, z) \, dx \, dy$$

Källtätethet (-styrka): $\operatorname{div} \mathbf{F} = P'_x + Q'_y + R'_z$

Gauss' divergenssats: $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz$

där S är sluten med normal utåt.

Virvelvektor: $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$

Stokes' sats: $\oint_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{D_{uv}} \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v) \, du \, dv$

där C är sluten kurva runt S .

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{F} = \operatorname{grad} \Phi$

Rotationsvolym då kurvan roterar kring
y-axeln: $y=f(x) \Rightarrow V = \pi \int_a^b x^2 f'(x) dx$

Arean av en rotationsyta

$$A_s = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$$

där x-axeln är rotationsaxel för

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t_1 < t < t_2$$

Kurvintegral i 3D:

$$A = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz \quad \text{med}$$

$$\vec{F} = (P, Q, R), \quad C = (x(t), y(t), z(t)) \\ t_0 \leq t \leq t_1$$



$$A = \int_{t_0}^{t_1} (P(x, y, z) \cdot \dot{x} + Q(x, y, z) \cdot \dot{y} + R(x, y, z) \cdot \dot{z}) dt$$

Om $\text{rot } \vec{F} = 0$, existerar Φ sådan att

$$\vec{F} = \text{grad } \Phi \quad \text{och} \quad \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Phi(\text{ändpunkt}) - \Phi(\text{startpunkt}).$$

$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ är oberoende av C mellan ~~ändpunkterna~~
 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ och $(x(t_1), y(t_1), z(t_1))$, om $\text{rot } \vec{F} = 0$.

VIKTIGA :: DERIVATOR OCH INTEGRALER

De derivator och integraler som presenteras här förväntas ni kunna utantill.

DERIVATOR ::

Funktion	Derivata	kommentar
x^r	rx^{r-1}	$r \neq 0$
e^x	e^x	
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\tan x$	$1 + \tan^2 x$	eller $\frac{1}{\cos^2 x}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	

PRIMITIVA FUNKTIONER ::

f	$\int f dx$	kommentar
x^r	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + C$	$r \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	
$\sin x$	$-\cos x + C$	
$\cos x$	$\sin x + C$	
$\frac{1}{1+(ax)^2}$	$\frac{1}{a} \arctan ax + C$	
$\ln x$	$x \ln x - x + C$	partiell integration!
$\frac{1}{\sqrt{1-(ax)^2}}$	$\frac{1}{a} \arcsin(ax) + C$	
e^x	$e^x + C$	
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$	

Standardgränsvärden

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

Dubbla vinklarna

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Addition & subtraktionsformler

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

Vektorer

$$\text{Tangent: } \vec{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

$$\text{Normal: } \vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{|\vec{T}'(t)|}$$

$$\text{Binormal: } \vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

Tangentplanets ekvation: (z=f(x,y) på P(x₀, y₀, z₀))

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Partiell integration

$$\int f(x)g(x) dx = [F(x)g(x)] - \int F(x)g'(x) dx$$

Kvotregeln

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

