

Andraderivatatestet, asymptoter

Sats (Andraderivatatestet): Antag att f är två gånger deriverbar på (a,b) och antag att $x_0 \in (a,b)$. Då gäller

- (i) Om $f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) < 0$ så är x_0 en lokal maxpunkt.
 (ii) Om $f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) > 0$ så är x_0 en lokal minpunkt.

Bevis: (i) Visas i boken.

(ii) Per definition gäller $f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h) - \overbrace{f'(x_0)}^{=0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h)}{h}$.

Eftersom $f''(x_0) > 0$ gäller

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(x_0+h)}{h} > 0 \Rightarrow f'(x_0+h) > 0 \text{ för små } h > 0$$

och

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f'(x_0+h)}{h} > 0 \Rightarrow f'(x_0+h) < 0 \text{ för små } h < 0.$$

Kring x_0 får vi alltså tecken Tabellen

x		x_0	
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	$f(x_0)$	↗

vilket visar att x_0 är en lokal minpunkt.

(2.)

Exempel: Bestäm och klassificera de kritiska punkterna

till $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ med $D_f = \mathbb{R}$.

Derivering ger $f'(x) = \frac{1 \cdot (1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$,

så $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. För att avgöra karaktären av dessa kritiska punkter använder vi andraderivata-testet. Andraderivatans är

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-2x(1+x^2)^2 - (1-x^2) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \\ &= - \frac{2x(1+x^2)((1+x^2) + 2(1-x^2))}{(1+x^2)^4} = \\ &= - \frac{2x(3-x^2)}{(1+x^2)^3}. \end{aligned}$$

Eftersom $f'(-1) = 0$ och $f''(-1) = \frac{1}{2} > 0$ är $x = -1$ en lokal minpunkt, och eftersom $f'(1) = 0$ och $f''(1) = -\frac{1}{2} < 0$ är $x = 1$ en lokal maxpunkt.

Anmärkning: Om $f''(x_0) = 0$ går det inte att använda satsen för att dra några slutsatser!

Exempel: Funktionen $f(x) = x^4 = (x^2)^2 \geq 0$ har ett lokalt minimum i $x = 0$, och $g(x) = x^3$ har en terrasspunkt i $x = 0$.

Eftersom $f'(x) = 4x^3$ och $f''(x) = 12x^2$ gäller

(3)

att $f'(0)=0$ och $f''(0)=0$. För $g(x)$ gäller $g'(x)=3x^2$

och $g''(x)=6x$, så även för $g(x)$ har vi $g'(0)=0$ och $g''(0)=0$.

Att första- och andraderivatorna är noll avgör alltså inte punktens karaktär.

Ibland uppträder sig en funktion på ett sätt så att den liknar en rät linje. En linje som funktionen "närmar sig" kallas för en asymptot, och dessa kan vara till hjälp för att skissa funktionen (eller vissa andra undersökningar). Det finns två typer.

Definition: Kurvan $y=f(x)$ sägs ha en lodrät asymptot $x=a$ om $f(x) \rightarrow +\infty$ eller $f(x) \rightarrow -\infty$ då $x \rightarrow a^+$ eller $x \rightarrow a^-$.


Absolut vanligaste orsaken till en lodrät asymptot är att vi delar med en faktor som går mot noll, men det i sig garanterar inte en asymptot, och det finns andra anledningar till att en lodrät asymptot uppstår.

Exempel: Funktionen $f(x)=\frac{1}{x-a}$ uppfyller

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x-a} = -\infty \quad \text{och}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x-a} = +\infty,$$

så $f(x)$ har en lodrät asymptot $x=a$.




Exempel: Eftersom

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \left[\begin{matrix} x = \frac{1}{e^t} \\ t \rightarrow +\infty \end{matrix} \right] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{e^t}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \underbrace{\ln 1}_{=0} - \ln(e^t) =$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} -t \cdot \underbrace{\ln e}_{=1} = -\infty$$

har $f(x) = \ln x$ en lodrät asymptot $x=0$.



Den andra typen av asymptoter är sned.

Definition: Linjen $y = kx + m$ sägs vara sned asymptot till

$f(x)$ då $x \rightarrow +\infty$ om $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (kx + m) = 0$.

På samma sätt kallas $y = kx + m$ sned asymptot till

$f(x)$ då $x \rightarrow -\infty$ om $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (kx + m) = 0$.

Anmärkning: Ibland talas det om vågräta/horisontella asymptoter. Dessa ingår som specialfall bland de sneda, om vi tar $k=0$.

Exempel: Bestäm alla asymptoter och rita kurvan till

funktionen $f(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$.

Vi gör den vanliga undersökningen med teckentabell osv.

Kritiska punkter: Derivering ger

$$f'(x) = \frac{2x(1-x^2) - x^2(-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

$$\text{s\u00e5 } f'(x)=0 \Leftrightarrow x=0.$$

Randpunkter: S\u00e4kas, men eftersom

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2(\frac{1}{x^2}-1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2}-1} = -1$$

och p\u00e5 samma s\u00e4tt $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ har $f(x)$ en sned (v\u00e4gr\u00e4t) asymptot $y = -1$ d\u00e5 $x \rightarrow \pm\infty$.

Singul\u00e4ra punkter: S\u00e4kas, eftersom funktionen \u00e4r deriverbar p\u00e5 hela sin definitionsm\u00e4ngd.

Funktionen \u00e4r inte definierad d\u00e5 $x = \pm 1$, och d\u00e4r \u00e4r n\u00e4mnaren noll, s\u00e5 det kan finnas asymptoter d\u00e4r.

Ber\u00e4kning av gr\u00e4nsv\u00e4rdena

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2}{\underbrace{(1-x)}_{>0} \underbrace{(1+x)}_{<0}} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2}{\underbrace{(1-x)}_{>0} \underbrace{(1+x)}_{>0}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

visar att $x = -1$ \u00e4r en lodr\u00e4t asymptot.

P\u00e5 samma s\u00e4tt ger

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{\underbrace{(1-x)}_{>0} \underbrace{(1+x)}_{>0}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{\underbrace{(1-x)}_{<0} \underbrace{(1+x)}_{>0}} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

att $x = 1$ \u00e4r en lodr\u00e4t asymptot.

Techentabellen blir

x	$(-\infty)$	-1^-	-1^+	0	1^-	1^+	$(+\infty)$
$f'(x)$		-	$(-\infty)$	-	+	$(+\infty)$	
$f(x)$	(-1)	\searrow	$(-\infty)$	\searrow	\nearrow	$(-\infty)$	(-1)

lok. min.

Så grafen ser ut:

