

INSTUDERINGSUPPGIFTER

PROBLEM 5 (lösningen skall vara klar v9)

a) Beräkna volymen av den kropp som begränsas

nedåt av konen $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ och

uppåt av sfären $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 2$ ("glassmängden").



b) Beräkna $\iint_D \frac{e^{2x}}{y(e^{2x} + 1)} dx dy$, då D är det område i första kvadranten som

begränsas av kurvorna $y = 2e^{-x}$, $y = 3e^{-x}$, $y = \cosh x$ och $2y = \cosh x$.

Lösningförslag till instuderingsuppgift 4

a) $\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{y}{1+x^2y^2} & \frac{x}{1+x^2y^2} \\ \frac{1}{y} & \frac{-x}{y^2} \end{vmatrix} = \frac{-x}{y(1+x^2y^2)} \neq 0$ i D , inversa funktionssatsen ger på stå endet.

b) $\begin{cases} f'_x = \frac{2}{2x-1} + y - 1 = 0 \\ f'_y = \frac{1}{y} + x = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2}{2x-1} = 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{3-2x}{2x-1} = \frac{1}{x} \Rightarrow 2x^2 - x - 1 = (2x+1)(x-1) = 0$,
 \uparrow

det ger de stationära punkterna $(1, -1)$ och $(-1/2, 2)$. Deras typ avgörs (ev.) m.h.a. den kvadratiske formen $Q(h, k) = f''_{xx}h^2 + 2f''_{xy}hk + f''_{yy}k^2$: $f''_{xx} = \frac{-4}{(2x-1)^2}$, $f''_{xy} = 1$, $f''_{yy} = \frac{-1}{y^2}$;

i punkten $(1, -1)$: $Q(h, k) = -4h^2 + 2hk - k^2 = -((k-h)^2 + 3k^2)$ är negativt definit,

i punkten $(-1/2, 2)$: $Q(h, k) = -h^2 + 2hk - \frac{1}{4}k^2 = -(h-k)^2 + \frac{3}{4}k^2$ är indefinit,

därmed är svaret: $(1, -1)$ är lokal maximipunkt, $(-1/2, 2)$ är sadelpunkt

c) $\begin{cases} f'_x = \frac{2(1+x^2+y^2) - 2x(1+2x+2y)}{(1+x^2+y^2)^2} = 0 \\ f'_y = \frac{2(1+x^2+y^2) - 2y(1+2x+2y)}{(1+x^2+y^2)^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y$ (subtrahera!), och det ger de stationära punkterna

$(-1, -1)$ och $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ med $f(-1, -1) = -1$ och $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 2$. Om vi räknar med polära

koordinater så ser vi att $0 \leq |f(x, y)| = \frac{|1 + 2r \cos \varphi + 2r \sin \varphi|}{1 + r^2} < \frac{1 + 4r}{r^2} < \frac{5}{r} \leq 1$ då $r \geq 5$.

På den kompakta cirkelskivan $\Omega: x^2 + y^2 \leq 25$ (t.ex.) antar den kontinuerliga funktionen f ett största och ett minsta värde (sats 4, sid. 33) och måste göra det i det inre av Ω (ty på randen är $|f| < 1$), alltså i en stationär punkt (ty f är C^1), men de enda möjliga punkterna är $(-1, -1)$ och $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (som vi visat ovan), alltså är -1 det minsta värde som f antar och 2 det största värde som f antar. Eftersom \mathbb{R}^2 är bå gvis sammanhängande och f kontinuerlig så antar f också alla värden mellan -1 och 2 (somv, sats 6 sid. 34). Svaret är därmed $V_f = [-1, 2]$.

OBS: En fullständig lösning till ö 4:20 finns på kursens hemsida.

REPETITIONSFRÅGOR matem.metoder del C för E1

Moment 5: dubbelintegral

1. Kan du definiera/beräkna dubbelintegral? Vad ger den?
2. Hur görs variabelbyte? Hur definieras/beräknas generaliserad dubbelintegral?
3. Kan du beräkna $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$?

EXTRAUPPGIFTER

11. Kroppen K begränsas av xy -planet och ytan $z = 20 - 2x^2 - 3y^2$.
Genom K borrar ett cylindriskt hål med z -axeln som borraraxel och radien R .
Bestäm R så att den återstående kroppen har hälften så stor volym som K
(bortborrad massa = kvarvarande massa).

12. Beräkna $\iint_D e^{xy-x^2-y^2} dx dy$ då D är första kvadranten i xy -planet.

svar: 1) $R = \sqrt{8 - \sqrt{64 - \frac{80}{\sqrt{6}}}}$ 2) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$

Extrauppgift 11 (olika sätt att rita i maple):

