Något om funktionsföljder/funktionsserier

1. Punktvis och likformig konvergens

Vi betraktar reellvärda funktioner med gemensam definitionsmängd $D \subset \mathbb{R}$, men (nästan) allt går helt analogt för komplexvärda funktioner (av en komplex variabel).

DEF Vi säger: Funktionsföljden f_n KONVERGERAR PUNKTVIS MOT f PÅ M, och skriver $f_n \to f$ punktvis på M, om $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ för alla $x \in M$ $(M \subset D)$.

f kallas gränsfunktionen till $(f_n)_{n=1}^{\infty}$.

EX1 $f_n(x) = x^n$, $M = [0,1]$:
För $x = 1$ gäller $\lim 1^n = 1$ och för $0 \le x < 1$ gäller $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$, alltså konvergerar x^n punktvis på [0,1] mot $f(x) = \begin{cases} 0, \text{ då } 0 \le x < 1 \\ 1, \text{ då } x = 1 \end{cases}$.



EX2 $f_n(x) = \dfrac{x^{2n}}{1+x^{2n}}$, $M = \mathbb{R}$: Då $n \to \infty$ gäller:
$f_n(\pm 1) = \frac{1}{1+1} \to \frac{1}{2}$, $f_n(0) = 0 \to 0$, för $|x| < 1$: $f_n(x) = \frac{x^{2n}}{x^{2n}+1} \to \frac{0}{0+1} = 0$ och för $|x| > 1$:
$f_n(x) = \frac{1}{\frac{1}{x^{2n}}+1} \to \frac{1}{0+1} = 1$, alltså konvergerar f_n punktvis mot funktionen

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ då } |x| < 1 \\ \frac{1}{2}, \text{ då } |x| = 1 \\ 1, \text{ då } |x| > 1 \end{cases}:$$



Frågan är nu, vilka egenskaper (kontinuerlig, deriverbar, integrerbar..) överförs från f_n till gränsfunktionen f, mera precist: gäller $\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right) = \lim_{x\to x_0}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)$, $\lim_{n\to\infty} f_n'(x) = \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)'$

och $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx$, dvs: får man byta "ordningen av gränsvärdena "?

Svaret är nej, som exemplena ovan visar. Det krävs något mer än "konvergens i varje punkt": f_n konvergerar punktvis mot f på M, om det till varje $\varepsilon>0$ och till varje $x \in M$ finns ett $N_0(\varepsilon, x)$ (N_0 beror på ε och x !), så att $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ för alla $n > N_0(\varepsilon, x)$.

Det som krävs för att svaret skall vara ja, är att man till varje $\varepsilon>0$ kan hitta ett $N_0(\varepsilon)$ som duger för <u>alla</u> $x \in M$:

<u>DEF</u> Vi säger: f_n KONVERGERAR LIKFORMIGT MOT f PÅ M, och skriver $f_n \to f$ likformigt på M, om det till varje $\varepsilon>0$ finns ett $N_0(\varepsilon)$ så att för alla $x \in M$ och $n > N_0(\varepsilon)$ gäller att $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

<u>ANM</u> a) Likformig (eng: *uniform*) konvergens är starkare än punktvis (eng: *pointwise*) konvergens: $f_n \to f$ likformigt på $M \Rightarrow f_n \to f$ punktvis på M, men omvändningen är fel, som våra exempel och följande sats visar.

b) Vi säger: f_n är punktvis, resp likformigt, konvergent på M, om det finns en funktion f så att f_n konvergerar punktvis, resp likformigt, mot f på M.

Då kan vi nu visa att för likformigt konvergenta funktionsföljder likheterna ovan gäller:

<u>SATS1</u>

<u>Föruts:</u> $f_n \to f$ likformigt på $[a,b]$ och alla f_n är kontinuerliga på $[a,b]$.

<u>Påst:</u> a) f är kontinuerlig på $[a,b]$.

b) $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$.

<u>Bev:</u> a) Vi skall visa att till $x_0 \in [a,b]$ och godt. $\varepsilon>0$ finns δ så att $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ för alla $x \in [a,b]$ med $|x - x_0| < \delta$:

Eftersom f_n konvergerar likformigt mot f på $[a,b]$, så finns ett N_0 så att för alla $x \in [a,b]$ och $n>N_0$ gäller : $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$; för t.ex. $n_0 = N_0 + 1$ gäller (eftersom f_{n_0} är kontinuerlig) att det finns ett δ så att $|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ för $|x - x_0| < \delta$ och då gäller för dessa x:

$|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0) + f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \le$

$\le |f(x)-f_{n_0}(x)|+|f_{n_0}(x)-f_{n_0}(x_0)|+|f_{n_0}(x_0)-f(x_0)| \le \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon$. vsv

b) Vi skall visa att till godt. $\varepsilon>0$ finns N_0 så att för $n>N_0$ gäller:

$\left|\int_a^b f_n(x)dx-\int_a^b f(x)dx\right|<\varepsilon$: Eftersom f_n konvergerar likformigt mot f på $[a,b]$, så finns ett N_0 så att för alla $x\in[a,b]$ och $n>N_0$ gäller : $|f(x)-f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{b-a}$; men då gäller för $n>N_0$:

$$\left|\int_a^b f_n(x)dx-\int_a^b f(x)dx\right|=\left|\int_a^b (f_n(x)-f(x))dx\right|\le\int_a^b |f_n(x)dx-f(x)|dx\le\frac{\varepsilon}{b-a}\int_a^b dx=\varepsilon. \quad \text{vsv}$$

SATS2

Föruts: $f_n\in C^1((a,b))$, f_n' konvergerar likformigt mot g i (a,b) och

$(f_n(x_0))_{n=1}^{\infty}$ är konvergent för något $x_0\in(a,b)$.

Påst: f_n konvergerar likformigt mot en C^1-funktion f i (a,b) och $f'=g$

dvs: $\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)'=\lim_{n\to\infty}(f_n'(x))$ för alla $x\in(a,b)$.

Bev: g är kontinuerlig (sats1) i (a,b); sätt $f(x_0)=\lim_{n\to\infty} f_n(x_0)$ och för $x\in(a,b)$

$f(x)=f(x_0)+\int_{x_0}^x g(t)dt$. Funktionen f är C^1 med $f'=g$ i (a,b). Kvar att visa:

f_n konvergerar likformigt mot f i (a,b):

Eftersom f_n' konvergerar likformigt mot g i (a,b) så finns till godt. $\varepsilon>0$ ett N_1 så att för alla $t\in(a,b)$ och $n>N_1$ gäller $|f_n'(t)-g(t)|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}$; vidare finns ett N_2 så att för $n>N_2$ gäller $|f_n(x_0)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$ (ty $f_n(x_0)\to f(x_0)$). Men då gäller för $n>N_0:=\max\{N_1,N_2\}$ och alla $x\in(a,b)$ att

$$|f_n(x)-f(x)|=\left|f_n(x_0)+\int_{x_0}^x f_n'(t)dt-\left(f(x_0)+\int_{x_0}^x g(t)dt\right)\right|\le$$

$$\le|f_n(x_0)-f(x_0)|+\left|\int_{x_0}^x (f_n'(t)-g(t))dt\right|\le|f_n(x_0)-f(x_0)|+\int_{x_0}^x|(f_n'(t)-g(t))|dt\le$$

$$\le|f_n(x_0)-f(x_0)|+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\int_{x_0}^x dt\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\int_a^b dt=\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon \quad \text{vsv}$$

En tillfredsställande behandling av likformig konvergens kräver "*supremum*"-begreppet. Men vårt intresse gäller huvudsakligen funktionsserier, och för dessa har vi Weierstraß' kriterium, vilket man klarar sig långt med. Först en självklar "kom ihåg"-definition:

2. Funktionsserier

DEF Låt u_k vara funktioner med gemensam definitionsmängd D och $M \subset D$. Vi säger:

FUNKTIONSSERIEN $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ är PUNKTVIS, resp LIKFORMIGT KONVERGENT PÅ M, om följden av delsummorna $S_N = \sum_{k=1}^{N} u_k$ är punktvis, resp likformigt konvergent på M.

SATS3 (Weierstraß' majorantsats)

Om $|u_k(x)| \le a_k$ för alla $x \in M$ och $k \in \mathbb{N}$ och om serien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ är konvergent, så är funktionsserien $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ absolut och likformigt konvergent på M.

Bev: Låt ε>0; eftersom $\sum_{k=1}^{\infty}$ $_k$ är konvergent, så finns ett N_0 så att $\sum_{k=N_0+1}^{\infty} a_k < \varepsilon$ och för $N > N_0$ gäller då $\left|\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) - S_N(x)\right| = \left|\sum_{k=N+1}^{\infty} u_k(x)\right| \le \sum_{k=N+1}^{\infty} |u_k(x)| \le \sum_{k=N+1}^{\infty} a_k < \varepsilon$ (oberoende av *x* !).

VSV

Observera att det räcker att $|u_k(x)| \le a_k$ gäller f.o.m. något N_0.

EX3 Funktionsserien $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin\frac{x}{k}$ är likformigt konvergent på varje [-*R*,*R*] ($0 < R \in \mathbb{R}$), ty $\left|\frac{1}{k}\sin\frac{x}{k}\right| \le \frac{R}{k^2}$ för alla k och $x \in [-R, R]$ och $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{R}{k^2}$ är konvergent.

Satserna 1 och 2 ger nu direkt för funktionserier:

SATS4

Föruts: Funktionsserien $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ är likformigt konvergent och alla u_k är kontinuerliga på [*a*,*b*].

Påst: a) $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ är kontinuerlig på [*a*,*b*].

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)dx$.

SATS5

Föruts: $\sum_{k=1}^{\infty} u_k'$ är likformigt konvergent i (a,b), $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x_0)$ är konvergent för något $x_0 \in (a,b)$ och alla $u_k \in C^1((a,b))$.

Påst: $\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} u_k'$.

Bev: Delsummorna S_N är kontinuerliga på $[a,b]$, resp. C^1 i (a,b), sats1,2 ger påståendena!

Så, det var allt. Som ett första och viktigt exempel tittar vi på potensserier och visar satserna 1 och 2, sid 12:19 i kursboken. Ett annat viktigt exempel blir Fourierserier.

SATS6

Föruts: Potensserien $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ har konvergensradie $R>0$ och summa $S(x)$ ($|x| < R$).

Påst: a) $S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, c_k x^{k-1}$, $S''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2} \cdots$ för $|x| < R$.

b) $\int_0^x S(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} c_k x^{k+1}$ för $|x| < R$.

Bev: Låt $0<r<R$. Weierstraß' majorantsats ger att $\sum_{k=0}^{n} c_k x^k$ är likformigt konvergent på $[-r,r]$, ty $|c_k x^k| \le |c_k| r^k$ och $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k| r^k$ är konvergent ($r<R$!), men även att $\sum_{k=1}^{\infty} k\, c_k x^{k-1}$ är likformigt konvergent på $[-r,r]$, ty $|k\, c_k x^{k-1}| < k\left(\frac{|x|}{r}\right)^{k-1} |c_k| r^{k-1} < |c_k| r^{k-1}$ för $k>$ något tillräckligt stort N ($\lim_{x\to\infty} x q^x = 0$ då $|q|<1$ och $0 \le q = \frac{|x|}{r} < 1$). Satserna 4/5 ger påståendena för varje $[-r,r]$; men eftersom varje x med $|x| < R$ ligger i ett $[-r,r]$, så är satsen visat. vsv

3. Uppgifter

1) Låt $f_n(x) = n^2 x(1-x)^n$. Är $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ likformigt konvergent på [0,1] ? [ledn: gäller sats1b ?]

2) Visa att $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{sin(k^2 x)}{k^2}$ är likformigt konvergent på $\mathbb{R}$ och diskutera vad som händer om du deriverar termvis.

3) Visa att $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} cos\frac{x}{k}$ är likformigt konvergent i varje intervall (-a,a) ($0 < a \in \mathbb{R}$).

[ledn: derivera termvis, använd sats2]

4) Beräkna $\lim_{x\to 1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k}\, e^{-kx}}{\sqrt{x+k-1}}$.

5) Visa att $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (x+k)^{-2}$ är likformigt konvergent i [0,1] och beräkna $\int_0^1 S(x)dx$.

6) Låt $f_n(x) = ln(cos\frac{x}{n})$.

a) Visa att $\sum_{n=3}^{\infty} f_n$ är likformigt konvergent i $(-\pi, \pi)$.

b) Gäller $\left(\sum_{n=3}^{\infty} f_n(x)\right)' = \sum_{n=3}^{\infty} f_n'(x)$ för $|x| < \pi$?

7) Visa att funktionen f som ges av $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-kx}}{(1+k)^2}$ är lösning till differentialekvationen $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{e^x - 1}$.

svar

1) nej **4)** $\frac{1}{e-1}$ **5)** 1 **6b)** ja