CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska Institutionen
Carl-Henrik Fant

16th November 1998

2 Något om kurvskaror.

2.1 Ortogonalkurvor.

2.1.1 Cartesiska koordinater.

Betrakta kurvskaran bestående av ellipserna
$x^2 + 4y^2 = C, \quad C > 0.$
För varje värde på parametern C har vi alltså en kurva Γ_C, vars ekvation är $x^2 + 4y^2 = C$. Genom varje punkt i planet går precis en kurva.
Genom punkten $P = (x_0, y_0)$ går kurvan
$\Gamma_{C_0} \ : \ x^2 + 4y^2 = C_0, \ C_0 = x_0^2 + 4y_0^2.$



Antag nu att vi har ännu en kurva $y = y(x)$. Denna skär kurvan Γ_{C_0} i punkten (x_0, y_0), där $y_0 = y(x_0)$. Kurvorna skär varandra under en vinkel v, som är vinkeln mellan de två kurvornas tangenter i (x_0, y_0).
En naturlig fråga är: *Finns det någon kurva, som skär alla kurvorna* Γ_C *under räta vinklar?*
I figuren ser vi att linjerna $x = 0$ respektive $y = 0$ är ortogonala mot alla ellipserna. Finns det några andra kurvor, som är ortogonala mot alla ellipser som de skär?



Kurvskaran Γ_C har ett riktningsfält $y' = f(x, y)$, där alltså $y' = k_1$ är riktningskoefficient för tangenten till kurvan genom punkten (x, y). Nu vet vi sedan tidigare att två linjer $y - y_0 = k_1(x - x_0)$ och $y - y_0 = k_2(x - x_0)$ är vinkelräta mot varandra $\Leftrightarrow \ k_1 k_2 = -1 \ \Leftrightarrow \ k_2 = -\dfrac{1}{k_1}$. Således är kurvan $y = y(x)$ ortogonal mot kurvan Γ_{C_0} i punkten $(x_0, y_0) \ \Leftrightarrow \ y'(x_0) = -\dfrac{1}{k_1} = -\dfrac{1}{f(x_0, y_0)}$. (Vi förutsätter att $f(x_0, y_0) \neq 0$.) Kurvan $y = y(x)$ är ortogonal mot alla kurvorna Γ_C om $y'(x) = -\dfrac{1}{f(x, y)}$ i alla punkter (x, y).

Vi sammanfattar: Antag att kurvskaran Γ_C är lösningskurvorna till differentialekvationen $y' = f(x, y)$. Då är *ortogonalkurvorna* lösningskurvorna till

$$y' = \frac{-1}{f(x, y)}.$$

Exempel 1: Vi bestämmer ortogonalkurvorna till kurvskaran $x^2 + 4y^2 = C$.

Derivering av kurvskarans ekvation ger

$$2x + 8yy' = 0 \ \Rightarrow \ y' = -\frac{x}{4y} = f(x, y).$$

För $x \neq 0$ och $y \neq 0$ gäller alltså:

$y = y(x)$ är ortogonal mot ellipserna $x^2 + 4y^2 = C$

$$\Leftrightarrow \ y'(x) = -\frac{1}{f(x, y)} = \frac{4y}{x}$$

$$\Leftrightarrow \ \frac{dy}{y} = \frac{4dx}{x}.$$



Denna differentialekvation har allmän lösning

$y = Rx^4,\ R \neq 0\ \ (R = 0 \Rightarrow y = 0,\ R \to \infty\ \Rightarrow\ x = 0.)$

Ortogonalkurvorna till ellipserna är således alla fjärdegradskurvorna $y = Rx^4$ samt koordinataxlarna.

□

Anmärkning: Om vi, efter eliminering av C ur kurvskarans ekvation, inte kan/vill lösa ut y', utan nöjer oss med ekvationen $F(x, y, y') = 0$, så är ortogonalskarans ekvation $F(x, y, \frac{-1}{y'}) = 0$.
Exempel 2: Vi bestämmer ortogonalkurvorna till kurvskaran $y^2 + x^2 - 2Cx = 0$.
Derivering av kurvskarans ekvation ger nu $C = yy' + x$. Insättning av detta i kurvskarans ekvation ger $y^2 + x^2 - 2(yy' + x)x = 0$.



Ortogonalskarans ekvation är då

$$y^2 + x^2 - 2(\frac{-y}{y'} + x)x = 0.$$

Denna kan förenklas till

$$((\frac{y}{x})^2 - 1)y' + 2\frac{y}{x} = 0$$

Substitutionen $z = \dfrac{y}{x}$ leder till differentialekvationen

$$(-\frac{1}{z} + \frac{2z}{z^2+1})dz + \frac{1}{x}dx = 0$$

vars lösning är

$$\ln \frac{x(z^2+1)}{z} = C_1$$

som omskrives till

$$y^2 + x^2 = 2Ry.$$

Kurvskaran består i detta fall av cirklar

$$(x - C)^2 + y^2 = C^2$$

med radie $|C|$ och medelpunkt $(C, 0)$.
Ortogonalkurvorna är cirklar

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2$$

med radie R och medelpunkt $(0, R)$.

□

2.1.2 Polära koordinater.



En kurvskara Γ_C, som ges i polära koordinater. kan även den erhållas som lösningskurvorna till en differentialekvation $r' = f(r, \theta)$.

I detta fall kan man visa att $\dfrac{r}{r'} = \tan w_1$

Således är $\tan w_1 = \dfrac{r}{f(r,\theta)}$

och ortogonalkurvornas ekvation är

$$\frac{r(\theta)}{r'(\theta)} = \tan w_2 = \frac{-1}{\tan w_1} = -\frac{f(r,\theta)}{r}$$

alltså: $r' = -\dfrac{r^2}{f(r,\theta)}$.

Exempel 3: Vi bestämmer ortogonalkurvorna till kardioiderna $r(\theta) = a(1+\cos\theta)$.

Derivering ger $r' = -a\sin\theta$ och alltså $\dfrac{r}{r'} = \dfrac{1+\cos\theta}{-\sin\theta}$.

Ortogonalkurvornas ekvation blir då $\dfrac{r'}{r} = \dfrac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$.

Denna ekvation skrivs om till $\dfrac{dr}{r} = \dfrac{\sin\theta d\theta}{1-\cos\theta}$ vars lösning är $r = C(1-\cos\theta),\ C > 0$

eller $r = C(1+\cos(\theta+\pi))$. (Kardioider igen!)



□

2.2 Evolutan till en kurva.

Evolutan till en kurva är den kurva vars tangenter är normaler till den givna kurvan.

Antag att kurvan $y = f(x)$ är given. Normalen till denna kurva i en punkt $P_\xi = (\xi, f(\xi))$ har ekvationen

$N_\xi\ :\ y - f(\xi) = -\dfrac{1}{f'(\xi)}(x-\xi).$

Dessa normaler bildar alltså en linjeskara N_ξ.
Evolutan till kurvan $y = f(x)$ skall således ha denna linjeskara till tangenter.
Antag att linjen N_ξ tangerar evolutan i punkten $(x(\xi), y(\xi))$. I så fall ges riktningskoefficienten för N_ξ av $\dfrac{y'(\xi)}{x'(\xi)}$. Detta innebär att följande två villkor skall vara uppfyllda.



$$\begin{cases} y(\xi) - f(\xi) &= -\dfrac{1}{f'(\xi)}(x(\xi)-\xi) \quad (x(\xi), y(\xi)) \in N_\xi \\ \dfrac{y'(\xi)}{x'(\xi)} &= -\dfrac{1}{f'(\xi)} \qquad\qquad N_\xi \ \textit{tangent} \end{cases}$$

Detta ekvationssystem är evolutans differentialekvation. För att bestämma $x(\xi)$ och $y(\xi)$ eliminerar vi exempelvis $y'(\xi)$ ur den andra ekvationen med hjälp av den första. Vi får då.

$$\begin{cases} y(\xi) - f(\xi) = -\dfrac{1}{f'(\xi)}(x(\xi)-\xi) &= 0 \\ \dfrac{f''(\xi)}{(f'(\xi))^2}(x(\xi)-\xi) + \dfrac{1}{f'(\xi)} + f'(\xi) &= 0 \end{cases}$$

Evolutans ekvation är således

$$\begin{cases} x(\xi) - \xi &= -\dfrac{(1+(f'(\xi))^2)f'(\xi)}{f''(\xi)} \\ y(\xi) - f(\xi) &= \dfrac{(1+(f'(\xi))^2)}{f''(\xi)} \end{cases}$$

Värt att notera är att

$$((x(\xi)-\xi)^2 + (y(\xi)-f(\xi))^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{(1+(f'(\xi))^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(\xi)|} = R_\xi$$

vilket betyder att punkten $(x(\xi), y(\xi))$ är *krökningscentrum* för kurvan $y = f(x)$ i punkten $(\xi, f(\xi))$. Krökningscentrum är med andra ord gränsläge för skärningspunkten mellan normalerna i två

näraliggande punkter $(x, f(x))$ och $(\xi, f(\xi))$ då $x \to \xi$.
Exempel 4: Vi bestämmer evolutan till kurvan $y = x^2$.



Eftersom $f'(x) = 2x$ och $f''(x) = 2$ så är evolutans ekvation

$$\begin{cases} x(\xi) - \xi &= -\dfrac{(1+(2\xi)^2)2\xi}{2} \\ y(\xi) - \xi^2 &= \dfrac{(1+(2\xi)^2)}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(\xi) &= -4\xi^3 \\ y(\xi) &= \dfrac{1+6\xi^2}{2} \end{cases}$$

□

Låt oss slutligen bestämma evolutan till en kurva som ges på parameterform, $x = x(t), y = y(t)$. Då är

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

och

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)\frac{dt}{dx} = \frac{y''x' - y'x''}{(x')^2}\frac{1}{x'}.$$

Evolutans ekvation blir nu

$$\begin{cases} x - x(t) &= -\dfrac{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)y'(t)}{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)} \\ y - y(t) &= \dfrac{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)x'(t)}{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)} \end{cases}$$

2.3 Övningsuppgifter.

1. Bestäm ortogonalkurvorna till

   (a) Parablerna $y = Cx^2$.
   (b) Parablerna $y^2 + 2Cx = C^2$.
   (c) Andragradskurvorna $x^2 + Cy^2 = 1$.
   (d) Tredjegradskurvorna $y = Cx^3$.
   (e) Kurvskaran $y = Ce^{x^2}$.
   (f) Rosettkurvorna $r = C|\cos 3\theta|$.
   (g) Spiralerna $r = Ce^{\theta}$.
   (h) Hyperboliska spiralerna $r = \frac{C}{\theta}$.

2. En rak stång rullar utan glidning på en cirkel. Punkten P på stången är från början tangeringspunkt. Beskriv kurvan som P genomlöper. (Ge en parametrisering av kurvan.) Bestäm kurvans evoluta. Kurvan kallas *cirkelevolventen*. Den dyker upp i samband med konstruktion av evolventkugg, maskinelement del B.

2.4 Svar till övningsuppgifter.

1. (a) $x^2 + 2y^2 = C$
   (b) $y^2 + 2Cx = C^2$
   (c) $x^2 + y^2 = C + \ln x^2$
   (d) $x^2 + 3y^2 = C$
   (e) $x = Ce^{-y^2}$
   (f) $r = C|\sin 3\theta|^{\frac{1}{9}}$ $C > 0$
   (g) $r = Ce^{-\theta}$
   (h) $r = Ce^{\frac{\theta^2}{2}}$

2. $x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$, Evolutan är cirkeln.