


Introduktion till linjärprogrammering

1 Ett produktionsproblem

En fabrik producerar två olika typer av möbler, *bord* och *stolar*. Produktionen av möbler erfordrar två olika typer av material; *stora* och *små* delar. Ett bord tillverkas genom att man sammanfogar två delar av vardera sorten, medan en stol består av en stor och två små delar. För att bestämma den optimala produktionsplanen, måste producenten beakta att det endast finns 6 stora och 8 små delar att tillgå. Ett bord kan säljas för 1600:- och en stol för 1000:-. Bestäm den produktionsplan som maximerar de totala intäkterna, under förutsättning att alla tillverkade möbler kan säljas och att de delar som används redan är betalda och inte kan säljas obearbetade.



Mål: maximera intäkterna

Variabeldefinition: x_1 = antal bord som tillverkas och säljs
 x_2 = antal stolar som tillverkas och säljs
 z = summan av intäkterna

Modell:
$$\begin{aligned} \max z &= 1600x_1 + 1000x_2 \\ \text{då} \quad 2x_1 + x_2 &\leq 6 && \text{(stora bitar)} \\ \quad 2x_1 + 2x_2 &\leq 8 && \text{(små bitar)} \\ \quad x_1, x_2 &\geq 0 && \text{(fysikaliska restriktioner)} \\ \quad x_1, x_2 &\text{ heltal} && \text{(bortses från här)} \end{aligned}$$

2 Lösning av modellen med hjälp av LEGO

Vi startar vid noll-produktion, d.v.s., $\mathbf{x} = (0, 0)^T$, och studerar marginalförbättringar för att välja ut den möbelyp som skall produceras. Eftersom x_1 har den bästa marginalintäkten (1600:- per bord), väljer vi att producera så många bord som möjligt. Vid $\mathbf{x} = (3, 0)^T$ finns inga fler stora bitar kvar.

Marginalvärdet för x_2 är nu 200, eftersom vi kan ta isär ett bord (-1600:-) och sedan bygga två stolar (+2000:-), vilket motsvarar intäkten +200:- per tillverkad stol. Öka värdet på x_2 maximalt. Vid $\mathbf{x} = (2, 2)^T$ finns inga fler små bitar kvar.

Marginalvärdet för x_1 är nu negativt (vi måste ta isär två stolar för att kunna bygga ett bord till, vilket ger en negativ intäkt, eller -400:- per tillverkat bord). Marginalvärdet för x_2 är också negativt (vi måste ta isär ett bord för att kunna bygga en stol till, vilket ger en negativ intäkt, eller -600:- per tillverkad stol).

Alltså är $\mathbf{x}^* = (2, 2)^T$ en optimallösning, d.v.s., tillverka två bord och två stolar för största möjliga intäkt, som är 5200:-.

3 Känslighetsanalys med hjälp av LEGO

Nedanstående förändringar antas göras oberoende av varandra; alla tre utgår från grundmodellen i avsnitt 1.

- Antag att producenten får möjlighet att köpa en stor bit till. Hur mycket är han/hon villig att betala för denna bit, och hur många bitar är värda detta pris?

Svar: Med en ytterligare stor bit kan vi göra ett bord av en stol. Förtjänsten från denna operation är $1600 - 1000 = 600$:-. Producenten betalar alltså maximalt 600:- för stora bitar, så länge det finns stolar kvar att omvandla till bord. Maximalt antal stora bitar som är värda detta pris är följaktligen 2.

- Samma fråga för små bitar.

Svar: Med ytterligare två små bitar, kan vi göra två stolar av ett bord. Förtjänsten från denna operation är $2 \cdot 1000 - 1600 = 400$:-. Producenten betalar alltså maximalt 200:- för små bitar, upp till maximalt antal bitar som är 4.

- Antag att försäljningspriset för bord sjunker till 750:-. Hur skall tillverkningsplanen förändras?

Svar: Marginalvärdet för att öka x_2 ändras till $1000 - 750 = 250$:- per stol (ta isär ett bord och bygg en stol). Detta värde gäller så länge det finns bord kvar att montera ned, d.v.s., öka värdet på x_2 med 2 till $x_2 = 4$; då blir $x_1 = 0$. Marginalvärdet för x_1 är nu $750 - 1000 = -250$:-, d.v.s., det lönar sig inte att bygga fler bord. Alltså är $\mathbf{x}^* = (0, 4)^T$ optimalt, d.v.s., tillverka enbart fyra stolar. Förtjänsten blir 4000:-.


4 Geometrisk lösning av modellen

$$\max z = 1600x_1 + 1000x_2 \quad (0)$$

$$\text{då} \quad 2x_1 + x_2 \leq 6 \quad (1)$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad (2)$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



4.1 Geometrisk känslighetsanalys


Modellen kan skrivas med generella beteckningar, enligt:

$$\left[\begin{array}{l} \max z = 1600x_1 + 1000x_2 \\ \text{då} \quad 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ \quad \quad 2x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ \quad \quad x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right] \iff \left[\begin{array}{l} \max z = c_1x_1 + c_2x_2 \\ \text{då} \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ \quad \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ \quad \quad x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right]$$

Antag att följande ändringar görs (oberoende av varandra):

- $b_1 = 6 + \Delta b_1$, $\Delta b_1 = 1 \Rightarrow \mathbf{x}^* = (3, 1)^T \Rightarrow z^* = 5800$:-
Intäkt per ytterligare inköpt stor bit: $5800 - 5200$:- = 600 :-
 $\Delta b_1 > 2$ ger ingen ytterligare intäkt, eftersom $x_2 \geq 0$ måste gälla.
- $b_2 = 8 + \Delta b_2$, $\Delta b_2 = 2 \Rightarrow \mathbf{x}^* = (1, 4)^T \Rightarrow z^* = 5600$:-
Intäkt per ytterligare inköpt liten bit: $(5600 - 5200)/2$:- = 200 :-
 $\Delta b_2 > 4$ ger ingen ytterligare intäkt, eftersom $x_1 \geq 0$ måste gälla.

- $c_1 = 1600 + \Delta c_1$, $\Delta c_1 = -750 \Rightarrow \mathbf{x}^* = (0, 4)^T \Rightarrow z^* = 4000$: -



5 En icke-teknisk introduktion till simplexmetoden och känslighetsanalys i linjärprogrammering

5.1 Slack-, bas-, och icke-bas-variabler, samt extrempunkter

Ursprunglig problemformulering:

$$\begin{aligned} \max z &= 1600x_1 + 1000x_2 \\ \text{då} \quad &2x_1 + x_2 \leq 6 & (1) \\ &2x_1 + 2x_2 \leq 8 & (2) \\ &x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Olikheter kan inte manipuleras med hjälp av radoperationer. Därför gör vi om (1) och (2) till ekvationer med hjälp av *slackvariabler*:

$$\begin{aligned} \max z &= 1600x_1 + 1000x_2 \\ \text{då} \quad 2x_1 + x_2 + s_1 &= 6 \quad (1) \end{aligned}$$

$$2x_1 + 2x_2 + s_2 = 8 \quad (2)$$


$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

Vi har nu 4 variabler och 2 ekvationer. Vi ska eliminera 2 av variablerna med hjälp av ekvationerna, och studera problemet i termer av de två återstående variablerna. Vi kallar de variabler som används för att lösa ekvationssystemet för *basvariabler* (eller *beroende variabler*), och de återstående för *icke-basvariabler* (eller *oberoende variabler*). Vi kommer att definiera målfunktionsvärdet z i termer av icke-basvariablerna.

När vi ska välja vilka variabler som är bas- respektive icke-basvariabler, måste vi tillse att

- (i) basvariablerna kan lösa det linjära ekvationssystemet; detta innebär att motsvarande kolumner i ekvationssystemet måste vara *linjärt oberoende*, samt att
- (ii) lösningen till ekvationssystemet också uppfyller icke-negativitetsvillkoren.

Notera att på randen till vart och ett av bivillkoren har en av variablerna värdet 0. Låt $X = \{\mathbf{x} \in \mathfrak{R}^2 \mid 2x_1 + x_2 \leq 6, 2x_1 + 2x_2 \leq 8, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$



I figuren ser vi att en *extrempunkt* till X karaktäriseras av att två variabler samtidigt har värdet 0 (med andra ord, två linjer skär varandra). Vi ser också att det finns andra punkter där två variabler har värdet 0, men dessa skärningspunkter är inte tillåtna, eftersom antingen en variabel x_j eller slackvariabel s_i där är negativ.

En fundamental egenskap hos optimallösningar till linjära optimeringsproblem är följande: *Om det existerar en optimal lösning så existerar en optimal extrempunkt.*

Generellt, betrakta modellen:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \\ \text{då} \quad & \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

där $\mathbf{x}, \mathbf{c} \in \mathfrak{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathfrak{R}^m$ och $\mathbf{A} \in \mathfrak{R}^{m \times n}$. Låt $X = \{\mathbf{x} \in \mathfrak{R}^n \mid \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$.

I vårt exempel är då $m = 2$, $n = 4$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, s_1, s_2)^T$, $\mathbf{c} = (1600, 1000, 0, 0)^T$,
 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, samt $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

En extrempunkt till X motsvaras av en lösning till systemet $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, i vilken $n - m$ variabler (icke-basvariablerna) har värdet 0, och de återstående variablerna (basvariablerna) är icke-negativa. (Detta är det fundamentala sambandet mellan, å ena sidan, geometrin och algebran hos linjärprogrammeringsproblem, och, å andra sidan, simplexmetoden.)

Vi noterar den intressanta slutsatsen att om det existerar en optimal lösning till ett LP-problem med n variabler och m bivillkor (olikheter och/eller likhetsbivillkor), så existerar en optimal lösning där inte fler än m variabler har ett positivt värde. Vi vet alltså redan innan vi löser problemet hur många aktiviteter som kommer att vara aktiva, och det är ett relativt begränsat antal (normalt gäller att $n \gg m$).

5.2 Simplexmetoden

Simplexmetoden söker bland extrempunkterna till X på ett smart sätt, längs kantlinjerna så att värdet på z ökar hela tiden tills en optimal extrempunkt är funnen. Vid förflyttningen från en extrempunkt till nästa, låter simplexmetoden en basvariabel byta plats med en icke-basvariabel. Den ser till att problemet hela tiden beskrivs i termer av de aktuella icke-basvariablerna. Vi börjar med att skriva systemet på formen

$$\begin{aligned} -z + \mathbf{c}^T \mathbf{x} &= 0 \\ \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Simplexmetoden arbetar enligt följande: bland de n st variablerna väljs $n - m$ st icke-basvariabler. Systemet $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ används för att beskriva de m basvariablerna i termer av de $n - m$ st icke-basvariablerna. Problemet formuleras sedan i termer av dessa variabler, genom att övriga m st variabler elimineras från målfunktionen.

Om partitioneringen av de n st variablerna i bas- och icke-basvariabler är korrekt, och icke-basvariablernas värden sätts till noll, så kommer lösningen till systemet $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ att vara en extrempunkt till mängden X . Målfunktionen är nu beskriven i termer av icke-basvariablerna; vi avgör huruvida denna extrempunkt är optimal genom att studera tecknet hos koefficienterna (marginalvärdena) i denna beskrivning av målfunktionen.

Om alla koefficienter är ≤ 0 , så kan värdet på z *inte* öka genom att man ökar värdet på en icke-basvariabel från noll. Om däremot någon koefficient är > 0 , så innebär det en ökad vinst om man ökar värdet på motsvarande variabel. Vi väljer den variabel som har störst positiv koefficient.

Att öka värdet på en icke-basvariabel från sitt värde noll, som den har i den aktuella extrempunkten, innebär att vi lämnar randen till ett bivillkor och rör oss längs en kantlinje till mängden X . Vi rör oss längs denna kantlinje tills vi når ett nytt bivillkor, vilket bestämmer den största ökningen hos värdet på denna icke-basvariabel som kan göras. Det uppnådda bivillkoret svarar mot en basvariabel, som får värdet noll. I den nya punkten har således $(n - m) - 1 + 1 = n - m$ st variabler värdet noll; alltså är den en extrempunkt.

Nästa steg i simplexmetoden är att ersätta den icke-basvariabel som har fått ett högre värde än noll med den basvariabel som fått värdet noll, d.v.s., de två variablerna byter roller så att den tidigare basvariabeln blir icke-basvariabel och vice versa. Detta görs med hjälp av enkla radoperationer, och vi upprepar ovanstående steg från denna nya beskrivning av problemet.

Vi noterar att den lösningsgång som presenteras nedan med hjälp av tablåer inte är exakt den som implementeras i praktiken, även om den producerar exakt samma sekvens av lösningar. Skillanden mot den som faktiskt implementeras, den så kallade *reviderade* simplexmetoden, är att tablåformen kräver att man utför vissa beräkningar som egentligen är onödiga.

5.3 Lösning av exemplet med hjälp av simplexmetoden

Vi skriver systemet på formen

$$\begin{aligned} z - \mathbf{c}^T \mathbf{x} &= 0 \\ \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

vilket ger följande linjära ekvationssystem (då vi utesluter icke-negativitetsvillkoren, som underförstås):

$$\begin{aligned} -z + 1600x_1 + 1000x_2 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + s_1 &= 6 \\ 2x_1 + 2x_2 + s_2 &= 8 \end{aligned}$$

Vi låter s_1 och s_2 vara basvariabler, och x_1 och x_2 vara icke-basvariabler, eftersom

- (i) s_1 och s_2 är givna som funktioner av x_1 och x_2 , och
- (ii) s_1 och s_2 finns inte med i målfunktionen.

Vi låter icke-basvariablerna få värdet noll, d.v.s., $x_1 = x_2 = 0$, vilket motsvarar extrempunkten origo. Koefficienterna för x_1 och x_2 i målfunktionen är 1600 respektive 1000; alltså är det mest lönsamt att öka värdet på x_1 . (Origo är *inte* en optimal

punkt, eftersom marginalvärdet för att öka värdet på variabeln är positivt för minst en variabel.)

Öka nu värdet på x_1 från 0; detta innebär att vi rör oss längs x_1 -axeln (en kantlinje till mängden X). Hur långt kan vi gå? Från ovanstående ekvationssystem följer (notera att x_2 förblir lika med 0 medan värdet på x_1 ökar):

$$\begin{aligned} s_1 &= 6 - 2x_1 - x_2 = 6 - 2x_1 \\ s_2 &= 8 - 2x_1 - 2x_2 = 8 - 2x_1 \end{aligned}$$

Värdet på x_1 kan öka så länge som s_1 och s_2 förblir ≥ 0 . Den variabel som först når värdet 0 är s_1 (då $x_1 = 6/2 = 3$), och det maximala värdet på x_1 är 3. ($s_1 = 0$ innebär att vi har använt alla stora bitar.) Vi har nu funnit den icke-basvariabel (x_1) och den basvariabel (s_1) som ska byta roller med varann.

För att uttrycka systemet med hjälp av de nya icke-basvariablerna (s_1, x_2), utför vi följande radoperationer:

$-z$	$+$	$1600 x_1$	$+$	$1000 x_2$		$=$	0	(0)
		$2 x_1$	$+$	x_2	$+$	s_1	$=$	6
		$2 x_1$	$+$	$2 x_2$		$+$	s_2	$= 8$
$-z$			$+$	$200 x_2$	$-$	$800 s_1$	$=$	-4800
		x_1	$+$	$\frac{1}{2}x_2$	$+$	$\frac{1}{2}s_1$	$=$	3
				x_2	$-$	s_1	$+$	$s_2 = 2$
								(0)−800·(1)
								$\frac{1}{2} \cdot (1)$
								(2)−(1)

Vi har nu eliminerat basvariablerna (x_1 och s_2) ur målfunktionen, och de två basvariablerna är tecknade som funktioner av icke-basvariablerna (s_1 och x_2). Observera följande:

- (i) Vi låter $s_1 = x_2 = 0$ och erhåller $\mathbf{x} = (3, 0)^T$, d.v.s, en extrempunkt till X .
- (ii) Målfunktionsvärdet är 4800.
- (iii) Marginalvärdet för att öka värdet på x_2 är i denna punkt 200, vilket står i målfunktionsraden.
- (iv) $s_2 = 2 > 0$, vilket innebär att det finns små bitar kvar.

Eftersom en målfunktionskoefficient är positiv (ett marginalvärde är positivt), är lösningen $\mathbf{x} = (3, 0)^T$ inte optimal.

Vi väljer härnäst att öka värdet på x_2 från 0. Eftersom vi låter värdet på s_1 förbli = 0, rör vi oss längs bivillkoret (1). Ur systemet ovan erhålls följande:

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 - \frac{1}{2}x_2 \\ s_2 &= 2 - x_2 \end{aligned}$$

Först att nå värdet 0 är variabeln s_2 (vid $x_2 = 2$). Vi låter $x_2 = 2$ och har identifierat nästa variabelpar att byta roller. Den nya extrempunkten är uppenbarligen $\mathbf{x} = (2, 2)^T$, eftersom det nya värdet på x_1 är $x_1 = 3 - \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$, och vi skriver om systemet enligt följande:

$-z$	$+$	200	x_2	$-$	800	s_1	$=$	-4800	(0)			
	x_1	$+$	$\frac{1}{2}x_2$	$+$	$\frac{1}{2}s_1$		$=$	3	(1)			
			x_2	$-$	s_1	$+$	s_2	$=$	2			
$-z$				$-$	600	s_1	$-$	200	s_2	$=$	-5200	$(0) - 200 \cdot (2)$
	x_1			$+$	s_1	$-$	$\frac{1}{2}s_2$	$=$	2	$(1) - \frac{1}{2} \cdot (2)$		
			x_2	$-$	s_1	$+$	s_2	$=$	2	(2)		

Ur detta system kan vi utläsa att $\mathbf{x} = (2, 2)^T$, $z = 5200$, och att denna extrempunkt är optimal, eftersom ingen koefficient i målfunktionsraden är positiv. Vi har härmed löst exemplet med hjälp av *simplexmetoden*.

5.4 Känslighetsanalys

Vi är intresserade av värdet av ytterligare resurser, i form av fler stora respektive små bitar, för den ovanstående modellen. Vi är också intresserade av hur många bitar av respektive sort som har detta värde.

Antag att vi låter $b_1 := b_1 + \Delta b_1$, där $\Delta b_1 > 0$. Om vi bibehåller representationen av systemet ovan, och utnyttjar den nya kapaciteten fullt ut genom att ändra optimallösningen $\mathbf{x}^* = (2, 2)^T$ så att den följer bivillkoret (2), så kommer slackvariabeln s_1 (som är proportionell mot avståndet från aktuell punkt till randen av det ursprungliga bivillkoret (1)) att få ett negativt värde. Om $\Delta b_1 = 1$ så blir $s_1 = -1$, och vinsten kommer att öka med $(-600) \cdot (-1) = 600$:-. För att finna den nya optimallösningen utnyttjar vi systemet, vilket ger:

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 - s_1 \\x_2 &= 2 + s_1\end{aligned}$$

Alltså, om $b_1 := b_1 + 1$ så erhålls $s_1 = -1$, vilket ger $\mathbf{x}^* = (3, 1)^T$. Det är också klart att den maximala ökningen Δb_1 som är intressant är den då antingen x_1^* eller x_2^* blir lika med noll. Detta inträffar då $s_1 = -2$, d.v.s., då $\Delta b_1 = 2$; då blir $\mathbf{x}^* = (4, 0)^T$ (enbart bord produceras). Alltså är vi intresserade av att köpa maximalt två extra stora bitar till ett högsta pris av 600:- per styck.

För köp av ytterligare små bitar använder vi samma argument. Låt $b_2 := b_2 + \Delta b_2$. Effekten av att öka värdet på b_2 är att s_2 blir negativ, och vi kan utläsa intäkterna för en extra liten bit som $(-200) \cdot (-1) = 200$:-. Vi betalar alltså maximalt 200:- för en extra liten bit. Den nya lösningen, för vilket värde som helst på Δb_2 , och det maximala värdet på Δb_2 kan utläsas ur systemet:

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 + \frac{1}{2}s_2 = 2 - \frac{1}{2}\Delta b_2 \\x_2 &= 2 - s_2 = 2 + \Delta b_2.\end{aligned}$$

Om vi låter $\Delta b_2 = 2$ erhålls $\mathbf{x}^* = (1, 4)^T$. Det maximala värdet på Δb_2 är 4, vilket motsvarar $\mathbf{x}^* = (0, 6)^T$. Vi är alltså intresserade av att köpa maximalt 4 små bitar till en högsta kostnad av 200:- vardera.

6 En icke-teknisk introduktion till dualitet i linjärprogrammering

6.1 En konkurrent

Antag att en annan fabrik (låt oss kalla den Billy) tillverkar bokhyllor vars råmaterial är detsamma som för borden och stolarna, alltså stora och små bitar. Billy vill expandera sin verksamhet och är intresserad av att köpa den resurs som "vår" fabrik har. Vi kan ställa oss två frågor, som (skall det visa sig) har samma svar: (1) vilket är det lägsta bud (pris) som vi kan acceptera för den totala kapaciteten?; (2) vilket är det högsta bud (pris) som Billy är beredd att erbjuda för råvarorna?

6.2 Ett dualt problem

För att studera problemet närmare införs:

Variabeldefinition: y_1 = priset (i kronor) som Billy erbjuder för varje stor bit
 y_2 = priset (i kronor) som Billy erbjuder för varje liten bit
 w = det totala budet som Billy erbjuder

För att vi ska acceptera att sälja vår resurs måste rimligen det pris som erbjuds för den vara minst lika stort som det värde resursen representerar i vår optimala produktionsplan, annars tjänar vi mer på att använda resursen själva. Betrakta till exempel nettointäkten för ett såld bord. Nettointäkten är 1600:- per bord, och för den åtgår två stora och två små bitar. För att inte budet omedelbart skall förkastas måste alltså Billy erbjuda ett pris som uppfyller $2y_1 + 2y_2 \geq 1600$. Motsvarande för värdet av en tillverkad stol är kravet att $y_1 + 2y_2 \geq 1000$.

Billy är naturligtvis intresserad av att minimera det totala budet under förutsättning att budet accepteras. Med observationen att y_1 och y_2 är priser och därför ickenegativa har vi följande matematiska modell för Billys problem:

$$\begin{array}{ll} \text{Modell:} & \min w = 6y_1 + 8y_2 \\ & \text{då} \quad 2y_1 + 2y_2 \geq 1600 \quad (\text{bord}) \\ & \quad \quad y_1 + 2y_2 \geq 1000 \quad (\text{stolar}) \\ & \quad \quad y_1, y_2 \geq 0 \quad (\text{priser}) \end{array}$$

Detta problem brukar kallas det *duala problemet* till vårt produktionsplaneringsproblem (som i stället benämnes det *primala problemet*).

Den optimala lösningen till detta problem är $\mathbf{y}^* = (600, 200)^T$. Det totala budet är $w^* = 5200$:-.

6.3 Tolkningar av den duala optimala lösningen

Som synes är den optimala duala lösningen identisk med skuggpriserna för resursbivillkoren. (Detta är en generell slutsats i linjärprogrammering.) För att motivera att detta är rimligt kan vi tänka oss att Billy endast är en fiktiv konkurrent, som vi använder tillsammans med det duala problemet för att mäta värdet av vår resurs. Detta (fiktiva) mått kan användas till exempel för att skapa en intern prissättning av sådana begränsade resurser som flera underavdelningar inom ett produktionsföretag utnyttjar. Det pris som den duala optimala lösningen (skuggpriset) utgör är då ett prisstyrningsinstrument som får underavdelningarna att utnyttja de begränsade resurserna på ett optimalt sätt avseende det övergripande målet.

Vi noterar också att det totala värdet av produktionen (5200:-) överensstämmer med det totala värdet w^* av resurserna i vårt företag. (Detta är också en generell slutsats i linjärprogrammering; se Stark dualitet nedan.) Billy är naturligtvis inte villig att bjuda mer än vad resursen är värd, men kan samtidigt inte ge ett lägre bud än den vinst som vi själva kan åstadkomma, eftersom vi då inte är beredda att sälja.

Vi kan notera att det för varje tillåten produktionsplan \mathbf{x} och pris \mathbf{y} gäller att $z \leq w$, eftersom

$$\begin{aligned} z = 1600x_1 + 1000x_2 &\leq (2y_1 + 2y_2)x_1 + (y_1 + 2y_2)x_2 = y_1(2x_1 + x_2) + y_2(2x_1 + 2x_2) \\ &\leq 6y_1 + 8y_2 = w, \end{aligned}$$

där vi i olikheterna utnyttjar alla bivillkoren i det primala och det duala problemet. (Även detta är en generell slutsats; se Svag dualitet nedan.) Alltså är varje acceptabelt bud (från vår sida sett) en överskattning av vår möjliga vinst, och det är denna överskattning som Billy minimerar i det duala problemet.

6.4 Duala problem

Samma data förekommer i båda problemen. I själva verket kan man till varje linjärt problem formulera ett motsvarande dualt dito:

$$\begin{array}{ll} \text{Primalt problem:} & \max z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ & \text{då} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \\ & \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Dualt problem:} & \min w = \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ & \text{då} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ & \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

I vårt fall är $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1600 \\ 1000 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, och $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Mellan dessa finns många relationer, som bildar en teori om linjära optimeringsproblems dualitet och optimalitet. Vi tar här upp ett par exempel på sådana.

6.5 Dualitetsteori

Låt det primala problemet ovan förkortas (P) och det duala (D). Vi noterar att det duala problemet till (D) är (P). **Svag dualitet:** Om \mathbf{x} är tillåten i (P) och \mathbf{y} är tillåten i (D) gäller att $z \leq w$.

Bevis: $z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \leq (\mathbf{A}^T \mathbf{y})^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{y}^T \mathbf{b} = w$. □

Stark dualitet: Om (P) och (D) båda har tillåtna lösningar så har båda också optimala lösningar, och $z^* = w^*$.

Bevis: Se Appendix. □

Komplementaritet: Låt \mathbf{x}^* och \mathbf{y}^* vara optimala lösningar till problemen (P) respektive (D). Då gäller att

$$\begin{aligned} y_i^* [\mathbf{a}_i \mathbf{x}^* - b_i] &= 0, & i = 1, \dots, m, \\ x_j^* [(\mathbf{a}^j)^T \mathbf{y}^* - c_j] &= 0, & j = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

där \mathbf{a}_i är rad i i matrisen \mathbf{A} och \mathbf{a}^j är kolumn j i matrisen \mathbf{A} .

Bevis: Eftersom stark dualitet gäller så råder likhet i de två olikheterna i beviset för svag dualitet. Dessa två bildar just komplementvillkoren ovan. □

Med andra ord, om ett bivillkor i (P) inte är uppfyllt med likhet (dvs. det finns ett slack i det bivillkoret) så är dess pris 0. I vårt exempel är båda resursbivillkoren uppfyllda med likhet (all resurs utnyttjas); om så ej vore fallet skulle det alltså betyda att värdet av ytterligare resurs (dvs. skuggpriset) vore 0, vilket är naturligt eftersom vi då inte kan (eller vill) utnyttja den i vår optimala produktionsplan.

Optimaliteten hos en vektor \mathbf{x} kan sammanfattas med att tre krav måste vara uppfyllda: \mathbf{x} måste (1) vara tillåten i (P), och \mathbf{x} skall motsvaras av en (2) komplementär dual vektor \mathbf{y} som (3) är tillåten i (D):

Optimalitet: Om \mathbf{x} är tillåten i (P) och \mathbf{y} är tillåten i (D) gäller att de är optimala i respektive problem om och endast om de har samma målfunktionsvärde, vilket är ekvivalent med att de tillsammans uppfyller komplementaritet. □

Om vi har löst det ena problemet kan vi alltså lösa ut det andra problemets lösning via komplementvillkoren. I simplexmetoden är dessa uppfyllda hela tiden, medan den komplementära lösningen blir tillåten precis då den primala är optimal. Då ger också simplextablån automatiskt den duala optimallösningen, liksom reviderade simplexmetoden.

Appendix Farkas Lemma och starka dualsatsen

Följande resultat är centralt för teorin om polyedriska mängder:

Farkas Lemma (1901): Precis ett av följande linjära system har en lösning:

$$\mathbf{Ax} \geq \mathbf{0}, \quad (1a)$$

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x} < 0 \quad (1b)$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{c}, \quad (2a)$$

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0} \quad (2b)$$

Vi applicerar detta resultat på primal–dual paret

$$\begin{array}{ll} \text{(P)} \min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \text{(D)} \max w = \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{då} \quad \mathbf{Ax} \geq \mathbf{b} & \text{då} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c} \\ \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0} & \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

Notera att svag dualitet implicerar att varje par av tillåtna lösningar till (P) och (D) uppfyller $\mathbf{c}^T \mathbf{x} \geq \mathbf{b}^T \mathbf{y}$.

Bevis av stark dualitet: Betrakta systemet

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{Ax} & & \geq \mathbf{b}, \\ & - \mathbf{A}^T \mathbf{y} & \geq -\mathbf{c}, \\ -\mathbf{c}^T \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{y} & \geq & 0, \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} & \end{array}$$

Om detta system har en lösning, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) , så följer resultatet av svag dualitet, eftersom $z = w$. Antag därför att det saknar lösning. En lämplig omskrivning av systemet och en tillämpning av Farkas Lemma ger då att följande system har en lösning:

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{A}^T \mathbf{u} & - \lambda \mathbf{c} & \leq \mathbf{0}, \\ & - \mathbf{Av} + \lambda \mathbf{b} & \leq \mathbf{0}, \\ \mathbf{b}^T \mathbf{u} - \mathbf{c}^T \mathbf{v} & & > 0, \\ \mathbf{u} \geq \mathbf{0}, & \mathbf{v} \geq \mathbf{0} & \lambda \geq 0 \end{array}$$

Antag först att $\lambda > 0$. Vi kan anta utan inskränkning att $\lambda = 1$, eftersom högerleden är noll. Då ser vi omedelbart att \mathbf{u} respektive \mathbf{v} är tillåtna lösningar i (P) respektive (D) med målfunktionsvärden som motsäger svag dualitet. Alltså måste $\lambda = 0$ gälla. Antag nu att $\mathbf{c}^T \mathbf{v} \geq 0$. Då följer att $\mathbf{b}^T \mathbf{u} > 0$ och via Farkas Lemma kan vi dra slutsatsen att (P) saknar lösning, vilket är en motsägelse. Om vi i stället antar att $\mathbf{c}^T \mathbf{v} < 0$ kan vi från en tillåten lösning \mathbf{x} i (P) konstruera en primalt tillåten lösning $\mathbf{x}(\theta) := \mathbf{x} + \theta \mathbf{v}$ för vilket gäller att $\mathbf{c}^T \mathbf{x}(\theta) \rightarrow -\infty$ när $\theta \rightarrow +\infty$. Från svag dualitet följer då att (D) saknar lösning, vilket är en motsägelse. \square

Vi kan också motivera Farkas Lemma med hjälp av starka dualsatsen (trots att stark dualitet bevisas med hjälp av den ...):

Bevis av Farkas Lemma:

[(1) \implies \neg (2)]: Antag att (1) har en lösning, \mathbf{x} . Om (2) också har en lösning, \mathbf{y} , implicerar det att

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0,$$

vilket leder till en motsägelse.

[\neg (1) \implies (2)]: Antag att (1) saknar lösning. Vi konstruerar en lösning till (2) enligt följande. Konstruera det linjära primal–duala problemparet

$$\begin{array}{ll} \min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \max w = \mathbf{0}^T \mathbf{y} \\ \text{då} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} \geq \mathbf{0} & \text{då} \quad \mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{c} \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

Minimeringsproblemet har optimallösning $\mathbf{x}^* = \mathbf{0}$. Enligt starka dualsatsen har dess dual en optimallösning. Den är därför speciellt tillåten. \square