

# Några övningar på Arcus-funktioner

**A1** Beräkna

- a)  $\cos(2 \arctan \frac{1}{2})$
- b)  $\tan(\arcsin \frac{1}{3} - \arccos \frac{2}{3})$
- c)  $\sin(2 \arcsin 0.8)$
- d)  $\cos(\frac{1}{2} \arccos \frac{7}{25})$

**A2** Beräkna det *exakta* värdet av

- a)  $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$
- b)  $2 \arctan 2 - \arctan 7$
- c)  $\arcsin \frac{1}{7} + \arcsin \frac{11}{14}$
- d)  $2 \arctan 10 + \arcsin \frac{20}{101}$

**A3** Lös ekvationerna

- a)  $\arcsin x = \arctan(2x)$
- b)  $\arccos(2x) = \arctan x$

**A4** Rita (i sina huvuddrag) kurvan  $y = \arctan \frac{2x}{1-x^2} - 2 \arctan x$ .

**A5** Beräkna

- a)  $\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x$ , då  $x \neq 1$
- b)  $2 \arctan x - \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ , då  $|x| \leq 1$

**A6** Undersök om  $f(x) = \arccos(\sqrt{x^2 - x - 2} - x)$  är inverterbar. Bestäm i så fall inversen  $f^{-1}(x)$  och ange dess definitionsmängd och värdemängd.

## SVAR

**A1** a)  $\frac{3}{5}$ , b)  $-\frac{2}{3}(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ , c) 0.96, d)  $\frac{4}{5}$ .

**A2** a)  $\frac{\pi}{4}$ , b)  $\frac{\pi}{4}$ , c)  $\frac{\pi}{3}$ , d)  $\pi$ .

**A3** a) 0,  $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ , b)  $\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1)}$ .

**A4**  $f(x) = \pi$ , om  $x < -1$ ,  $f(x) = 0$ , om  $|x| < 1$  och  $f(x) = -\pi$  om  $x > 1$ .

**A5** a)  $\frac{\pi}{4}$  om  $x < 1$ ,  $-\frac{3\pi}{4}$  om  $x > 1$ , b) 0.

**A6**  $f^{-1}(x) = -\frac{2+\cos^2 x}{1+2\cos x}$ ,  $D_{f^{-1}} = \{0\} \cup [\frac{2\pi}{3}, \pi]$ ,  $V_{f^{-1}} = \{-1\} \cup [3, \infty]$ .