

TRIPPELINTEGRALER

Vi definierar trippelintegraler genom att följa samma mönstret som för dubbelintegraller: vi definierar först trippelintegral av en funktion $f(x, y, z)$ på ett axelparallel rätblock Δ med hjälp av Riemannsumman $R(f, P)$, där P är en indelning av Δ i axelparallella delblock; denna integral utvidgas sedan steg för steg tills man har integraller av formen

$$\int \int \int_D f(x, y, z) dV$$

med kontinuerlig $f(x, y, z)$ och relativt allmänt område $D \subset \mathbb{R}^3$.

Trippelintegraler över speciella område.

Om D är en axelparallel rätblock: $D = \{(x, y, z) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, e \leq z \leq f\}$; så

$$\int \int \int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int_c^d \left(\int_e^f f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx,$$

(x, y, z får byta rollerna).

Om $D = \{(x, y, z) : \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y), (x, y) \in E\}$, (E är proektionen av D på xy -planet) α, β är kontinuerliga , så

$$\int \int \int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int \int_E \left(\int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy,$$

(x, y, z får byta rollerna).

Om $D = \{(x, y, z) : a \leq x \leq b, (y, z) \in E_x\}$, (E_x är snittet mellan kroppen D och planet $x = konst$) så

$$\int \int \int_D f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b \left(\int \int_{E_x} f(x, y, z) dy dz \right) dx,$$

(x, y, z får byta rollerna).

Variabelsubstitution

Antag att $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ är en $1 - 1$ avbildning av ett område E i uvw -rummet på område D i xyz -rummet.

Antag att funktionerna $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$ och deras partiella första ordningens derivator är kontinuerliga.

Om $f(x, y, z)$ är integrerbar på D så är

$$\begin{aligned} & \int \int \int_D f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \int \int_E f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \end{aligned}$$

VEKTORFÄLT

Ett **vektorfält** i planet är en funktion $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$F(x, y) = f(x, y)\mathbf{i} + g(x, y)\mathbf{j}.$$

Vi uppfattar (x, y) som en punkt i planet och $F(x, y)$ som en vektor i planet. För att åskadligöra vektorfältet väljer vi ett antal punkter (x_i, y_i) och avsätter vektorerna $F(x_i, y_i)$ i respektive punkter.

Fältlinjerna till ett vektorfält är kurvor vars tangenter är parallella med vektorfältens vektorer.

Alltså om (a, b) är en punkt i definitionsmängden till vektorfältet $F(x, y) = f(x, y)\mathbf{i} + g(x, y)\mathbf{j}$ så blir en fältlinje genom denna punkt en kurva $r(t) = (x(t), y(t))$ sådan att

- $(a, b) = r(t_0) = (x(t_0), y(t_0))$ för något t_0 ;
- i varje punkt $(x(t), y(t))$ på kurvan är kurvtangenten $x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$ parallell med fältsvektorn $f(x(t), y(t))\mathbf{i} + g(x(t), y(t))\mathbf{j}$ i denna punkt, dvs

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= \lambda(t)f(x(t), y(t)) \\ \frac{dy}{dt} &= \lambda(t)g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

Fältlinjerna är alltså lösningarna till den differentialala ekvationen

$$\frac{dx}{f(x, y)} = \frac{dy}{g(x, y)}.$$

Ett vektorfält $F(x, y) = f(x, y)\mathbf{i} + g(x, y)\mathbf{j}$ med definitionsmängd D kallas **konservativt** om det finns en funktion $\phi(x, y)$ definierad på D sådan att

$$\nabla\phi(x, y) = F(x, y) \text{ för alla } (x, y) \in D.$$

Funktionen $\phi(x, y)$ kallas **potential** till $F(x, y)$.

Ett nödvändigt vilkor för ett konservativt vektorfält i planet

Om $F(x, y) = f(x, y)\mathbf{i} + g(x, y)\mathbf{j}$ har kontinuerliga partiella derivator och är konservativt i D så måste gälla att

$$\frac{\partial}{\partial y}f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}g(x, y)$$

i alla punkter $(x, y) \in D$.

Nivåkurvorna $\phi(x, y) = C$ kallas *ekvipotentialkurvor* till $F(x, y)$. Eftersom $\nabla\phi(x_0, y_0)$ är en normalvektor till kurvan $\phi(x, y) = C$ genom (x_0, y_0) och lika med $F(x_0, y_0)$ som är parallell med tangentvektorn till fältlinjen genom (x_0, y_0) , blir fältlinjerna ortogonala mot ekvipotentialkurvorna.

Ett vektorfält i rummet $F(x, y, z) = f(x, y, z)\mathbf{i} + g(x, y, z)\mathbf{j} + h(x, y, z)\mathbf{k}$ med definitionsmängd D kallas **konservativt** om det finns en funktion $\phi(x, y, z)$ definierad på D sådan att

Funktionen $\phi(x, y, z)$ kallas **potential** till $F(x, y, z)$.

Nivåtor $\phi(x, y, z) = C$ kallas *ekvipotentialytor*.

Ett nödvändigt vilkor för ett konservativt vektorfält i rummet

Om $F(x, y, z) = f(x, y, z)\mathbf{i} + g(x, y, z)\mathbf{j} + h(x, y, z)$ har kontinuerliga partiella derivator och är konservativt i D så måste gälla att

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y, z) & = & \frac{\partial}{\partial x} g(x, y, z) \\ \frac{\partial}{\partial z} f(x, y, z) & = & \frac{\partial}{\partial x} h(x, y, z) \\ \frac{\partial}{\partial y} g(x, y, z) & = & \frac{\partial}{\partial y} h(x, y, z) \end{array} \right.$$

i alla punkter $(x, y, z) \in D$.
