

## TMV036c, Analys och linjär algebra, del C, vt 13

### Vecko-PM läsvecka 3

Vi inleder veckan med kapitel i Adams som introducerar till funktioner från  $\mathbb{R}^n$  till  $\mathbb{R}^m$ .

**Adams: 12.1** Funktionsbegreppet och de begrepp som hänger samman med detta är välkända från tidigare kurser. En reellvärd funktion av en variabel kan åskådliggöras i ett plan. För funktioner från  $\mathbb{R}^n$  till  $\mathbb{R}^m$  kräver motsvarande grafiska bild  $n + m$  dimensioner, besvärligt om  $n + m = 3$ , omöjligt om  $n + m > 3$ . Den "vanliga" grafen ersätts eller kompletteras därför ofta med nivåkurvor eller nivåytor till funktioner.

**Adams: 11.1-11.3** I 11.1 introduceras begreppet *vektorvärd funktion*. Här är det bättre att tänka på elementen i  $\mathbb{R}^n$  som *punkter* istället för *vektorer*. Om  $f$  är en funktion från  $\mathbb{R}$  till  $\mathbb{R}^2$  så har vi för varje reellt tal  $t$  en punkt  $f(t) = (x(t), y(t))$  i planet. Då  $t$  genomlöper ett intervall på  $t$ -axeln så kommer punkterna  $(x(t), y(t))$  att genomlöpa en kurva i planet (Läs själv om plana parametriserade kurvor i kapitel 8.2). Derivering sker koordinatvis vilket leder till ett antal deriveringsregler, dels de du kan sedan tidigare kurser och dels en del nya. Derivatans har många viktiga tillämpningar, några intressanta fysikaliska finns i kapitel 11.2. Vi tar speciellt upp hastighet och acceleration i 11.1 och kurvängd i 11.3.

**Adams: 12.2, 12.3, 12.7, 12.4** Kapitel 12 handlar om funktioner av flera variabler. Vi ska arbeta med en del begrepp som är välkända från envariabelanalysen men nu i en mer generell tappning. 12.2 handlar om gränsvärden till funktioner av flera variabler samt begreppet kontinuitet. Vi kommer känna igen definitionerna men kommer också upptäcka att situationen i flera variabler är lite mer komplex: det finns bara två sätt att närma sig en punkt på  $x$ -axeln, nämligen från vänster eller från höger, men det finns oändligt många sätt att närma sig en punkt, säg, i  $xy$ -planet. Precis som i den endimensionella analysen är begreppet kontinuitet direkt knutet till gränsvärdesbegreppet.

**12.3, 12.4, 12.7** handlar om att derivera funktioner av flera variabler. Vi vet att derivatan av en reellvärd funktion  $f(x)$  av en variabel i en punkt  $x_0$  mäter hur "snabbt"/"långsamt" funktionsvärdena förändras i en omgivning av  $x_0$  och man vill att derivatan skall ha samma betydelse även för funktioner i flera variabler. Det är dock inte givet hur man skall mäta denna förändring eftersom vi i omgivning av en punkt i  $\mathbb{R}^n$  har oändligt många riktningar att ta hänsyn till. De partiella derivatorna mäter förändringshastigheten i axelparallella riktningar och med dessa samlade i en vektor som kallas gradienten, kan vi sedan enkelt bestämma förändringshastigheten i alla andra riktningar genom s.k. riktningsderivata. Med hjälp av partiella derivator skall vi bestämma tangentplan och normaler till funktionsytor och nivåytor. Högre ordningsderivator diskuteras i 12.4.

**Innehåll:** Gränsvärden och kontinuitet. Partiella derivator, gradient och riktningsderivator.

**Mål:**

- redogöra för funktionsbegreppen (def. A.12.1), begreppen nivåkurva och nivåyta samt skissa enkla funktionsytor
- derivera vektorvärda funktioner av en variabel genom tillämpning av deriveringsreglerna (sats A.11.1.1)
- skissa plana kurvor utgående från given parametrisering (se även 8.2)
- bestämma parametrisering av sträckor i rummet samt cirkelbågar, ellipser och funktionskurvor i planet (se även 8.2)

- beräkna kurv tangent, hastighet och accelerationsvektor samt fart
- förklara vad som menas med båglängdselement och beräkna längden av kurvor
- definiera begreppet gränsvärde
- använda räkneregler för gränsvärden
- avgöra om en reellvärd funktion har gränsvärde och beräkna det
- förklara vad som menas med att funktion är kontinuerlig
- definiera och beräkna partiella derivator
- bestämma tangentplan och normallinje till funktionsyta
- beräkna gradienter och riktningsderivator
- bestämma ekvationer för tangentlinje och normallinje till nivåkurva (se sats A:12.7.6)

### Rekommenderade uppgifter

Avsnitt	Uppgifter
A.12.1	1, 3, 5, 12, 13, <b>14</b> , 15, 17, 19, 20, 21, 27
A.8.2	3, 5, 7
A.11.1	1, <b>3</b> , <b>7</b> , 11, <b>17</b>
A.11.3	1, 2, <b>3</b> , 4, <b>7</b> , 13, 19
A.12.2	1, 2, 4, <b>5</b>
A.12.3	1, <b>3</b> , 5, 8, 11, 13, 14, 17, <b>19</b> , 25
A.12.7	1, <b>3</b> , 5, 14, <b>21</b>

”**Tjocka**” uppgifter skall räknas på tavlan.