

1.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv A' \therefore \text{bas för } V(A) \text{ ges av } \{(1, 3, 1), (1, 1, 3)\}. \text{ I Gram-Schmidt-ortogonalisering, låt } \tilde{e}_1 = (1, 3, 1) \text{ och } \tilde{e}_2 = (1, 1, 3) + \alpha(1, 3, 1) \text{ där } \alpha \text{ väljs s.a. } \langle \tilde{e}_1, \tilde{e}_2 \rangle = 0 \text{ dvs } \alpha = -\frac{\langle (1, 1, 3), \tilde{e}_1 \rangle}{\|\tilde{e}_1\|^2} = -\frac{7}{11} \Rightarrow \tilde{e}_2 = \frac{2}{11}(2, -5, 13) \therefore e_1 = \frac{1}{\sqrt{11}}(1, 3, 1), e_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}\sqrt{11}}(2, -5, 13) \text{ är en ON-bas för } V(A). \text{ För } N(A) : Ax = 0 \Leftrightarrow A'x = 0 \Leftrightarrow x_4 = t, x_3 = -2t, x_2 = s, x_1 = -2s \Leftrightarrow x = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ så } e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0, 0), e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(0, 0, -2, 1) \text{ är en ON-bas för } N(A).$

2. Överbestämt ekv.syst. att lösa är  $A \begin{pmatrix} k \\ \ell \end{pmatrix} = b$  där  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Nu är  $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A^T A = 5 \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, A^T b = 10 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Lös alltså  $A^T A \begin{pmatrix} k \\ \ell \end{pmatrix} = A^T b \Leftrightarrow 5 \begin{pmatrix} 11 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ \ell \end{pmatrix} = 10 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 11 & 3 & | & 6 \\ 3 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\leftarrow \\ -3}} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 2 & 0 & | & 0 \\ 3 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow k = 0, \ell = 2; \text{ dvs linjen som söks är } y = 2.$

3. Egenvärdena  $\lambda$  för  $A$  fås av  $0 = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & -2 \\ -2 & -5 - \lambda & 7 \\ -2 & 7 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 & -2 \\ -4 & 0 & 2 - \lambda \\ -2 & 12 + \lambda & -5 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda - 6)(\lambda + 12)$  så  $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -12$ .
- Egenvektorer:  $\lambda_1 = 6$ : Lös  $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -11 & 7 \\ -2 & 7 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 0 & -9 & 9 \\ 0 & 9 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0$ .
- $\lambda_2 = 0$ : Lös  $\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & -5 & 7 \\ -2 & 7 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -6 & 6 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0$
- $\lambda_3 = -12$ : Lös  $\begin{pmatrix} 16 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & 7 \\ -2 & 7 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 8 & -1 & -1 \\ -8 & 28 & 28 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RE} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = s \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, s \neq 0$ .
- $\therefore Q = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & \sqrt{3} \\ 1 & \sqrt{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix}$ .

4.  $\lambda$  egenvärde och  $x$  egenvektor för  $A \Leftrightarrow Ax = \lambda x, x \neq 0$ . Då  $A$  Hermitesk, dvs  $A^H = A$ , får vi  $\lambda x^H x = x^H (\lambda x) = x^H Ax = x^H A^H x = (Ax)^H x = (\lambda x)^H x = \bar{\lambda} x^H x$ . Då  $x^H x = \|x\|^2 > 0$  ty  $x \neq 0$ , får vi  $\lambda = \bar{\lambda}$ , dvs  $\lambda$  reell.

5.  $A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$ . Gram-Schmidt  $\Rightarrow q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\tilde{q}_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$  och  $q_1^T a_2 = 1/\sqrt{2}$ ,  $q_2^T a_2 = -3/\sqrt{6}$ . Vidare är  $\tilde{q}_3 = a_3 - (q_1^T a_3) q_1 - (q_2^T a_3) q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow q_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  och  $q_1^T a_3 = 0$ ,  $q_2^T a_3 = -2/\sqrt{6}$ .
- Vidare är  $q_3^T a_3 = 1/\sqrt{3} \therefore A = QR$  där  $Q = \begin{pmatrix} | & | & | \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$  och  $R = \begin{pmatrix} q_1^T a_1 & q_1^T a_2 & q_1^T a_3 \\ 0 & q_2^T a_2 & q_2^T a_3 \\ 0 & 0 & q_3^T a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -3/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} & \\ 1/\sqrt{3} & & \end{pmatrix}$ . Nu är  $P = q_1 q_1^T + \dots + q_3 q_3^T$  och också  $P = A(A^T A)^{-1} A^T = A(R^T Q^T Q R)^{-1} A^T = A(R^T R)^{-1} A^T$ . I vilket fall som så får vi  $P = I$ ; som också, lättare, inses av att  $A$  har tre lin. ober. kolonner så  $V(A)$  3-dim underrum av  $\mathbb{R}^3$ , så  $V(A) = \mathbb{R}^3 \Rightarrow P = I$ .
- 

6. Av spektralsatsen följer att det för  $\mathbb{R}^n$  finns en ON-bas  $\{f_1, \dots, f_n\}$  av egenvektorer till  $A$  med tillhörande egenvärden  $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ . Låt för  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $(x_1^f, \dots, x_n^f)$  vara koordinaterna för  $x$  i basen  $\{f\}$  och låt  $\lambda$  egenvärde för  $A$  med tillhörande egenvektor  $x$ . Då gäller  $0 < \lambda \|x\|^2 = \langle Ax, x \rangle = |\langle Ax, x \rangle| \leq \|Ax\| \|x\| \leq \|x\|^2 \therefore 0 < \lambda \leq 1$ . Vi har nu med  $x = \sum_{i=1}^n x_i^f f_i$  att  $Ax = \sum_{i=1}^n x_i^f \lambda_i f_i$  och följaktligen

$$\begin{aligned} \|(A^3 - 2A)x\|^2 &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i^f \lambda_i^3 f_i - 2 \sum_{i=1}^n x_i^f \lambda_i f_i \right\|^2 \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i^f (\lambda_i^3 - 2\lambda_i) f_i, \sum_{j=1}^n x_j^f (\lambda_j^3 - 2\lambda_j) f_j \right\rangle = \sum_{i,j} x_i^f x_j^f (\lambda_i^3 - 2\lambda_i)(\lambda_j^3 - 2\lambda_j) \langle f_i, f_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i^f)^2 (\lambda_i^3 - 2\lambda_i)^2 \|f_i\|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^f)^2 (\lambda_i^3 - 2\lambda_i)^2 \leq \max_{1 \leq i \leq n} (\lambda_i^3 - 2\lambda_i)^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

$\therefore \|(A^3 - 2A)x\| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i^3 - 2\lambda_i| \|x\|$ . Finn nu maximum för  $|t^3 - 2t|$  på intervallet  $(0, 1]$ . Med  $f(t) = t^3 - 2t$  har vi  $0 = f'(t) = 3t^2 - 2 \Rightarrow t = \sqrt[+]{2/3}$ . Teckenstudietabell:

	0	$\sqrt{2/3}$	1	
$f'$	-	0	+	
$f$	0	$\searrow$	$f(\sqrt{2/3})$	$\nearrow$
	-1			

ger att  $\max_{0 < t \leq 1} |t^3 - 2t| = f(\sqrt{2/3}) = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ .