

MATEMATIK

Chalmers tekniska högskola

Matematisk analys i en variabel E1 (TMV135) 2005-12-17

Skrivtid: 8.30-12.30

Hjälpmaterial: Inga, ej heller räknedosa. Formelsamling på baksidan.

Telefon: Jonas Hartwig, 076-272 18 60

För godkänt krävs minst 20 poäng.

Betyg 3: 20-29 poäng, betyg 4: 30-39 poäng, betyg 5: 40-50 poäng.

Besked om rättning och granskning av tentan ges på respektive kurshemsida.

Skriv namn och personnummer på samtliga inlämnade papper. Skriv linje och inskrivningsår på omslaget.

1 Beräkna

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + e^x \ln(1-x)}{x^2}$$

6 p

2 Beräkna

$$(a) \int_4^\infty e^{-\sqrt{x}} dx \quad (b) \int \frac{4-x^2}{x^3+2x^2+x} dx \quad (c) \int_{-1}^1 x^4(1+\tan x) dx$$

Obs: till integranden i (c) har vi inte lyckats hitta någon primitiv funktion!

12 p

3 Lös differentialekvationen

$$y'' + 2y' + 2y = e^{-x}, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

6 p

4 Lös differentialekvationerna

- (a) $xy' = x^2 - 3y, \quad y(1) = 1$
(b) $xy' = 2y(y+1), \quad y(1) = 1$

8 p

5 Området som begränsas av kurvan $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, och x -axeln roterar kring

- (a) x -axeln,
(b) y -axeln.

Beräkna de volymer som genereras.

6 p

6 Ett föremål i rätlinjig rörelse bromsas med en retardation som är proportionell mot kvadratroten ur hastigheten. Beräkna bromssträckan. Inför själv lämpliga beteckningar! 6 p

7 (a) Skissa ett bevis för *Analysens huvudsats*.

- (b) Beräkna

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{t^2} dt.$$

6 p

God jul och gott nytt år!

VA

Trigonometriska formler

$$\begin{aligned}
\cos^2 x + \sin^2 x &= 1 \\
1 + \tan^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} \\
\sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\
\sin(x-y) &= \sin x \cos y - \cos x \sin y \\
\cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\
\cos(x-y) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y \\
\tan(x+y) &= \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} \\
\sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\
\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \\
2 \sin x \cos y &= \sin(x+y) + \sin(x-y) \\
2 \sin x \sin y &= \cos(x-y) - \cos(x+y) \\
2 \cos x \cos y &= \cos(x-y) + \cos(x+y)
\end{aligned}$$

En primitiv funktion

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C$$

Maclaurinutvecklingar

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\xi \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cos \xi \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \cos \xi \\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(1+\xi^2)} \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \binom{\alpha}{3} x^3 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + \binom{\alpha}{n+1} x^{n+1} (1+\xi)^{\alpha-n-1}
\end{aligned}$$

I alla utvecklingarna är ξ ett tal mellan 0 och x .

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$$