

Idag Kvadratiska former 7.2

Dugga 3, uppg. 2: ange τ med precis 2 signifikanta siffror, t.ex. $1.2 E+24$.

Kvadratisk form

Funktioner av typen

$$f(x) = f(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$$

är viktiga inom optimering, mekanik, osv. Ofta vill man minimera eller maximera dem.

Obs: f innehåller bara kvadriska termer.

Typiskt för energi, kostnad osv.

Ex Bestäm maximum och minimum av

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_2^2 + x_3^2.$$

Kvadratkomplettera:

$$x_1 + 3x_1x_2 = \left(x_1 + \frac{3}{2}x_2\right)^2 - \frac{9}{4}x_2^2$$

så att

$$f(x) = \left(x_1 + \frac{3}{2}x_2\right)^2 + \frac{7}{4}x_2^2 + x_3^2$$

så $f(x) \geq 0$ och $f(0) = 0$.

Alltså: $\min f = 0$. Dessutom $\max f = \infty$ eftersom alla termer ≥ 0 .

Ex Om vi antar biwillkoret

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$, dvs maximerar/minimerar över sfären, så fås $\max f \approx 4.62$, $\min f = 0.38$.
Hur gör vi det?

Skriv f på matrisform:

$$f(x) = x^T A x, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontroll: $x^T A x = [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} =$

$$= [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} x_1 + \frac{3}{2}x_2 \\ \frac{3}{2}x_1 + 4x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + \frac{3}{2}x_1x_2 + \frac{3}{2}x_2x_1 + 4x_2^2 + x_3^2$$

$$= x_1^2 + 3x_1x_2 + x_3^2$$

Vi delar upp $3x_1x_2 = \frac{3}{2}x_1x_2 + \frac{3}{2}x_2x_1$
för att få en symmetrisk matris.

För allmän kvadratisk funktion:

$$f(x) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n +$$

$$+ a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n +$$

$$+ \dots + a_{nn}x_n^2$$

får vi

$$f(x) = x^T A x \text{ med } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{1n} & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Def En kvadratisk form är en funktion $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ som ges av $Q(x) = x^T A x$ med en symmetrisk matris $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Det underlättar att man kan byta koordinater $x = Py$ så att man inte får några korsstermer $y_i y_j, i \neq j$.

Sats 4 (Satsen om principalaxlar)
Låt $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vara symmetrisk. Då finns ortogonal matris P så att variabeltransformationen $x = Py$ leder

till $y^T D y = x^T A x$ där D är diagonal.

Beweis Vi vet att A är ortogonalt diagonaliserbar, $A = P D P^T$.

Låt $x = P y$, $y = P^T x$, så fås

$$x^T A x = x^T (P D P^T) x = (P x)^T D (P^T x) = y^T D y. \quad \square$$

Ans $A = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 0 \\ 3/2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3/2 & 0 \\ 3/2 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3/2 \\ 3/2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \left((1-\lambda)(4-\lambda) - \frac{9}{4} \right) =$$


$$= (1-\lambda) \left(\lambda^2 - 5\lambda + \frac{7}{4} \right) = (1-\lambda) \left(\left(\lambda - \frac{5}{2} \right)^2 - \frac{25}{4} + \frac{7}{4} \right) =$$

$$= (1-\lambda) \left(\left(\lambda - \frac{5}{2} \right)^2 - \frac{18}{4} \right) = (1-\lambda) \left(\lambda - \frac{5}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) \left(\lambda - \frac{5}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\lambda = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{5}{2} \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{5-3\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5+3\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0,38 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4,62 \end{bmatrix}$$

$$P \approx \begin{bmatrix} -0,92 & 0 & 0,38 \\ 0,38 & 0 & 0,92 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$f(x) = x^T A x = y^T D y = 0,38 y_1^2 + y_2^2 + 4,6 y_3^2$$

Vi har $\|x\|^2 = x^T x = (P y)^T (P y) = y^T P^T P y = y^T I y = y^T y = \|y\|^2$, dvs $\|x\| = \|P y\| = \|y\|$

så att $\max_{\|x\|=1} f(x) = \max_{\|y\|=1} x^T A x = \max_{\|y\|=1} y^T D y \approx 4,62$
fås då $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.


På samma vis:

$$\min_{\|x\|=1} f(x) = 0,38 \text{ fås då } y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dvs max och min över sfären $\|x\|=1$ ges av λ_{\max} resp. λ_{\min} .

Axlarna y_1, y_2, y_3 kallas principalaxlarna för A .

De bildar ett ortogonalt koordinatsystem.



(Tilland: huvudaxlarna, t.ex. för spänningstensorn Σ .)

Det blir enklare att se vilka värden som $Q(x)$ tar om man använder detta koordinatsystem:

$$Q(x) = x^T A x = y^T D y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

inga kors termer $y_i y_j, i \neq j$.

Def En kvadratisk form Q är

1. positivt definit om $Q(x) > 0$
 $\forall x \neq 0$
2. negativt definit om $Q(x) < 0$
 $\forall x \neq 0$
3. indefinit om $Q(x)$ tar både positiva och negativa värden

Om $Q(x) \geq 0 \forall x$ säger vi positivt semidefinit, och negativt semidefinit om $Q(x) \leq 0 \forall x$.

Obs: $Q(0) = 0$.

Se bilder på sid 423.

Sats 5 Låt $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vara symmetrisk

Då är $Q(x) = x^T A x$

1. pos. definit om alla eg. värden
 $\lambda_i > 0$.

2. neg. definit om alla eg. värden
 $\lambda_i < 0$.

3. indefinit om A har
både $\lambda_i < 0$ och $\lambda_j > 0$.

Bewis $Q(x) = x^T A x = y^T D y =$

$= \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$. eftersom

alla $y_i^2 > 0$ då $x = P y \neq 0$ så

kontrolleras tecknet på $Q(x)$

av tecknen på egenvärdena
så som satsen säger. \square .