

## Sammanfattning föreläsning 11, Linjär algebra IT, VT2010

Låt  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  vara en bas för  $\mathbb{R}^n$ . Varje vektor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  kan skrivas som

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{f}_1 + x_2\mathbf{f}_2 + \dots + x_n\mathbf{f}_n,$$

som på matrisform blir

$$\mathbf{x} = (\mathbf{f}_1 \ \mathbf{f}_2 \ \dots \ \mathbf{f}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = F\mathbf{x}_F,$$

där  $\mathbf{x}_F$  är  $\mathbf{x}$  koordinater i basen  $F$ . Formeln  $\mathbf{x} = F\mathbf{x}_F$  är den viktiga formeln att komma ihåg när det gäller att byta baser.

För två godtyckliga baser

$$F = (\mathbf{f}_1 \ \mathbf{f}_2 \ \dots \ \mathbf{f}_n) \quad \text{och} \quad G = (\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2 \ \dots \ \mathbf{g}_n).$$

får vi

$$G\mathbf{x}_G = F\mathbf{x}_F \iff \mathbf{x}_G = G^{-1}F\mathbf{x}_F \iff \mathbf{x}_F = F^{-1}G\mathbf{x}_G.$$

Om  $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$  är en linjär avbildning,  $G$  en bas för  $\mathbb{R}^m$  och  $H = (\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \dots \ \mathbf{h}_n)$  en bas för  $\mathbb{R}^n$ , så är matrisen för  $f$  relativt baserna  $G$  och  $H$  matrisen  $A_{H \rightarrow G}$  som uppfyller

$$f(\mathbf{v})_G = A_{H \rightarrow G}\mathbf{v}_H.$$

Om  $m = n$  och  $G = H$  så är matrisen för  $f$  relativt basen  $G$  matrisen  $A_G$  som uppfyller

$$f(\mathbf{v})_G = A_G\mathbf{v}_G.$$

$$A_{H \rightarrow G} = (f(\mathbf{h}_1)_G \ f(\mathbf{h}_2)_G \ \dots \ f(\mathbf{h}_n)_G)$$

Om en linjär avbildning  $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$  har matrisen  $A_G$  relativt basen  $G$  så har den matrisen

$$A_E = GA_GG^{-1}$$

relativt standardbasen.

Vi säger att en bas är en ortonormal bas, eller kortare ON-bas, om basvektorerna är parvis ortogonala och har längd 1.

En linjär avbildning från  $f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$  är isometrisk om den bevarar längder, d v s om

$$\|f_A(\mathbf{x})\| = \|A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|,$$

för alla vektorer  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Motsvarande matris  $A$  säges vara en ON-matris.

En isometrisk linjär avbildning  $f_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$  bevarar skalärprodukter, d v s

$$f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \text{ eller } (A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}.$$

för alla vektorer  $\mathbf{x}$  och  $\mathbf{y}$ .

Den kvadratiske matrisen  $A$  är en ON-matris om och endast om dess kolumner utgör en ON-bas.

Den kvadratiske matrisen  $A$  är en ON-matris om och endast  $A^t = A^{-1}$ .