

TMV 225 Inledande matematik

* dag: Mängdlära (AL 1.1)

F01 Matematisk logik (AL 1.2)

- Övningar: Räkna a) + b)
- Problem: Alla udda uppgifter
- Datoröv: Alla udda uppgifter

* 1.1 Mängdlära

Definition: Mängd


En samling av "objekt".

Objekt i mängden kallas ^{objekt} element.

x element i $X \Leftrightarrow x \in X$

$x \notin$ element i $X \Leftrightarrow x \notin X$

↑ tillhör
inte



Exempel:


$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $B = \{1, 2, 3\}$

$C = \{3, 4, 5, \odot, \triangle\}$


$F = \{ \} = \emptyset =$ tomma mängden

← behöver ord
vara

Definition: Relationer mellan mängder




• Likhet: $A = B$ om $A \subseteq B$ och $B \subseteq A$



$A \subset B$ om $A \subseteq B$ och $A \neq B$

A "om och endast om"

Definition: Operationer på mängder



- Union: $A \cup B$

- Snitt: $A \cap B$

- Differens: $A \setminus B$

- Produkt: $A \times B$ $\begin{matrix} \cup \\ a \end{matrix}$ $\begin{matrix} \cup \\ b \end{matrix}$ ordnade par $\{(a, b)\}$

Exempel:

- $B \subseteq A$
- $B \subset A$
- $F \subseteq A$
- $F \subset A$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, \odot, \square\}$

$A \cap B = \{1, 2, 3\}$

$A \cap C = \{3, 4, 5\}$

$A \setminus B = \{4, 5\}$

$A \setminus C = \{1, 2\}$

$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), \dots\}$

$\dots, (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}$

* 1.2 Matematisk logik

Grundläggande notation:

- \neg negation ("icke")
- \wedge konjunktion ("och")
- \vee disjunktion ("eller")
- \Rightarrow implikation ("medför")
- \Leftrightarrow ekvivalens ("betyder samma som")

Binära värden
 (Sensitivt)

Logisk utsaga: påstående som kan vara sant eller falskt (ha sannings-

värde \mathbb{T} eller \mathbb{F} .

Exempel:

- $P =$ Solen är en stjärna. (\mathbb{T})
- $Q = (1+1=2)$ (\mathbb{T})
- $R = (5 \in \{1, 2, 3\})$ (\mathbb{F})
- $S = (0/0=1)$ (ej logisk utsaga)

De 5 logiska operatorerna opererar på uttåg.

Definition: Logiska operatörer

\neg	P
F	T
T	F

P	Q	\wedge
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

P	Q	\vee
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

P	\Rightarrow	Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F

obs!

P	\Leftrightarrow	Q
T	T	T
T	F	F
F	F	T
F	T	F

Sats: Logisk algebra

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$, $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
(kommutativa lagar)

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$, $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
(associativa lagar)

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
(distributiva lagar)

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ (*)
 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
(de Morgans lagar)

Bevis: (av *)

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	$\neg P$	P	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
F	T	T	F	T
T	T	F	T	T
T	F	T	F	T
T	F	F	T	T

En tautologi (alltid sann)

Sats: Logisk slutledning

Modus ponens

$$P \Rightarrow Q$$

$$P \xrightarrow{\text{"därför"}} Q$$

$$\therefore Q$$

Modus tollens

$$P \Rightarrow Q$$

$$\neg Q$$

$$\therefore \neg P$$

Bevis: Se problem 1.2 \square

Påståenden beror ofta på

variabler:

$$P(a,b) = ((a+b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2))$$

$$Q(x) = (x^2 = 2)$$

Är då praktiskt att arbeta med

"kvantorer": $\forall, \exists, \exists!$ Definition: Kvantorer

$$\forall x \in X : P(x) \quad \text{"för alla"}$$

$$\Leftrightarrow x \in X \Rightarrow P(x)$$

$$\text{"P är sann för alla } x \text{ i } X \text{"}$$

$$\exists x \in X : P(x) \quad \text{"för något"}$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x \in X : \neg P(x)$$

$$\text{"P är sann för något } x \text{ i } X \text{"}$$
Om umikt: $\exists!$

Exempel: Kvantorer

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$


$$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$$

$$\exists ! x \in \mathbb{R} : x^2 = 2 \wedge x > 0$$

Exempel: Konstruktion av mängder

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\} = (2, \infty)$$

$$\{a \in \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R} : a + x(1-x) < 1\} = (-\infty, 3/4)$$



* Sammanfattning

Mängdrelationer

\in
 \subseteq
 \subset
 $=$

Mängdoperationer

\cup
 \cap
 \setminus
 \times

Logik

\neg
 \wedge
 \vee
 \Rightarrow
 \Leftrightarrow

Kvantorer

\forall
 \exists
 $\exists!$