


- * Idag:
- Likformig kontinuitet (AL 3.3)
 - Lipschitz-kontinuitet (AL 3.4)

F08

3.3 Likformig kontinuitet

Exempel:

$$f(x) = \sin(1/x)$$



- Kontinuerlig på $(0, \infty)$
(och på $(-\infty, 0)$)

- Kontinuitet:

$$\text{litet } |dx| \Rightarrow \text{litet } |dy| \text{ ?}$$

$$< \delta < \epsilon$$

- Men: För litet \bar{x} gäller
för $f(x) = \sin(1/x)$ att

$$\text{litet } |dx| \Rightarrow |dy| \approx 2$$

↙ inte litet!

Funktionen är kontinuerlig
men inte likformigt kontinuerlig!

Kontinuitet: $\delta = \delta(\epsilon, \bar{x})$

Likformig kontinuitet: $\delta = \delta(\epsilon)$



Oberoende av \bar{x} !

Definition: Likformig kontinuitet

f likformigt kontinuerlig på I om

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in I :$$

$$|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$$

\nexists starkare krav än kontinuitet!

Sats: f likformigt kontinuerlig på I

$\Rightarrow f$ kontinuerlig på I

Exempel:

1) $f(x) = 3x + 5, I = \mathbb{R}$

2) $g(x) = x^2, I = \mathbb{R}$

f och g är kontinuerliga

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x}) = 3\bar{x} + 5 = \bar{y}$$

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} g(x) = g(\bar{x}) = \bar{x}^2 = \bar{z}$$

1) $|f(x) - \bar{y}| = |3x + 5 - (3\bar{x} + 5)|$

$$= |3(x - \bar{x})| = 3|x - \bar{x}| < \epsilon$$

om $|x - \bar{x}| < \delta = \epsilon/3$

$\therefore \delta = \epsilon/3$ oberoende av \bar{x}

$\Rightarrow f$ likformigt kontinuerlig

2) $|g(x) - \bar{z}| = |x^2 - \bar{x}^2| = |x + \bar{x}| \cdot |x - \bar{x}|$

$$\leq (|x| + |\bar{x}|) \cdot |x - \bar{x}|$$

$$\leq \begin{cases} |x - \bar{x} + \bar{x}| \\ \leq |x - \bar{x}| + |\bar{x}| \\ < \delta + 1 \\ < 1 + |\bar{x}| \end{cases} \leq \{ \text{Tag } \delta \leq 1 \}$$

Notera!

Detta visar inte att g

inte är likformigt kontinuerlig

om $|x - \bar{x}| < \frac{\epsilon}{2|\bar{x}| + 1}$

$\therefore \delta = \min(1, \frac{\epsilon}{2|\bar{x}| + 1})$

\nexists likf. kontinuerlig, δ beror av \bar{x} Varför?

Definition: Begränsning

f uppåt begränsad på I om

$$\exists M_f \forall x \in I : f(x) \leq M_f$$

f nedåt begränsad på I om

$$\exists M_f \forall x \in I : f(x) \geq M_f$$

f begränsad på I om uppåt och

nedåt begränsad, dvs

$$\exists M_f \forall x \in I : |f(x)| \leq M_f$$

Sats: Egenskaper för likformigt
kontinuerliga funktioner

f, g likformigt kontinuerliga = LK

\Rightarrow

(i) $f + g$ LK

(ii) $f - g$ LK

(iii) αf LK

(iv) $f \cdot g$ LK

(v) f/g LK

(vi) $f \circ g$ LK

Jämför med tidigare exempel,
 $f(x) = g(x) = x$
 $\Rightarrow (fg)(x) = x^2$

om f, g begränsade

LK om f, g begränsade och

$$|g(x)| \geq \beta > 0 \text{ på } I$$

3.4 Lipschitz-kontinuitetLikformig kontinuitet:

$$|\Delta x| \text{ litet} \Rightarrow |\Delta y| \text{ litet}$$

Lipschitz kontinuitet:

$$|\Delta x| \text{ litet} \Rightarrow |\Delta y| \text{ litet}$$

$$|\Delta y| \leq L_f \cdot |\Delta x|$$

Notera:

$$L_f \cdot |\Delta x| < \varepsilon$$

$$\text{om } |\Delta x| < \varepsilon / L_f,$$

dvs

$$\boxed{\delta(\varepsilon) = \varepsilon / L_f}$$


EH kvantitativt mått på
(likformig) kontinuitet!

Definition: Lipschitz-kontinuitet

f Lipschitz-kontinuerlig på I om

$$\exists L_f > 0 \forall x_1, x_2 \in I$$

$$| \underbrace{f(x_1) - f(x_2)}_{\Delta y} | \leq L_f \cdot \underbrace{|x_1 - x_2|}_{\Delta x}$$



f ligger utanför varje kon med
lutning L_f centrerad i $(x, f(x))$

Sats: Lipschitz medför likf. kont.

Bevis:

Vill visa att

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in I$$

$$|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

$$\text{Tag } \delta = \varepsilon / Lf, |x_1 - x_2| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq Lf \cdot |x_1 - x_2|$$

$$< Lf \cdot \varepsilon / Lf$$

$$= \varepsilon$$

\therefore Likformigt kontinuerlig.

Exempel: $f(x) = x^2$, $I = [2, 3]$


$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2|$$

$$= |x_1 + x_2| \cdot |x_1 - x_2|$$

$$\leq (3+3) \cdot |x_1 - x_2|$$

$$= 6 \cdot |x_1 - x_2| \quad \therefore \underline{\underline{Lf = 6}}$$

Exempel: $f(x) = \sqrt{x}$, $I = [0, 1]$



1) Likformig kontinuitet

$$|f(x_1) - f(x_2)|^2 = |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|^2$$

$$= |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \cdot |\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}|$$

$$\leq |\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}| \cdot |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|$$

$$= |x_1 - x_2|$$

$$\Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|} < \varepsilon$$

$$\text{om } |x_1 - x_2| < \varepsilon^2$$

$$\therefore \delta = \delta(\varepsilon) = \varepsilon^2$$

$\Rightarrow \sqrt{x}$ likformigt kontinuerlig

2) Lipschitz-kontinuitet

Om Lipschitz-kontinuerlig:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L_f \cdot |x_1 - x_2|$$

$$\Rightarrow L_f \geq \frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|}, \quad x_1 \neq x_2$$

$$= \frac{|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|}{|x_1 - x_2|}$$

$$= \frac{1}{|\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \cdot \frac{1}{|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \rightarrow \infty \text{ då } x_1, x_2 \rightarrow 0$$

\(\therefore\) Ej Lipschitz-kontinuerlig

Tvåregler:

• Lipschitz-kontinuerlig om begränsad

derivata ($\Delta y / \Delta x$)

• Likformig kontinuerlig om begränsad

på begränsat intervall och ej oscillerar,

eller begränsad derivata

$$\left| \Delta y \right| \leq L_f \cdot |\Delta x|$$

Sats: Egenskaper för Lipschitz-kontinuerliga funktioner
 f, g Lipschitz-kontinuerliga med konstanter L_f, L_g

(i) $f + g \quad L = L_f + L_g$

(ii) $f - g \quad L = L_f + L_g$

(iii) $\alpha f \quad L = \alpha L_f$

(iv) $f \cdot g \quad L = L_f M_g + M_f L_g$

(v) $f/g \quad L = \frac{L_f M_g + M_f L_g}{\beta^2}$

(vi) $f \circ g \quad L = L_f L_g$

Observera om värdet $\beta > 0$

Bevis:

(iv)

$$|f \cdot g(x_1) - f \cdot g(x_2)| = |f(x_1)g(x_1) - f(x_2)g(x_2)|$$

\(\rightarrow\) lägg till och dra ifrån

$$= |f(x_1)g(x_1) - f(x_2)g(x_1) + f(x_2)g(x_1) - f(x_2)g(x_2)|$$

\(\rightarrow\) triangulering

$$\leq |f(x_1)g(x_1) - f(x_2)g(x_1)| + |f(x_2)g(x_1) - f(x_2)g(x_2)|$$

$$\begin{aligned}
 &= |f(x_1) - f(x_2)| \cdot |g(x_1)| \\
 &+ |f(x_2)| \cdot |g(x_1) - g(x_2)| \\
 &\leq L_f \cdot M_g \cdot |x_1 - x_2| \\
 &+ M_f \cdot L_g \cdot |x_1 - x_2| \\
 &= \underbrace{(L_f M_g + M_f L_g)}_{= L_{fg}} \cdot |x_1 - x_2|
 \end{aligned}$$

Notera:

f Lipschitz med $L_f = A$
 $\Rightarrow f$ Lipschitz med $L_f = 2A$
 L_f är en konstant, inte nödv.
 den bästa!

Exempel: $f(x) = \underbrace{3x^3}_{f_1} + \underbrace{7x}_{f_2}$, $I = [3, 5]$

$$f_1(x) = 3x^3$$

$$f_2(x) = 7x$$

$$\begin{aligned}
 |f_1(x_1) - f_1(x_2)| &= |3x_1^3 - 3x_2^3| \\
 &= 3 \cdot |x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2| \cdot |x_1 - x_2| \\
 &\leq 3 \cdot (25 + 25 + 25) \cdot |x_1 - x_2| \\
 &= \underbrace{225}_{= L_{f_1}} \cdot |x_1 - x_2|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |f_2(x_1) - f_2(x_2)| &= |7x_1 - 7x_2| \\
 &= \underbrace{7}_{= L_{f_2}} \cdot |x_1 - x_2|
 \end{aligned}$$

$$\therefore L_f = 225 + 7 = \underline{\underline{232}}$$