

* Idag: Tentaräkning

F6

Gammal dugga från 7 september 1995 kl 14.15-18.15...

1. a) Bestäm rät linje $ax+by=c$ genom $(2,6)$ och $(5,-1)$

$$k = \frac{-1-6}{5-2} = \frac{-7}{3}$$

$$\Rightarrow y = kx + m \text{ med } k = -7/3 \Rightarrow 6 = -(7/3) \cdot 2 + m \Rightarrow m = 6 + 14/3$$

$$\therefore y = -(7/3)x + 6 + 14/3 \Leftrightarrow 3y = -7x + 18 + 14 \Leftrightarrow \underline{\underline{7x + 3y = 32}}$$

$$b) \frac{35^{15} \cdot 2^{16}}{14^{14} \cdot 25^7} = \frac{5^{15} \cdot 7^{15} \cdot 2^{16}}{2^{14} \cdot 7^{14} \cdot 5^{14}} = 5 \cdot 7 \cdot 4 = \underline{\underline{140}}$$

$$c) \frac{\frac{b^2}{a+b} + a-b}{1 - \frac{(a-b)^2}{(a+b)^2}} = \frac{b^2 \cdot (a+b) + (a-b)(a+b)^2}{(a+b)^2 - (a-b)^2} = \frac{(a+b) \cdot (b^2 + a^2 - b^2)}{2ab + 2ab}$$

$$= \frac{(a+b) \cdot a^2}{4ab} = \underline{\underline{\frac{a \cdot (a+b)}{4b}}}$$

d) $2y^2 - 3xy - 2x^2 = 0$

Bestäm $y = y(x)$:

$$y^2 - \frac{3x}{2}y - x^2 = 0$$

$$y = \frac{3x}{4} \pm \sqrt{\frac{9x^2}{16} + \frac{16x^2}{16}}$$

$$= \frac{3x}{4} \pm \frac{5x}{4} = \begin{cases} 2x & \text{eller} \\ -x/2 \end{cases}$$

e) Finn reella lösningar till

$$|5x + 4| = 3$$

$$\Leftrightarrow |x - (-4/5)| = 3/5$$

$$\Rightarrow x = \begin{cases} -4/5 + 3/5 \\ -4/5 - 3/5 \end{cases}$$

$$x = \begin{cases} -1/5 & \text{eller} \\ -7/5 \end{cases}$$

f) Förenkla:

$$\begin{aligned} & ((a^{-2}b^3)^3 \cdot b^{-4})^3 / \left(\sqrt{\frac{b^2}{a^4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{a}} \right)^2 \\ &= (a^{-6}b^9 \cdot b^{-4})^3 / \left(\frac{|b|}{a^2} \cdot a^{-1/4} \right)^{12} \\ &= a^{-18}b^{15} / (b^{12} \cdot a^{-24} \cdot a^{-3}) \\ &= a^{-18+24+3} \cdot b^{15-12} = \underline{\underline{a^9 \cdot b^3}} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a > 0 \\ b \neq 0 \end{cases}$$

2.a) Bestäm ekv. för tangenten till

$$y = \ln(5 - 9x + 4x^2) \text{ då } x = 2$$

$$\Rightarrow y' = \frac{-9 + 8x}{5 - 9x + 4x^2} = \frac{-9 + 16}{5 - 18 + 16} = \frac{7}{3} = k$$

$$y = kx + m = \frac{7}{3}x + m$$

$$\ln(5 - 18 + 16) = \frac{7}{3} \cdot 2 + m$$

$$m = \ln 3 - 14/3$$

$$\therefore y = \left(\frac{7}{3}\right)x + \ln 3 - 14/3$$

$$\Leftrightarrow 7x - 3y = 14 - 3 \ln 3$$

$$b) \quad \frac{2}{x-2} \geq \frac{3}{x^2-2x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{x-2} \geq \frac{3}{x \cdot (x-2)}, \quad x \neq 2$$

$$\underline{x > 2}$$

$$\underline{x < 2}$$

$$2 \geq 3/x$$

$$2 \leq 3/x$$

$$\Leftrightarrow x \geq 3/2$$

$$\therefore x > 2$$

$$\underline{x < 0}$$

$$\underline{0 < x < 2}$$

$$2x \geq 3$$

$$2x \leq 3$$

$$x \geq 3/2$$

$$x \leq 3/2$$



$$\therefore 0 < x \leq 5/2$$

$$\text{Svar: } \underline{\underline{0 < x \leq 3/2 \text{ eller } x > 2}}$$

3.a)

$$\tan 9x + \tan 5x = 0$$

$$\tan 9x = -\tan 5x = \tan(-5x)$$

$$9x = -5x + \pi n$$

$$14x = \pi n$$

$$\underline{\underline{x = \frac{\pi}{14} \cdot n, \quad n \in \mathbb{Z}}}$$

b)

$$\cos 9x + \sin 5x = 0$$

$$\begin{aligned} \cos 9x &= -\sin 5x = \sin(-5x) \\ &= \cos(\pi/2 + 5x) \end{aligned}$$

$$9x = \pm (\pi/2 + 5x) + 2\pi n$$

$$\begin{cases} 4x = \pi/2 + 2\pi n \Leftrightarrow x = \pi/8 + \frac{\pi}{2}n \\ 14x = -\pi/2 + 2\pi n \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{28} + \frac{\pi}{7}n \end{cases}$$

c)

$$\cos 9x + \cos 5x = 0$$

$$\cos 9x = -\cos 5x = \cos(\pi - 5x)$$

$$9x = \pm (\pi - 5x) + 2\pi n$$

$$14x = \pi + 2\pi n \Leftrightarrow x = \pi/14 + \frac{\pi}{7}n$$

$$4x = -\pi + 2\pi n \Leftrightarrow x = -\pi/4 + \frac{\pi}{2}n$$

$$\text{(Notera: Samma som } \underline{\underline{x = -\pi/14 + \pi/7n}} \\ \underline{\underline{x = \pi/14 + \pi/2n}})$$

$$4. a) \quad 27x^5 = 8x^2$$

$$x^2 \cdot (27x^3 - 8) = 0$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x_1 = x_2 = 0}} \text{ dubbelrot}$$

$$27x^3 - 8 = 0$$

$$x^3 = 8/27$$

$$(re^{i\theta})^3 = 8/27 \cdot e^{i \cdot 0}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt[3]{8/27} = 2/3 \\ 3\theta = 0 + 2\pi n \end{cases}$$

$$\theta = 0 + 2\pi n$$

$$\begin{cases} r = 2/3 \\ \theta = 2\pi/3 \quad n = 0, 2\pi/3, 4\pi/3 \end{cases}$$

$$\cos 2\pi/3 = \cos(\pi - \pi/3) = -\cos(\pi/3) = -\frac{1}{2}$$

$$\sin 2\pi/3 = \sin(\pi - \pi/3) = \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 4\pi/3 = -\frac{1}{2}$$

$$\sin 4\pi/3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\underline{\underline{x_3 = 2/3}}$$

$$x_4 = 2/3 \cdot \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \underline{\underline{\frac{-1 + \sqrt{3}i}{3}}}$$

$$x_5 = 2/3 \cdot \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \underline{\underline{\frac{-1 - \sqrt{3}i}{3}}}$$

$$b) \quad 2x + \ln(1 + e^{-x}) = 0$$

$$\text{Låt } \underline{\underline{z = e^{-x}}} \Rightarrow x = -\ln z$$

$$-2 \ln z + \ln(1 + z) = 0$$

$$\ln\left(\frac{1+z}{z^2}\right) = 0$$

$$\frac{1+z}{z^2} = 1 \Leftrightarrow 1+z = z^2$$

$$\Leftrightarrow z^2 - z - 1 = 0$$

$$z = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore x = -\ln\left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}\right)$$

$$= -\ln \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$= \ln \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \ln \frac{2 \cdot (1 - \sqrt{5})}{(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})}$$

$$= \ln \frac{2 \cdot (1 - \sqrt{5})}{1 - 5} = \underline{\underline{\ln\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)}}$$

5. Antag: x liter juice hälls från A

	Juice A	Vatten A	Juice B	Vatten B
1.	1 l	0	0	0
2.	$(1-x)$ l	0	x l	0
3.	$(1-x)$ l	0	x l	$(1-x)$ l (\Rightarrow andelen juice är x)
4.	$(1-x) + x \cdot x$ l	$x \cdot (1-x)$ l	$(x - x \cdot x)$ l	$((1-x) - x \cdot (1-x))$ l

Finns minimum för $(1-x) + x^2$, $x \in [0, 1]$

$$f(x) = 1 - x + x^2$$

$$f'(x) = -1 + 2x = 0 \Rightarrow x = 1/2, \text{ minimum ty } f''(x) > 0$$

$$\Rightarrow f(1/2) = 1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \underline{\underline{3/4}}$$

\therefore Svar: Minst 75%

$$6. \quad f(x) = \frac{x \cdot (x-2)^2}{(x+5)(x^2-1)}$$

$$* \text{ Singular vid } \begin{cases} x = -5 \\ x = \pm 1 \end{cases}$$

(Har asymptoter $x = -5$, $x = \pm 1$)

$$* \quad x \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 1 \quad (\text{asymptot})$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow 1 \quad (\text{asymptot})$$

* Kritiska punkter

$$f(x) = g(x)/h(x)$$

$$g(x) = x \cdot (x-2)^2 \Rightarrow g'(x) = (x-2)^2 + x \cdot 2(x-2) = (x-2) \cdot (x-2 + 2x) \\ = (x-2) \cdot (3x-2)$$

$$h(x) = (x+5)(x^2-1) \Rightarrow h'(x) = (x^2-1) + (x+5) \cdot 2x = 3x^2 + 10x - 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{g'h - hg'}{h^2} = \frac{(x-2)(3x-2) \cdot (x+5)(x^2-1) - x(x-2)^2 \cdot (3x^2 + 10x - 1)}{(x+5)^2(x^2-1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \quad \text{då } \underline{x=2} \quad \text{eller} \quad (3x-2)(x+5)(x^2-1) - x(x-2) \cdot (3x^2 + 10x - 1) = 0$$

$$0 = (3x-2) \cdot (x^3 - x + 5x^2 - 5) - x \cdot (3x^3 + 10x^2 - x - 6x^2 - 20x + 2)$$

$$= \cancel{3x^4} - \cancel{3x^2} + \underline{15x^3} - \underline{15x} - \cancel{2x^3} + \cancel{2x} - \underline{10x^2} + 10$$

$$- \cancel{3x^4} - \underline{10x^3} + \underline{x^2} + \underline{6x^3} + \underline{20x^2} - \cancel{2x}$$

$$= 9x^3 + 8x^2 - 15x + 10$$

Gissar lösning $x = -2$:

$$-9 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2 + 15 \cdot 2 + 10 = -72 + 32 + 30 + 10 = 0 \quad (\text{Vilken tur!!!})$$

Polynomdivision:

$$\begin{array}{r|l} & 9x^2 - 10x + 5 \\ x+2 & 9x^3 + 8x^2 - 15x + 10 \\ & \underline{9x^3 + 18x^2} \\ & -10x^2 - 15x + 10 \\ & \underline{-10x^2 - 20x} \\ & 5x + 10 \\ & \underline{5x + 10} \\ & 0 \end{array}$$

Lös ut rötterna:

$$9x^2 - 10x + 5 = 0$$

$$x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{9} = 0$$

$$x = -\frac{5}{9} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{9}\right)^2 - \frac{5}{9}}$$

\Rightarrow Saknar reella rötter.


\therefore Två kritiska punkter: $x = \pm 2$

Min eller max?

$x = +2$ är uppenbart lokalt min (faktor $(x-2)^2$), $f(2) = 0$

Från studie av asymptoter följer att

$$x = -2 \text{ är lokalt max, } f(-2) = \frac{(-2) \cdot (-2-2)^2}{(-2+5) \cdot (4-1)} = \frac{-2 \cdot 16}{3 \cdot 3} = \frac{-32}{9}$$





(Svår uppgift!)

7.

Liksidig triangel ABC

Visa att

$$|AP| = |BP| + |CP|$$


 Vi kan utan vidare anta att
 punkterna A, B, C ligger på enhetscirkeln:


$$A = (1, 0)$$

$$B = \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$C = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |AP|^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (0 - \sin \theta)^2 = 1 + \cos^2 \theta - 2\cos \theta + \sin^2 \theta \\ &= 2 - 2\cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |BP|^2 &= \left(-\frac{1}{2} - \cos \theta \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \sin \theta \right)^2 = \frac{1}{4} + \cos^2 \theta + \cos \theta + \frac{3}{4} + \sin^2 \theta - \sqrt{3} \sin \theta \\ &= 2 + \cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |CP|^2 &= \left(-\frac{1}{2} - \cos \theta \right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \sin \theta \right)^2 = \frac{1}{4} + \cos^2 \theta + \cos \theta + \frac{3}{4} + \sin^2 \theta + \sqrt{3} \sin \theta \\ &= 2 + \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta \end{aligned}$$

Vill visa att $|A| = |B| + |C|$

$$\Leftrightarrow |A|^2 = |B|^2 + |C|^2 + 2|B| \cdot |C|$$

$$\begin{aligned} |B|^2 + |C|^2 + 2|B| \cdot |C| &= 2 + \cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta + 2 + \cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta \\ &+ 2 \cdot \sqrt{(2 + \cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta) \cdot (2 + \cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta)} \\ &= 4 + 2\cos\theta + 2 \cdot \sqrt{(2 + \cos\theta)^2 - 3\sin^2\theta} \\ &= 4 + 2\cos\theta + 2 \cdot \sqrt{4 + \cos^2\theta + 4\cos\theta - 3(1 - \cos^2\theta)} \\ &= 4 + 2\cos\theta + 2 \cdot \sqrt{1 + 4\cos^2\theta + 4\cos\theta} \\ &= 4 + 2\cos\theta + 2 \cdot |1 + 2\cos\theta| \\ &= 4 + 2\cos\theta - 2 \cdot (1 + 2\cos\theta), \text{ ty } 2\cos\theta < -1 \\ &= 4 - 2 + 2\cos\theta - 4\cos\theta \\ &= 2 - 2\cos\theta = |A|^2 \end{aligned}$$

$$\therefore |A| = |B| + |C|$$



8. Antag att de reella talen är uppräkneliga.
 Speciellt är då de reella talen mellan 0 och 1 uppräkneliga.
 Låt x_n vara en uppräknning av de reella talen mellan 0 och 1
 för $n=1, 2, 3, \dots$

Bilda nu talet $y \in [0, 1)$ genom att välja första decimalen
 i y till något annat än första decimalen i x_1 . Fortsätt på samma
 sätt och välj decimal nummer n till något annat (t.ex. 9-d om
 decimalen är d) än decimal nummer n i x_n .

Ger då ett tal y som skiljer sig från x_n för $n=1, 2, 3, \dots$

$\Rightarrow y$ finns ej med i listan!

Detta är en motsägelse (ty listan antas innehålla samtliga
 reella tal).

\Rightarrow Antagandet är falskt, dvs
 de reella talen är ej uppräkneliga.

$$\begin{cases} x_1 = 0, d_1 * * * * \dots \\ x_2 = 0, * d_2 * * * \dots \\ x_3 = 0, * * d_3 * * \dots \\ \vdots \end{cases}$$

$$\text{Tag } y = 0, \underbrace{(9-d_1)(9-d_2)(9-d_3) \dots}_{\text{decimaler}}$$

Skrivning i Matematik (introduktionskursen) för **FEDK-1** den 7/9 1995
kl 14.15-18.15

Hjälpmedel: Inga, ej heller kalkylator. (OBS!)
Telefon:

OBS: Personnummer samt linje skall anges på skrivningslaget

- a) Bestäm på formen $ax + by = c$ en ekvation för räta linjen genom punkterna (2, 6) och (5, -1). (1p)

b) Beräkna (utan dosa) $\frac{35^{15} \cdot 2^{16}}{14^{14} \cdot 25^7}$. (1p)

c) Förenkla (så långt som möjligt) $\frac{b^2}{a+b} + \frac{a-b}{1 - \frac{(a-b)^2}{(a+b)^2}}$. (1p)

d) Bestäm $y = y(x)$, om $2y^2 - 3xy - 2x^2 = 0$. (1p)

e) Sök reella lösningar till ekvationen $|5x + 4| = 3$. (1p)

f) Förenkla så långt som möjligt $((a^2b^3)^3 \cdot b^{-4})^3 / \left(\frac{b^2}{\sqrt[4]{a^4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{a}} \right)^{12}$,
samt angiv villkor på a och b. (1p)
- a) Bestäm en ekvation för tangenten till kurvan $y = \ln(5 - 9x + 4x^2)$ i den punkt, där $x = 2$. (3p)

b) För vilka reella tal x gäller att $\frac{2}{x-2} \geq \frac{3}{x^2-2x}$? (3p)
- Bestäm alla lösningar till ekvationen

a) $\tan(9x) + \tan(5x) = 0$, (2p)

b) $\cos(9x) + \sin(5x) = 0$, (2p)

c) $\cos(9x) + \cos(5x) = 0$. (2p)
- a) Bestäm samtliga rötter till ekvationen $27x^5 = 8x^2$. (4p)

b) Sök reella lösningar till ekvationen $2x + \ln(1 + e^{-x}) = 0$. (4p)
- En literflaska A är full med (apelsin)juice. En del av juicen hålles från A i en tom literflaska B. Därefter fylles flaskan B med vatten (så att den blir full) och omskakas. Slutligen fyller man flaskan A med blandningen från flaskan B, så att A blir full. Hur många procent juice måste det minst finnas i flaskan A? (Motivera svaret!) (5p)
- Rita kurvan $y = f(x)$ (i sina huvuddrag) med angivande av (lokala) maxima och minimipunkter samt asymptoter, om $f(x) = \frac{x(x-2)^2}{(x+5)(x^2-1)}$. (7p)

VAR GOD VÄND!

7. En liksidig triangel ABC har hörn på en cirkel. Genom hörnet A drages en linje, som skär sidan BC och dessutom skär cirkeln i en punkt P. Bevisa att längden av sträckan AP är summan av längderna av BP och CP, dvs att $|AP| = |BP| + |CP|$, oberoende av var punkten P ligger (på cirkelbågen mellan B och C). (6p)

8. Visa att de reella talen mellan 0 och 1 är fler än uppräknligt många, dvs visa att det inte kan finnas en avbildning från de naturliga talen på mängden av reella tal mellan 0 och 1.
(Ledning: Skriv talen som decimalbråk. Genomför ett s.k. motsägelsebevis, dvs antag att påståendet inte gäller, och visa att detta i så fall leder till en motsägelse.) (6p)

/RP

Svar: a) $7x + 3y = 32$, b) 140

c) $\frac{a(a+b)}{4b}$ d) $y = 2x$ eller $y = -\frac{x}{2}$

e) $x_1 = -\frac{1}{5}$, $x_2 = -\frac{7}{5}$ f) $a^9 b^3$, $a > 0$, $b \neq 0$

2) a) $y - \ln 3 = \frac{7}{3}(x-2)$. b) $0 < x \leq \frac{3}{2}$, $x > 2$

3) a) $\frac{n\pi}{14}$ b) $\frac{\pi}{8} + n\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{28} + n\frac{\pi}{7}$ c) $\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{14} + \frac{n\pi}{7}$; (1 = helhet)

4) a) $x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = \frac{2}{3}$, $x_{4,5} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{3}$

b) $x = \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$

5) 75%

6) Asymptoter: $x \equiv -5$, $x \equiv \pm 1$ och $y \equiv 1$

Lok. max: $f(-2) = -\frac{32}{9}$; Lok. min: $f(2) = 0$

7) — 8) —