

TMV225 Inledande matematik M

Tentamen

Tentamen består av 10 st uppgifter vardera värda 3p och 4 st uppgifter vardera värda 5p, vilket tillsammans ger maximala 50p. Till detta läggs de bonuspoäng (maximalt 6p) som tjänats ihop genom kursens tre duggor. Betygsgränser är 20p (betyg 3), 30p (betyg 4) och 40p (betyg 5) för det sammanlagda resultatet.

Till de första tio uppgifterna (3p-uppgifter) skall endast svar ges. Svar måste anges i rätt ruta på den bifogade svarsblanketten. Lämna ej in lösningar eller kladdpapper till dessa uppgifter!

Till de sista fyra uppgifterna (5p-uppgifter) skall utförliga, tydliga och välskrivna lösningar ges. Renskriv dina lösningar, lämna ej in kladdpapper! Poängavdrag ges för dåligt motiverade, svårtolkade eller svårläsliga lösningar.

Några tips och generella regler:

- Gör först de uppgifter som du tycker är lätta.
- Dubbelkolla dina svar på de uppgifter där endast svar skall lämnas.
- Alla svar skall ges på enklast möjliga form (förenkla).

Lycka till!

Anders

TMV225 Inledande matematik M

Tentamensuppgifter

1. Lös olikheten $x^2 - 1 \leq x$. (3p)
 2. Bestäm minsta värdet för funktionen $f(x) = x^2(1-x)^2$ på intervallet $[0, 1]$. (3p)
 3. Bestäm (den bästa) Lipschitz-konstanten för funktionen $f(x) = 2 \sin(5x) \cos(5x)$. (3p)
 4. Skriv en MATLAB-funktion som implementerar numerisk derivata av en funktion f i en punkt x med steglängd h (argument f , x , h). (3p)
 5. Bestäm inversen till funktionen $f(x) = ax + b$. (3p)
 6. Bestäm en Lipschitz-konstant för funktionen $h = 5f + 10g$ om $L_f = 2$ och $L_g = 3$. (3p)
 7. Bestäm gränsvärdet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln((1+x)^2)}{\sin(x^2)}$. (3p)
 8. Bestäm värdet av serien $1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + \dots$. (3p)
 9. Bestäm en formel för Maclaurin-utvecklingen av $f(x) = \sin(x^2)$. (3p)
 10. Bestäm derivatan av $f(x) = \ln(\sin(\exp(x)))$ i punkten $x = \ln(\pi/3)$. (3p)
-

11. Skriv ett program som löser ekvationen $x^5 = 100$ (för $x \in \mathbb{R}$) med Newtons metod med cirka 10 decimalers noggrannhet. Programmet skall använda numerisk derivata. (5p)

Välj själv om derivatan skall beräknas genom att anropa en separat funktion eller om den skall beräknas direkt i scriptet. Om du väljer att anropa en separat funktion måste den funktionen också ges!

12. Formulera satsen om derivatan av en produkt. (1p) (5p)
Genomför beviset (4p).

13. Visa att derivatan av $\arcsin x$ ges av $1/\sqrt{1-x^2}$. (5p)

14. För en funktion f med Lipschitz-konstant L_f kan man definiera den så kallade *interpolanten* $\pi_h f$ av f på intervallet $[a, b]$ som (5p)

$$\pi_h f(x) = f(a)\lambda_a(x) + f(b)\lambda_b(x),$$

där $\lambda_a(x) = \frac{b-x}{b-a}$ och $\lambda_b(x) = \frac{x-a}{b-a}$.

(a) Visa att $f(x) = f(x) \cdot (\lambda_a(x) + \lambda_b(x))$. (1p)

(b) Visa feluppskattningen $|f(x) - \pi_h f(x)| \leq 2(b-a)L_f$ för $x \in [a, b]$. (2p)

(c) Visa den skarpare feluppskattningen $|f(x) - \pi_h f(x)| \leq \frac{b-a}{2}L_f$ för $x \in [a, b]$. (2p)

Om du visar (c) ges full poäng utan att (b) behöver visas separat!

TMV225 Inledande matematik M

Svar till tentamensuppgifter 1-10

Tentamenskod:

Uppgift	Svar	Poäng
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

$$1. \quad x^2 - 1 \leq x$$

$$x^2 - x - 1 \leq 0$$



Finna nollställena

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \text{Svar: } \underline{\underline{\frac{1-\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{5}}{2}}}}$$

$$2. \quad f(x) = x^2 \cdot (1-x)^2 = (x \cdot (1-x))^2$$

Maximum

Minimum då $x = \frac{1}{2} \in [0, 1]$

$$\Rightarrow \text{max } f = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \underline{\underline{\frac{1}{16}}}$$

Svar: Minsta värdet
är $f(x) = 0$. Antas
då $x = 0$ eller $x = 1$.
(Tryckfel i texten: skulle
stå: Bestäm minsta värdet!)

$$3. \quad f(x) = 2 \sin(5x) \cos(5x) = \sin(10x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = 10 \cos(10x)$$

$$\Rightarrow |f'| \leq 10$$

$$\therefore \text{Svar: } \underline{\underline{L_f = 10}}$$

4. function $y = \text{derivata}(f, x, h)$

$$y = (f(x+h) - f(x)) / h$$

5.

$$y = ax + b$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{y-b}{a} \quad (a \neq 0)$$

$$\therefore \text{Svar: } \underline{\underline{f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}}}$$

6.

$$L_h = L(5f + 10g) = 5L_f + 10L_g$$

$$= 10 + 30 = \underline{\underline{40}}$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln((1+x)^2)}{\sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+x)}{\sin x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot (x + O(x^2))}{x^2 + O(x^6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + O(x^3)}{x^2 + O(x^6)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + O(x)}{1 + O(x^4)} = \underline{\underline{2}}$$

8.

$1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + \dots = \{ \text{Geometrisk serie} \}$

$$= \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{2/3} = \underline{\underline{3/2}}$$

9.

$$\sin(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(x^2)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \underline{\underline{\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{4k+2}}{(2k+1)!}}}$$

10.

(3)

$$f(x) = \ln \sin \exp x$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{\cos \exp x \cdot \exp x}{\sin \exp x}$$

$$x = \ln(\pi/3)$$

$$\exp x = \pi/3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= \frac{\cos(\pi/3) \cdot \pi/3}{\sin(\pi/3)} = \frac{1/2 \cdot \pi/3}{\sqrt{3}/2} \\ &= \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \end{aligned}$$

11.

$$x^5 = 100$$

$$x^5 - 100 = 0$$

$$F(x) = x^5 - 100 = 0$$

```

x = 1;
tol = 1e-10; h = sqrt(tol);
dx = 2 * tol;
while abs(dx) > tol
    F = x^5 - 100;
    dF = ((x+h)^5 - x^5) / h;
    dx = F / dF;
    x = x - dx;
end

```

12. Se föreläsninganteckningar!

(4)

13. $y = \arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$

$$x = \sin y \in [-1, 1]$$

$$\frac{dx}{dy} = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$$

↑
ty $y \in [-\pi/2, \pi/2]$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \square$$

14. a) $\lambda_a(x) + \lambda_b(x) = \frac{b-x}{b-a} + \frac{x-a}{b-a} = \frac{b-x+x-a}{b-a} = 1$

$$\Rightarrow f(x) = f(x) \cdot \underbrace{(\lambda_a(x) + \lambda_b(x))}_{=1}$$

b) $|f(x) - \pi_n f(x)| = \left| \underbrace{f(x) \cdot (\lambda_a(x) + \lambda_b(x))}_{\text{enligt a)}} - (f(a)\lambda_a(x) + f(b)\lambda_b(x)) \right|$

$$= |(-f(x) + f(a))\lambda_a(x) + (f(x) - f(b))\lambda_b(x)|$$

$$\leq |f(x) - f(a)| |\lambda_a(x)| + |f(x) - f(b)| |\lambda_b(x)|$$

$$\leq L_f \cdot |x-a| \cdot |\lambda_a(x)| + L_f \cdot |x-b| \cdot |\lambda_b(x)|$$

$$\leq L_f \cdot (|b-a| \cdot 1 + |b-a| \cdot 1)$$

$$= 2 L_f \cdot |b-a|$$

c) Från b) vet vi att

(5)

$$|f(x) - \Pi_n f(x)| \leq L_f \cdot |x-a| \cdot |\lambda_a(x)| + L_f \cdot |x-b| \cdot |\lambda_b(x)|$$

Notera:

$$|x-a| \cdot |\lambda_a(x)| = \frac{|x-a| \cdot |x-b|}{|b-a|}$$

antar maximum då $x = \frac{a+b}{2}$

$$\Rightarrow |x-a| \cdot |\lambda_a(x)| \leq \frac{|\frac{a+b}{2} - a| \cdot |\frac{a+b}{2} - b|}{|b-a|}$$

$$= \frac{(b-a)/2 \cdot (b-a)/2}{b-a} = \frac{b-a}{4}$$

På samma sätt: $|x-b| \cdot |\lambda_b(x)| \leq \frac{b-a}{4}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |f(x) - \Pi_n f(x)| &\leq L_f \cdot \left(\frac{b-a}{4} + \frac{b-a}{4} \right) \\ &= L_f \cdot \frac{b-a}{2} \end{aligned}$$

