

Föreläsningsanteckningar  
i  
distributionsteori

Hasse Carlsson

Version 2005



# Inledning

Två viktiga metoder i analys är derivering och Fouriertransformering. Tyvärr är inte alla funktioner deriverbara och Fouriertransformerbara. Distributionsteorins syfte är att lösa detta genom att bädda in funktionerna i en större klass av objekt, de så kallade distributionerna. Den grundläggande idén är att inte uppfatta en funktion som punktvis definierad utan som ett ”medelvärde”. En lokalt integrerbar funktion  $f$  identifieras med avbildningen

$$\varphi \mapsto \int f\varphi,$$

där  $\varphi$  tillhör ett rum av ”snälla” testfunktioner (t.ex.  $C_0^\infty$ ).

Vi generaliserar nu detta och låter en distribution vara en linjär funktional på rummet av testfunktioner. När vi skall utvidga operationer som derivering och Fouriertransformering till distributioner, gör vi det genom att föra över operationen på testfunktionerna, där de är väldefinierade.

Låt oss t.ex. se hur man definierar derivatan av en lokalt integrerbar funktion  $f$  på  $\mathbb{R}$ . Om  $f$  är kontinuerligt deriverbar, så ger partiell integration

$$\int f\varphi = - \int f\varphi'.$$

Vi använder nu denna formel för att *definiera* derivatan av  $f$ , då  $f$  saknar derivata i klassisk mening.  $f'$  är den avbildning som ges av

$$\varphi \mapsto - \int f\varphi'.$$

I dessa föreläsningar skall vi studera hur differentialkalkylen och Fourieranalysen kan utvidgas till distributioner, och studera olika tillämpningar, framförallt inom teorin för differentialekvationer. Framställningen är kortfattad och för ett mer djupgående studium rekommenderas följande böcker:

Laurent Schwartz. Théorie des Distributions I, II. Hermann, Paris, 1950–51.

Lars Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators I, 2nd ed. Springer, Berlin, 1990.

# Innehåll

1	Något om $C_0^\infty$ -funktioner	6
2	Definition av distributioner	11
3	Operationer på distributioner	17
4	Ändliga delen av en funktion	21
5	Fundamentallösningar till Laplace och värmeledningsoperatorerna	28
6	Distributioner med kompakt stöd	32
7	Konvergens av distributioner	33
8	Faltning av distributioner	37
9	Fundamentallösningar	44
10	Fouriertransformen	48
11	Fouriertransformen på $L^2$	56
12	Fouriertransformen och faltningar	58
13	Paley-Wieners sats	64
14	Existens av fundamentallösningar	67
15	Fundamentallösningar till elliptiska differentialoperatorer	69
16	Fourierserier	71

<b>17 Några tillämpningar</b>	<b>75</b>
17.1 Centrala gränsvärdessatsen . . . . .	75
17.2 Medelvärdesegenskapen för harmoniska funktioner . . . . .	77
17.3 Heisenbergs osäkerhetsrelation . . . . .	77
17.4 Något om Sobolevolikheter . . . . .	79
17.5 Minkowskis sats . . . . .	80

# Kapitel 1

## Något om $C_0^\infty$ -funktioner

När vi skall utvidga differentialkalkylen till distributioner, är det lämpligt att som testfunktioner välja oändligt deriverbara funktioner med kompakt stöd. I detta kapitel skall vi visa att det finns "en massa"  $C_0^\infty$ -funktioner.

### Beteckningar

Låt  $\Omega$  vara ett område i  $\mathbb{R}^n$ .  $C^k(\Omega)$  är de  $k$  gånger kontinuerligt deriverbara funktionerna på  $\Omega$ . ( $k$  kan vara  $+\infty$ .)  $C_0^k(\Omega)$  är de funktioner i  $C^k(\Omega)$  som har kompakt stöd. Vi betecknar punkter i  $\mathbb{R}^n$  med  $x = (x_1, \dots, x_n)$  och låter  $dx = dx_1 \dots dx_n$  vara Lebesguemåttet. För en vektor  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$  sätter vi

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$$

och

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} f.$$

**Exempel 1.1.** Med dessa beteckningar kan Taylorpolynomet av grad  $N$  till  $f$  skrivas

$$\sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} x^\alpha.$$

□

Som beskrivits i inledningen, vill vi till  $f \in L_{\text{lok}}^1$  associera avbildningen  $\Lambda_f$ , given av

$$\varphi \mapsto \int f\varphi, \quad \varphi \in C_0^\infty.$$

**Problem.** Bestämmer  $\Lambda_f f$ ?

Mer precist, om  $f, g \in L^1_{\text{lok}}$  och

$$\int f\varphi = \int g\varphi, \quad \varphi \in C_0^\infty,$$

är då  $f = g$  n.ö.? □

För att kunna lösa detta problem behöver vi konstruera lämpliga  $\varphi \in C_0^\infty$ . Vi börjar med

**Exempel 1.2.** Det finns funktioner  $f \in C^\infty(\mathbb{R})$  med  $f(x) = 0$  om  $x \leq 0$  och  $f(x) > 0$  då  $x > 0$ .

**Anmärkning 1.3.** Det finns ingen sådan reellanalytisk funktion. □

*Bevis.* En sådan funktion måste uppfylla  $f^{(n)}(0) = 0$  för alla  $n$ . Så  $f(x) = o(x^n), x \rightarrow 0$ , för alla  $n$ . Med ledning av detta sätter vi

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Vi måste visa att  $f \in C^\infty$ . Med induktion ser man att

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

för något polynom  $P_n$ . Detta är klart för  $x \neq 0$ . Men i origo har vi för  $h > 0$ ,

$$\frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \frac{1}{h} P_n\left(\frac{1}{h}\right) e^{-\frac{1}{h}} \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$


□

**Exempel 1.4.** Det finns icke-triviala funktioner i  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

*Bevis.* Låt  $f$  vara som i Exempel 2 och sätt  $\varphi(x) = f(1 - |x|^2)$ . □

## Approximativa identiteter

Fixera en funktion  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  med  $\int \varphi = 1$  och  $\varphi \geq 0$ . För  $\delta > 0$  sätter vi  $\varphi_\delta(x) = \delta^{-n}\varphi(x/\delta)$ . Då är  $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  och  $\int \varphi_\delta = 1$ .  $\{\varphi_\delta; \delta > 0\}$  kallas en approximativ identitet.



## Regularisering genom faltning

Faltningen av två funktioner  $f$  och  $\varphi$  definieras genom

$$f * \varphi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\varphi(y)dy.$$

Faltningen är väldefinierad till exempel om  $f \in L_{\text{lok}}^1$  och  $\varphi \in C_0^\infty$ . Då är  $f * \varphi = \varphi * f$ ,  $f * \varphi \in C^\infty$  och  $\partial^\alpha(f * \varphi) = f * \partial^\alpha\varphi$ .

**Övning 1.1.** Verifiera detta.

**Sats 1.5.**

- Om  $f \in C_0$  så  $f * \varphi_\delta \rightarrow f$ ,  $\delta \rightarrow 0$ , likformigt.
- Om  $f$  är kontinuerlig i  $x$ , så  $f * \varphi_\delta(x) \rightarrow f(x)$ ,  $\delta \rightarrow 0$ .
- Om  $f \in L^p$ ,  $1 \leq p < +\infty$ , så  $f * \varphi_\delta \rightarrow f$  i  $L^p$  (och n.ö.).

**Anmärkning 1.6.** a) visar att  $C_0^\infty(\Omega)$  är tätt i  $C_0(\Omega)$  ( i supremumnorm).

**Övning 1.2.** Verifiera detta.



*Bevis.*

a) Tag  $R$  så att stöd  $\varphi \subset \{x; |x| \leq R\}$ . Vi har

$$\begin{aligned} |f * \varphi_\delta(x) - f(x)| &\leq \int_{|y| \leq \delta R} |f(x-y) - f(x)| \varphi_\delta(y) dy \\ &\leq \text{likformig kontinuitet} \leq \epsilon \int \varphi_\delta(y) dy = \epsilon, \text{ om } \delta \text{ är tillräckligt litet.} \end{aligned}$$

b) Övning 1.3

c) Jensens olikhet ger

$$\begin{aligned} |f * \varphi_\delta(x) - f(x)|^p &\leq \left( \int |f(x-y) - f(x)| \varphi_\delta(y) dy \right)^p \\ &\leq \int |f(x-y) - f(x)|^p \varphi_\delta(y) dy = \int |f(x\delta t) - f(x)|^p \varphi(t) dt. \end{aligned}$$

Med Fubinis sats och  $f^{\delta t}(x) = f(x - \delta t)$ , får vi

$$\begin{aligned} \|f * \varphi_\delta - f\|_p^p &\leq \int \varphi(t) dt \int |f(x - \delta t) - f(x)|^p dx \\ &= \int \|f^{\delta t} - f\|_p^p \varphi(t) dt \rightarrow 0, \end{aligned}$$

på grund av dominerad konvergens och att translation är kontinuerlig på  $L^p$ . Det sista påståendet följer av att  $C_0$  är tätt i  $L^p$ ,  $1 \leq p < +\infty$ :

Om  $g \in C_0$  så är

$$\|g^\delta - g\|_p^p = \int_K |g(x - \delta) - g(x)|^p dx \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0,$$

på grund av likformig konvergens. Approximera nu  $f \in L^p$  med  $g \in C_0$ ,  $\|f - g\|_p < \epsilon$ . Minkowskis olikhet (triangelolikheten) ger

$$\|f^\delta - f\|_p \leq \|f^\delta - g^\delta\|_p + \|g^\delta - g\|_p + \|g - f\|_p \leq 2\epsilon + \|g^\delta - g\|_p \leq 3\epsilon,$$

om  $\delta$  är nog litet. □

**Övning 1.4.** a) Låt  $B_r = \{x; |x| < r\}$ . Konstruera en funktion  $\psi_\delta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  så att  $0 \leq \psi_\delta \leq 1$ ,  $\psi_\delta = 1$  på  $B_r$  och stöd  $\psi_\delta \subset B_{r+\delta}$ . Hur stor måste  $\|\delta^\alpha \psi_\delta\|_\infty$  vara?

b) Låt  $K \subset \Omega$  där  $K$  är kompakt och  $\Omega$  öppen i  $\mathbb{R}^n$ . Konstruera  $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$  med  $\psi = 1$  på en omgivning av  $K$  och  $0 \leq \psi \leq 1$ . Hur stor måste  $\|\partial^\alpha \psi\|_\infty$  vara?

Vi kan nu svara ja på problemet på sid. 6.

**Sats 1.7.** *En lokalt integrerbar funktion som är 0 som distribution är 0 n.ö.*

*Bevis.* Vi antar alltså att  $\int f\varphi = 0$  för alla  $\varphi \in C_0^\infty$ . Enligt Sats 1 a), följer  $\int f\Phi = 0$  för alla  $\Phi \in C_0$ , och alltså är  $f = 0$  n.ö. (t.ex. med hjälp av Riesz representationsats.) Alternativt kan vi argumentera på följande sätt: Tag  $\psi_n \in C_0^\infty$  med  $\psi_n(x) = 1$  då  $|x| \leq n$ . Då är  $f\psi_n \in L^1$  och

$$f\psi_n * \varphi_\delta(x) = \int f(y)\psi_n(y)\varphi_\delta(x-y)dy = 0,$$

eftersom  $y \mapsto \psi_n(y)\varphi_\delta(x-y)$  är  $C_0^\infty$ . Men  $f\psi_n * \varphi_\delta \rightarrow f\psi_n$  i  $L^1$  enligt Sats 1 c). Så  $f\psi_n = 0$  n.ö., och alltså är  $f = 0$  n.ö.  $\square$

# Kapitel 2

## Definition av distributioner

**Definition 2.1.** Låt  $\Omega$  vara ett öppet område i  $\mathbb{R}^n$ . En *distribution*  $u$  i  $\Omega$  är en linjär funktional på  $C_0^\infty(\Omega)$ , sådan att för varje kompakt mängd  $K \subset \Omega$  finns konstanter  $C$  och  $k$  med

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty, \quad (2.1)$$

för alla  $\varphi \in C_0^\infty$  med stöd  $\varphi \subset K$ .  $\square$

Distributionerna på  $\Omega$  betecknas  $\mathcal{D}'(\Omega)$ . Om samma  $k$  kan användas för alla  $K$ , säger vi att  $u$  har ordning  $\leq k$ . Dessa distributioner betecknas  $\mathcal{D}'_k(\Omega)$ . Det minsta  $k$  som kan användas kallas distributionens ordning.  $\mathcal{D}'_F = \cup_k \mathcal{D}'_k$  är distributionerna av ändlig ordning.

### Exempel 2.2.

- (a) En funktion  $f \in L^1_{\text{lok}}$  är en distribution av ordning 0.
- (b) Ett mått är en distribution av ordning 0.
- (c)  $u(\varphi) = \partial^\alpha \varphi(x_0)$  definierar en distribution av ordning  $|\alpha|$ .
- (d) Låt  $x_j$  vara en följd utan hopningspunkt i  $\Omega$  och sätt

$$u(\varphi) = \sum \partial^{\alpha_j} \varphi(x_j).$$

Då är  $u$  en distribution.  $u$  har ändlig ordning om och endast om  $\sup |\alpha_j| < \infty$  och då är ordningen  $\sup |\alpha_j|$ .  $\square$

Vi kommer att använda beteckningen  $\mathcal{D}(\Omega)$  för att beteckna mängden  $C_0^\infty(\Omega)$ , i synnerhet då vi förser  $\mathcal{D}(\Omega)$  med en topologi som svarar mot följande konvergensbegrepp.

**Definition 2.3.**  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\Omega)$  om alla  $\varphi_j$  har stöd i någon fix kompakt mängd och  $\|\partial^\alpha \varphi_j\|_\infty \rightarrow 0$ ,  $j \rightarrow \infty$ , för alla  $\alpha$ .  $\square$

**Sats 2.4.** En linjär funktional  $u$  på  $\mathcal{D}(\Omega)$  är en distribution om  $u(\varphi_j) \rightarrow 0$  då  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\Omega)$ .

*Bevis.*  $\Rightarrow$ ): Trivialt.

$\Leftarrow$ ): Vi antar att (1) inte gäller, och skall visa att  $u(\varphi_j) \not\rightarrow 0$ , trots att  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\Omega)$ . Att (1) inte gäller medför att det finns en kompakt mängd  $K$  och  $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$  med stöd  $\varphi_j \subset K$ ,  $u(\varphi_j) = 1$  och

$$|u(\varphi_j)| > j \sum_{|\alpha| \leq j} \|\partial^\alpha \varphi_j\|_\infty.$$

Detta ger  $\|\partial^\alpha \varphi_j\|_\infty \leq \frac{1}{j}$  om  $j \geq |\alpha|$ . Så  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\Omega)$ .  $\square$

**Sats 2.5.** En distribution  $u \in \mathcal{D}'_k(\Omega)$  kan entydigt utvidgas till en linjär funktional på  $C_0^k(\Omega)$  sådan att för varje kompakt mängd  $K \subset \Omega$  finns en konstant  $C$  så att

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty, \quad (2.2)$$

för alla  $\varphi \in C_0^k(\Omega)$  med stöd i  $K$ .

**Korollarium 2.6.** Mått och distributioner av ordning 0 sammanfaller.

*Bevis.* Låt  $\varphi$  vara en fix funktion i  $C_0^k(\Omega)$ . Låt  $\Phi_\delta \in C_0^\infty$  vara en approximativ identitet och sätt  $\varphi_n = \varphi * \Phi_{\frac{1}{n}}$ ,  $n \geq N$ . Då har alla  $\varphi_n$  stöd i en fix kompakt mängd  $K$  i  $\Omega$  och om  $|\alpha| \leq k$  så är

$$\|\partial^\alpha(\varphi - \varphi_n)\|_\infty = \|\partial^\alpha \varphi - (\partial^\alpha \varphi) * \Phi_{\frac{1}{n}}\|_\infty \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.3)$$

Så om  $u$  har en utvidgning som uppfyller (2) gäller  $u(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(\varphi_n)$ .

Omvänt definierar vi  $u(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(\varphi_n)$ . Gränsvärdet existerar ty  $u(\varphi_n)$  är en Cauchy följd:

$$|u(\varphi_n) - u(\varphi_m)| = |u(\varphi_n - \varphi_m)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha(\varphi_n - \varphi_m)\| \rightarrow 0,$$

då  $n, m \rightarrow \infty$ . Att  $u(\varphi)$  är oberoende av följderna  $\varphi_n$  och alltså väldefinierad ser vi genom att mixa två följderna  $\varphi_n$  och  $\tilde{\varphi}_n$ .

Det är lätt att genom gränsovergång i (1) se att  $u$  uppfyller (2).  $\square$

**Övning 2.1.** Verifiera detta.

**Sats 2.7.** *En positiv distribution är ett positivt mått.*

**Definition 2.8.** En distribution  $u$  är *positiv* om  $u(\varphi) \geq 0$  då  $\varphi \geq 0$ .  $\square$

*Bevis.* Enligt Korollarium 6 räcker det att visa att  $u \in \mathcal{D}'_0$ . Antag först att  $\varphi$  är reellvärd och låt  $K \subset\subset \Omega$  och tag  $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$ ,  $0 \leq \chi \leq 1$  och  $\chi = 1$  på  $K$ . Om stöd  $\varphi \subset K$  så är  $\chi\|\varphi\|_\infty \pm \varphi \geq 0$ . Så  $u(\chi\|\varphi\|_\infty \pm \varphi) \geq 0$ , eller

$$|u(\varphi)| \leq u(\chi\|\varphi\|_\infty) = u(\chi)\|\varphi\|_\infty,$$

så (1) gäller med  $k = 0$ ,  $C = u(\chi)$ .

Om  $\varphi = f + ig$  är komplexvärd, får vi

$$|u(\varphi)| \leq |u(f)| + |u(g)| \leq u(\chi)(\|f\|_\infty + \|g\|_\infty) \leq 2u(\chi)\|\varphi\|_\infty.$$

$\square$

**Sats 2.9.** *En distribution är bestämd av sitt lokala beteende.*

*Mer precist: Antag att  $\Omega = \cup \Omega_i$  och att  $u_i \in \mathcal{D}'(\Omega_i)$ . Vidare antar vi att  $u_i = u_j$  på  $\Omega_i \cap \Omega_j$ , dvs om  $\varphi \in C_0^\infty(\Omega_i \cap \Omega_j)$  så är  $u_i(\varphi) = u_j(\varphi)$ . Då finns en entydig distribution  $u$  på  $\Omega$  med  $u = u_i$  på  $\Omega_i$ .*

För att bevisa detta behöver vi en  $C_0^\infty$ -partition av enheten.

**Proposition 2.10.** *Låt  $K \subset \cup_1^N \Omega_i$ . Då finns  $\varphi_i \in C_0^\infty(\Omega_i)$ ,  $0 \leq \varphi_i \leq 1$  och  $\sum \varphi_i = 1$  på  $K$ .*

*Bevis av Sats 9.* Antag att  $u = u_i$  på  $\Omega_i$ . Låt stöd  $\varphi = K$  och  $\varphi_i$  vara en partition av enheten som ovan. Linjäriteten ger, eftersom  $\varphi = \sum_i \varphi_i$ ,

$$u(\varphi) = \sum_i u(\varphi_i) = \sum_i u_i(\varphi_i) \quad (2.4)$$

Detta visar entydigheten.

För att visa existensen, behöver vi visa att (4) ger en väldefinierad distribution  $u$ . Men om  $\tilde{\varphi}_k$  är en annan partition av enheten, så är  $\tilde{\varphi}_k = \sum_i \varphi_i \tilde{\varphi}_k$  på  $K$  och alltså  $\sum_k u_k(\varphi \tilde{\varphi}_k) = \sum_k \sum_i u_k(\varphi \tilde{\varphi}_k \varphi_i) = \sum_i \sum_k u_i(\varphi \tilde{\varphi}_k \varphi_i) = \sum_i u_i(\varphi \varphi_i)$ , så (4) definerar  $u$  entydigt.

Det är enkelt att visa att  $u$  uppfyller (1), och satsen är bevisad.  $\square$

**Övning 2.2.** Gör det!

*Bevis av Proposition 10.* Vi skall visa följande

*Påstående.* Det finns öppna mängder  $V_i$  med  $\bar{V}_i \subset \Omega_i$  och  $K \subset \cup_1^N V_i$ .

Givet detta tag  $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty(\Omega_i)$ ,  $0 \leq \tilde{\varphi}_i \leq 1$  med  $\tilde{\varphi}_i = 1$  på  $\bar{V}_i$ . Då är  $\sum \tilde{\varphi}_i > 0$  på en omgivning  $U$  av  $K$ . Tag  $\chi$  med  $\chi = 1$  på  $K$  och stöd  $\chi \subset U$ . Sätt

$$\varphi_i = \chi \frac{\tilde{\varphi}_i}{\sum \tilde{\varphi}_i}.$$

Det är klart att  $\varphi_i$  uppfyller villkoren i propositionen.

För att visa påståendet, så tag till  $x \in K$  en omgivning  $V_x$  med  $x \in V_x \subset \bar{V}_x \subset \Omega_j$  för något  $j$ . Då är  $K \subset \cup V_x$ . Kompakthet ger  $K \subset \cup_1^N V_{x_k}$ . Låt  $V_i = \bigcup_{V_{x_k} \subset \Omega_i} V_{x_k}$ .  $\square$

## Stödet till en distribution

Om  $f \in C$  så är stöd  $f = \overline{\{x; f(x) \neq 0\}}$ . Detta medför att  $\int f \varphi = 0$  för alla  $\varphi \in C_0^\infty$  vars stöd inte råkar stödet till  $f$ .

**Definition 2.11.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  är stöd  $u = \{x \in \Omega; \text{Det finns ingen omgivning till } x \text{ med } u = 0 \text{ i omgivningen.}\}$

**Övning 2.3.** stöd  $u$  är sluten.

**Sats 2.12.** Om stöd  $u \cap \text{stöd } \varphi = \emptyset$  så är  $u(\varphi) = 0$ .

*Bevis.* Följer direkt från Sats 9, eftersom  $u = 0$  lokalt på  $\Omega \setminus \text{stöd } u$ .  $\square$

En viktig skärpning av Sats 12 är följande sats och dess korollarium.

**Sats 2.13.** Antag att  $u \in \mathcal{D}'_k(\Omega)$  och  $\varphi \in C_0^k(\Omega)$  med  $\partial^\alpha \varphi(x) = 0$  om  $|\alpha| \leq k$  och  $x \in \text{stöd } u$ . Då är  $u(\varphi) = 0$ .

**Korollarium 2.14.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  och stöd  $u = \{x_0\} \subset \Omega$  så är  $u$  av formen

$$u(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha \partial^\alpha \varphi(x_0).$$

*Bevis av Sats 13.* Låt  $K = \text{stöd } u \cap \text{stöd } \varphi$ . Om  $K = \emptyset$  så följer påståendet från Sats 5. Men  $K$  kan vara icke-tom. Sätt då  $K_\epsilon = \{x; d(x, K) < \epsilon\}$  och tag  $\chi_\epsilon \in C_0^\infty(K_\epsilon)$  med  $\chi_\epsilon = 1$  i en omgivning av  $K$ . Då gäller

$$u(\varphi) = u(\chi_\epsilon \varphi + (1 - \chi_\epsilon) \varphi) = u(\chi_\epsilon \varphi),$$

enligt Sats 5.

Om  $k = 0$  ger detta

$$|u(\varphi)| \leq C \|\chi_\epsilon \varphi\|_\infty \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0.$$

Om  $k > 0$  får vi i stället

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha(\chi_\epsilon \varphi)\|_\infty \leq C \sum_{|\alpha|+|\beta| \leq k} \|\partial^\alpha \chi_\epsilon \partial^\beta \varphi\|_\infty.$$

Vi kan välja  $\chi_\epsilon$  så att  $\|\partial^\alpha \chi_\epsilon\|_\infty \leq C\epsilon^{-|\alpha|}$ . För att uppskatta  $\|\partial^\beta \varphi\|_\infty$  skall vi Taylorutveckla  $\varphi$  kring  $x \in K$ . Låt  $y \in K_\epsilon$  och tag  $x \in K$  med  $|x - y| \leq \epsilon$ . Sätt

$$g(t) = \partial^\beta \varphi(x + t(y - x)),$$

och Taylorutveckla  $g$  kring  $t = 0$  av ordning  $k - |\beta| - 1$ . Vi får

$$|\partial^\beta \varphi(y)| = |g(1)| = \left| \sum_{i \leq k - |\beta| - 1} \frac{g^{(i)}(0)}{i!} + R(y) \right|.$$

Nu är  $g^{(i)}(0) = 0$  och

$$|R(y)| \leq C \sup_{0 \leq s \leq 1} |\partial^{k-|\beta}| g(s)| \leq C \epsilon^{k-|\beta|} \sum_{|\beta|=k} \|\partial^\beta \varphi\|_{K_\epsilon}.$$

Detta ger

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha|+|\beta| \leq k} \epsilon^{k-|\alpha|-|\beta|} \sum_{|\beta|=k} \|\partial^\beta \varphi\|_{K_\epsilon} \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0.$$

□

*Bevis av Korollariet.*  $u$  har ändlig ordning  $k$ . Fixera  $\chi \in C_0^\infty(\Omega)$  med  $\chi = 1$  nära  $x_0$  och sätt

$$\psi(x) = \varphi(x) - \chi(x) \sum_{|\alpha| \leq k} (x - x_0)^\alpha \frac{\partial^\alpha \varphi(x_0)}{\alpha!}.$$

Då är  $\partial^\alpha \psi(x_0) = 0$  om  $|\alpha| \leq k$ . Så Sats 13 ger  $u(\psi) = 0$  eller

$$u(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq k} \partial^\alpha \varphi(x_0) u\left(\frac{(x - x_0)^\alpha}{\alpha!} \chi(x)\right) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha \partial^\alpha \varphi(x_0).$$

□

**Övning 2.4.** H 2.2

**Övning 2.5.** H 3.1.7.

**Övning 2.6.** Visa att  $u(\varphi) = \sum_1^\infty n^\alpha (\varphi(\frac{1}{n}) - \varphi(-\frac{1}{n}))$  är en distribution av ordning  $\leq 1$  om  $\alpha < 0$ . Visa att stöd  $u = \{0, \pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}, \dots\}$  men om  $K$  är en sluten mängd med

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{i=0}^k \sup_K |\partial^i \varphi|, \quad \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

så är antingen  $\alpha < -1$  eller så innehåller  $K$  en omgivning av origo. (Speciellt kan vi inte välja  $K = \text{stöd } u$ .)

**Övning 2.7.** Antag att  $u \in \mathcal{D}'_k(\mathbb{R})$  och stöd  $u \subset I$  där  $I$  är ett kompakt intervall. Visa att

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_I |\partial^\alpha \varphi|, \quad \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}).$$

(Ledning. Sats 13.)

**Övning 2.8.** Finns det en linjär funktional  $u$  på  $C_0^\infty$  som inte är en distribution?



# Kapitel 3

## Operationer på distributioner

### Distributionsderivatan

Om  $u$  är en kontinuerligt deriverbar funktion i  $\mathbb{R}^n$ , får vi med partiell integration,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \partial_k u \cdot \varphi dx = - \int_{\mathbb{R}^n} u \cdot \partial_k \varphi dx, \quad \varphi \in \mathcal{D},$$

eftersom  $\varphi$  har kompakt stöd. Vi gör därför följande

**Definition 3.1.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , definierar vi  $\partial_k u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  genom

$$\partial_k u(\varphi) = -u(\partial_k \varphi).$$

Att detta definerar en distribution följer av att

$$|\partial_k u(\varphi)| = |u(\partial_k \varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha (\partial_k \varphi)\|_\infty \leq C \sum_{|\alpha| \leq k+1} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty.$$

Om  $u \in C^1$  sammanfaller distributionsderivatan med den klassiska derivatan.

**Exempel 3.2.** Definiera Heavisidefunktionen  $H$  genom

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Då är

$$H'(\varphi) = -H(\varphi') = - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0).$$

Diracmättet i  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  är det mått som ges av  $\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0)$ . Så vi har visat att  $H' = \delta_0$ . Diracmättets derivator ges av  $\partial^\alpha \delta_{x_0}(\varphi) = (-1)^{|\alpha|} \delta_{x_0}(\partial^\alpha \varphi) = (-1)^{|\alpha|} \varphi(x_0)$ . Med dessa beteckningar, kan enligt Korollarium 2.14 en distribution med stöd i  $x_0$  skrivas

$$u = \sum_{|\alpha| \leq k} C_\alpha \delta_{x_0}^{(\alpha)}.$$

En generalisering av Exempel 2 ges av

**Proposition 3.3.** *Låt  $u$  vara en funktion i  $\Omega \subset \mathbb{R}$ , som är kontinuerligt deriverbar för  $x \neq x_0$ . Antag att derivatan  $v$  är integrerbar nära  $x_0$ . Då är*

$$u' = v + (u(x_0 + 0) - u(x_0 - 0))\delta_{x_0}.$$

*Bevis.* Vi visar först att gränsvärdena existerar. Låt  $x_0 < x < y$ . Då är

$$u(x) = u(y) - \int_x^y v(t) dt.$$

Eftersom  $v$  är integrerbar kan vi låta  $x \downarrow x_0$ . Vi får

$$u(x_0 + 0) = u(y) - \int_{x_0}^y v(t) dt.$$

På samma sätt ser vi att  $u(x_0 - 0)$  existerar. Vi får nu

$$\begin{aligned} u'(\varphi) &= -u(\varphi') = - \int u\varphi' = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} - \int_{|x-x_0| > \epsilon} u(x)\varphi'(x) dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ - \left[ u(x)\varphi(x) \right]_{x_0+\epsilon}^{\infty} - \left[ u(x)\varphi(x) \right]_{-\infty}^{x_0-\epsilon} + \int_{|x-x_0| > \epsilon} v(x)\varphi(x) dx \right\} \\ &= (u(x_0 + 0) - u(x_0 - 0))\varphi(x_0) + \int v(x)\varphi(x) dx. \end{aligned}$$

□

**Sats 3.4.** *Låt  $u$  vara en distribution på  $\Omega \subset \mathbb{R}$ . Om  $u' = 0$  så är  $u$  konstant.*

*Bevis.* Att  $u' = 0$  i distributionsmening betyder att  $u'(\varphi) = 0$  eller  $u(\varphi') = 0$  för alla  $\varphi \in \mathcal{D}$ .

För att beräkna  $u(\phi)$ , vill vi avgöra om  $\phi = \psi'$  för något  $\psi \in \mathcal{D}$ . Detta är fallet precis då  $\int \phi = 0$  och då är  $\psi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt$ . Så om  $\int \phi = 0$ , är  $u(\phi) = 0$ . Vi skall återföra det allmänna fallet på detta specialfall. Fixera  $\psi_0 \in \mathcal{D}$  med  $\int \psi_0 = 1$ . Sätt  $\tilde{\phi} = \phi - \psi_0 \int \phi$ . Då är  $\int \tilde{\phi} = 0$  så  $0 = u(\tilde{\phi}) = u(\phi) - u(\psi_0) \int \phi$  eller  $u(\phi) = u(\psi_0) \int \phi$ . Så  $u$  är konstanten  $u(\psi_0)$ . □

## Multiplikation med funktioner

$\mathcal{D}(\Omega)$  har en naturlig vektorrumsstruktur, vi kan addera två distributioner och multiplicera en distribution med en skalär. Vi vill också kunna multiplicera en distribution med en funktion  $f$ . Om  $u$  är lokalt integrerbar så är

$$fu(\varphi) = \int (fu)\varphi = \int u(f\varphi) = u(f\varphi).$$

För att detta skall kunna användas för att definiera  $fu$  då  $u$  är en distribution, krävs att  $f \in C^\infty$ .

**Definition 3.5.** Om  $f \in C^\infty$  definierar vi  $fu$  genom

$$fu(\varphi) = u(f\varphi).$$

**Övning 3.1.** Visa att  $fu \in \mathcal{D}'(\Omega)$ .

**Anmärkning 3.6.** Om  $u$  har ordning  $k$  räcker det att kräva  $f \in C^k$ .  $\square$

**Proposition 3.7.**

- (a)  $\partial_j \partial_k u = \partial_k \partial_j u$
- (b)  $\partial_k (fu) = (\partial_k f)u + f \partial_k u$ .

**Övning 3.2.** Bevisa Proposition 7.

**Anmärkning 3.8.** Eftersom distributionsderivatorna är oberoende av derivationsordningen enligt (a), kan vi använda beteckningen  $\partial^\alpha u$ ,  
 $\partial^\alpha u(\varphi) = (-1)^{|\alpha|} u(\partial^\alpha \varphi)$ .  $\square$

**Sats 3.9.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $\Omega \subset \mathbb{R}$ , och  $u' + au = f$  där  $f \in C$  och  $a \in C^\infty$ , så är  $u \in C^1$  och ekvationen är uppfylld klassiskt.

*Bevis.* Antag först att  $a \equiv 0$ . Låt  $F$  vara en (klassisk) primitiv funktion till  $f$ . Då är  $F \in C^1$  så  $(u - F)' = u' - F' = f - f = 0$  i distributionsmening. Sats 1 ger  $u = F + C$ , så  $u \in C^1$  och  $u' = F' = f$  klassiskt.

Om  $a \not\equiv 0$  multiplicerar vi ekvationen med dess integrerande faktor. Låt  $A$  vara en primitiv funktion till  $a$ . Då är  $A$  och  $e^A$  funktioner i  $C^\infty$ . Vidare är

$$(e^A u)' = e^A u' + e^A a u = e^A (u' + a u)$$

i distributionsmening. Så ekvationen är ekvivalent med

$$(e^A u)' = e^A f,$$

och vi kan använda fallet  $a \equiv 0$ .  $\square$

**Övning 3.3.** H 3.1.1

**Övning 3.4.** H 3.1.5

**Övning 3.5.** H 3.1.14

**Övning 3.6.** H 3.1.21

**Övning 3.7.** H 3.1.22.

**Övning 3.8.** Visa att om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , med  $u^{(m)} + a_{m-1}u^{(m-1)} + \dots + a_0u = f$ ,  
där  $f \in C^0$  och  $a_j \in C^\infty$ , så är  $u \in C^m$  och ekvationen är uppfylld klassiskt.

# Kapitel 4

## Ändliga delen av en funktion

I detta avsnitt skall vi utvidga Proposition 3.1 till fallet då derivatan inte är lokalt integrerbar.

**Exempel 4.1.** Vad är  $\frac{d}{dx}(\frac{1}{\sqrt{x_+}})$ ?

Vi har

$$\begin{aligned} \langle (\frac{1}{\sqrt{x_+}})', \varphi \rangle &= -\langle \frac{1}{\sqrt{x_+}}, \varphi' \rangle = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} - \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} \varphi'(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( - \left[ \frac{1}{\sqrt{x}} \varphi(x) \right]_{\epsilon}^{\infty} - \frac{1}{2} \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x^{3/2}} dx \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( - \frac{1}{2} \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}} \varphi(x) dx + \frac{\varphi(0)}{\sqrt{\epsilon}} \right) \end{aligned}$$

□

**Definition 4.2.**

$$\text{fp} \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x^{3/2}} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x^{3/2}} dx - \frac{2\varphi(0)}{\sqrt{\epsilon}} \right\}.$$

□

Vi har alltså visat att

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{\sqrt{x_+}} \right) = -\frac{1}{2} \text{fp} \frac{1}{x_+^{3/2}}.$$

En variant av definitionen som är enklare att komma ihåg är

$$\langle \text{fp} \frac{1}{x_+^{3/2}}, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x^{3/2}} dx.$$

**Exempel 4.3.** Vi definierar  $\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}$  genom

$$\langle \text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi \rangle = \int \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{|x|^{5/2}} dx .$$

Ordningen för  $\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}$  är 2. För att se detta delar vi upp integralen i två bitar,

$$\langle \text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi \rangle = \int_{|x|\leq 1} + \int_{|x|>1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{|x|^{5/2}} dx = \text{I} + \text{II}.$$

För att uppskatta den första integralen använder vi att

$$|\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)| \leq \frac{1}{2}x^2\|\varphi''\|_\infty$$

och får

$$\text{I} \leq \frac{1}{2}\|\varphi''\|_\infty \int_{|x|\leq 1} \frac{1}{|x|^{1/2}} dx \leq C\|\varphi''\|_\infty .$$

För den andra integralen gäller

$$\text{II} \leq \int_{|x|>1} \frac{2\|\varphi\|_\infty + |x|\|\varphi'\|_\infty}{|x|^{5/2}} dx \leq C(\|\varphi\|_\infty + \|\varphi'\|_\infty)$$

och alltså är ordningen högst två.

För att se att ordningen inte kan vara mindre låt  $\varphi \in C_0^\infty$ ,  $0 \leq \varphi \leq 1$ ,  $\text{stöd}\varphi \subset (0, 3)$  och  $\varphi = 1$  på  $[1, 2]$  och sätt  $\varphi_\epsilon(x) = \varphi(x/\epsilon)$ . Då gäller

$$|\langle \text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi_\epsilon \rangle| = \int \frac{\varphi_\epsilon(x)}{x^{5/2}} dx \geq \int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{1}{x^{5/2}} dx \geq c\frac{1}{\epsilon^{3/2}} .$$

Vidare är  $\|\varphi_\epsilon\|_\infty + \|\varphi'_\epsilon\|_\infty \leq C/\epsilon$ . Så om ordningen var mindre än 2 skulle vi ha  $c/\epsilon^{3/2} \leq |\langle \text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi \rangle| \leq C/\epsilon$ , en omöjlighet.

Eftersom ordningen hos  $\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}$  är 2 och  $|x|^{5/2} \in C^2$  är  $|x|^{5/2}\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}$  väldefinierat och

$$\begin{aligned} \langle |x|^{5/2}\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi \rangle &= \langle \text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}, |x|^{5/2}\varphi \rangle \\ &= \int \frac{|x|^{5/2}\varphi(x)}{|x|^{5/2}} dx = \int \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Här har vi använt att  $|x|^{5/2}\varphi(x)$  och dess derivata är 0 i origo.

$\text{fp}\frac{1}{|x|^{5/2}}$  löser alltså divisionsproblemet  $|x|^{5/2}u = 1$ . □

**Övning 4.1.** Visa att  $(\text{fp} \frac{1}{|x|^{3/2}})' = -\frac{3}{2} \text{fp} \frac{1}{|x|^{5/2}}$ .

Exemplen ovan kan generaliseras till att definiera  $\text{fp} x_+^{-a}$ ,  $\text{fp} |x|^{-a}$  etc. om  $a$  inte är ett heltal, t.ex.

$$\langle \text{fp} \frac{1}{x^a}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x) - P(x)}{x^a} dx,$$

där  $P$  är Taylorpolynomet till  $\varphi$  i origo av ordning  $[a] - 1$ . Då gäller

$$(\text{fp} \frac{1}{x^a})' = -a \text{fp} \frac{1}{x^{a+1}}$$

och

$$x^a \text{fp} \frac{1}{x^a} = 1.$$

En annan viktig egenskap hos  $\text{fp} \frac{1}{|x|^a}$ ,  $a \neq -1, -2, \dots$ , är att den är homogen av grad  $-a$ . Detta förenklar beräkningen av dess Fourier transform.

Vad menas med att en distribution är homogen? För en funktion  $u(x)$  på  $\mathbb{R}^n$ , säger vi att  $u$  är homogen av grad  $\alpha$  om  $u(tx) = t^\alpha u(x)$ ,  $t > 0$ . Detta kan omformuleras på ett sätt som har mening för distributioner. För en funktion  $u$  gäller

$$\langle u(tx), \varphi \rangle = \int u(tx) \varphi(x) dx = [y = tx] = \int u(y) \frac{1}{t^n} \varphi(\frac{y}{t}) dy = \langle u, \varphi_t \rangle.$$

Men om  $u$  är homogen gäller också

$$\langle u(tx), \varphi \rangle = \int u(tx) \varphi(x) dx = \int t^\alpha u(x) \varphi(x) dx = t^\alpha \langle u, \varphi \rangle.$$

Vi gör därför följande

**Definition 4.4.**  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  är homogen av grad  $\alpha$  om

$$\langle u, \varphi_t \rangle = t^\alpha \langle u, \varphi \rangle, t > 0.$$

□

Då gäller

**Proposition 4.5.**  $\text{fp} \frac{1}{|x|^a}$  och  $\text{fp} \frac{1}{x_+^a}$  är homogena av grad  $-a$  om  $a \neq 1, 2, 3, \dots$

Bevis för  $\text{fp} \frac{1}{|x|^{5/2}}$ . Vi har  $\varphi_t(0) = \frac{1}{t}\varphi(0)$  och  $\varphi'_t(0) = \frac{1}{t^2}\varphi'(0)$ , så

$$\begin{aligned} \langle \text{fp} \frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi_t \rangle &= \int \frac{1}{|x|^{5/2}} \left( \frac{1}{t}\varphi\left(\frac{x}{t}\right) - \frac{1}{t}\varphi(0) - \frac{x}{t^2}\varphi'(0) \right) dx \\ &= \left[ y = \frac{x}{t} \right] = \int \frac{1}{t^{5/2}|x|^{5/2}} (\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)) dx = \frac{1}{t^{5/2}} \langle \text{fp} \frac{1}{|x|^{5/2}}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

**Exempel 4.6.** Beräkna  $(\log |x|)'$ .

$$\begin{aligned} \langle (\log |x|)', \varphi \rangle &= -\langle \log |x|, \varphi' \rangle = -\int \varphi'(x) \log |x| dx \\ &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \varphi'(x) \log |x| dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} -\left\{ [\varphi(x) \log |x|]_{-\epsilon}^{-\epsilon} \right. \\ &\quad \left. + [\varphi(x) \log |x|]_{\epsilon}^{\infty} - \int_{|x| > \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} \right\} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_{|x| > \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} + (\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)) \log \epsilon \right\} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} = \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \end{aligned}$$

där den sista likheten är en definition. □

**Definition 4.7.**  $\langle \text{pv} \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$ .

Om vi i stället deriverar  $\log x_+$  får vi

$$\begin{aligned} \langle \log x_+, \varphi \rangle &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} -\int_{\epsilon}^{\infty} \varphi'(x) \log x dx = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( -[\varphi(x) \log x]_{\epsilon}^{\infty} + \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right) = \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \varphi(0) \log \epsilon \right) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx - \int_{\epsilon}^1 \frac{\varphi(0)}{x} dx \right) = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{\varphi(x) - \chi(x)\varphi(0)}{x} dx, \end{aligned}$$

där  $\chi = \chi_{[-1,1]}$ , liksom i resten av detta kapitel.

Så med följande



**Definition 4.8.**  $\langle \text{fp} \frac{1}{x_+}, \varphi \rangle = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \chi(x)\varphi(0)}{x} dx$  □

har vi alltså visat att  $(\log x_+)' = \text{fp} \frac{1}{x_+}$ .

**Övning 4.2.** Visa att  $\text{fp} \frac{1}{x_+}$  löser divisionsproblemet  $xu = H$ .

Exemplen ovan kan generaliseras till följande

**Definition 4.9.**

$$\langle \text{fp} \frac{1}{|x|^n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^\infty \frac{\varphi(x) - P(x) - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \varphi^{(n-1)}(0) \chi(x)}{dx}$$

om  $n = 1, 2, 3, \dots$  och  $P$  är Taylorpolynomet till  $\varphi$  av grad  $n - 2$ . □

**Exempel 4.10.**  $(\text{fp} \frac{1}{x_+^2})' = -2\text{fp} \frac{1}{x_+^3} + \frac{1}{2} \delta^{(2)}$ . □

*Bevis.*

$$\begin{aligned} \langle (\text{fp} \frac{1}{x_+^2})', \varphi \rangle &= -\langle \text{fp} \frac{1}{x_+^2}, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \frac{\varphi'(x) - \varphi'(0) - x\varphi''(0)\chi(x)}{x^2} dx = \\ &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int_\epsilon^\infty \frac{\varphi'(x) - \varphi'(0)}{x^2} dx - \int_\epsilon^1 \frac{x\varphi''(0)}{x^2} dx \right\}. \end{aligned}$$

Eftersom  $\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)$  är en primitiv funktion till  $\varphi'(x) - \varphi'(0)$  ger partiell integration i den första integralen

$$\begin{aligned} \langle (\text{fp} \frac{1}{x_+^2})', \varphi \rangle &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \left[ \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} \right]_\epsilon^\infty + \right. \\ &\quad \left. 2 \int_\epsilon^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^3} dx - \int_\epsilon^1 \frac{x\varphi''(0)}{x^2} dx \right\}. \end{aligned}$$

Nu gäller

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[ \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^2} \right]_\epsilon^\infty = -\frac{1}{2} \varphi''(0)$$

och

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ 2 \int_\epsilon^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0)}{x^3} dx - \int_\epsilon^1 \frac{x\varphi''(0)}{x^2} dx \right\} = \\ 2 \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0) - \frac{1}{2} x^2 \varphi''(0) \chi(x)}{x^3} dx. \end{aligned}$$

Så

$$\begin{aligned} \langle (\text{fp} \frac{1}{x_+^2})', \varphi \rangle &= \frac{1}{2} \varphi''(0) - 2 \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0) - \frac{1}{2}x^2\varphi''(0)\chi(x)}{x^3} \\ &= \langle -2\text{fp} \frac{1}{x_+^3} + \frac{1}{2}\delta^{(2)}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

**Exempel 4.11.**  $\text{fp} \frac{1}{|x|^3}$  är inte homogen av grad  $-3$  ty

$$\begin{aligned} \langle \text{fp} \frac{1}{|x|^3}, \varphi_t \rangle &= \int \frac{\frac{1}{t}\varphi(\frac{x}{t}) - \frac{1}{t}\varphi(0) - \frac{x}{t^2}\varphi'(0) - \frac{1}{2}\frac{x^2}{t^3}\varphi''(0)\chi(x)}{|x|^3} dx \\ &= \left[ y = \frac{x}{t} \right] = \frac{1}{t^3} \int \frac{\varphi(x) - \varphi(0) - x\varphi'(0) - \frac{1}{2}x^2\varphi''(0)\chi(xt)}{|x|^3} dx \\ &= (\text{Låt oss anta } t > 1) = \frac{1}{t^3} \langle \text{fp} \frac{1}{|x|^3}, \varphi \rangle + \frac{1}{2t^3} \varphi''(0) \int_{\frac{1}{t} < |x| < 1} \frac{dx}{|x|} \\ &= \frac{1}{t^3} \langle \text{fp} \frac{1}{|x|^3}, \varphi \rangle + \varphi''(0) \frac{\log t}{t^3}. \end{aligned}$$

□

**Övning 4.3.** Vad händer om  $t < 1$ ?

**Övning 4.4.** Är  $\text{fp} \frac{1}{x^3}$  homogen av grad  $-3$ ?

**Övning 4.5.** Visa att ekvationen  $x^N u = 0$  har lösningen  $u = \sum_{n=0}^{N-1} c_n \delta^{(n)}$ .

Diskussionen i detta kapitel visar att ekvationen

$$x^N u = 1 \text{ har lösningen } u = \text{fp} \frac{1}{x^N} + \sum_{n=0}^{N-1} c_n \delta^{(n)}.$$

På samma sätt har ekvationen

$$(x-a)^N u = 1 \text{ lösningen } u = \text{fp} \frac{1}{(x-a)^N} + \sum_{n=0}^{N-1} c_n \delta_a^{(n)}.$$

där  $\text{fp} \frac{1}{(x-a)^N}$  definieras analogt med  $\text{fp} \frac{1}{x^N}$ .

Vi kan nu lösa divisionsproblemet  $Pu = 1$ , då  $P$  är ett polynom av en variabel. I en omgivning där  $P \neq 0$  är förståss  $u = 1/P$  en snäll funktion.

Så problemet med divisionen är nära ett eventuellt reellt nollställe  $a$  till  $P$ . Men då kan vi skriva  $P(x) = (x - a)^n Q(x)$  där  $Q(a) \neq 0$ . Så nära  $x = a$  har vi  $(x - a)^n Q(x)u = 1$  som har en lösning  $Qu = \text{fp} \frac{1}{(x - a)^n}$  och alltså är  $u = \frac{1}{Q(x)} \text{fp} \frac{1}{(x - a)^n}$  nära  $x = a$ . Enligt Sats 2.9 är  $u$  en väldefinierad distribution på  $\mathbb{R}$  och  $u$  löser  $Pu = 1$ .

**Övning 4.6.** H 3.1.14

**Övning 4.7.** H 3.1.20

**Övning 4.8.** Låt  $u$  vara en kontinuerlig funktion på  $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  som är homogen av grad  $-n$ . Visa att vi kan definiera en distribution  $\text{pv } u$  genom

$$\langle \text{pv } u, \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} u(x) \varphi(x) dx,$$

precis då  $\int_{|x|=1} u(x) d\sigma(x) = 0$ .

**Övning 4.9.** En alternativ metod att definiera  $\text{fp } x_+^\alpha$  är med analytisk fortsättning. För  $\varphi \in \mathcal{D}$  och  $\text{Re } \alpha > -1$  är avbildningen

$$F_\varphi(\alpha) = \int_0^\infty x^\alpha \varphi(x) dx$$

analytisk. Visa att denna avbildning kan fortsättas till en meromorf funktion i  $\mathbb{C}$ , vars enda singulariteter är enkla poler i  $-1, -2, -3, \dots$ . Bestäm residuerna  $R_{-k}$  till  $F_\varphi$  och visa att om vi för  $k = 1, 2, 3, \dots$  utvidgar definitionen av  $F_\varphi$  genom

$$F_\varphi(-k) = \lim_{\alpha \rightarrow -k} \left( F_\varphi(\alpha) - \frac{R_{-k}}{\alpha + k} \right)$$

så gäller

$$F_\varphi(\alpha) = \langle \text{fp } x_+^\alpha, \varphi \rangle.$$

Detta angreppssätt ger ett alternativ bevis för att

$$x_+^\alpha \text{fp } x_+^{-\alpha} = H, \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

och

$$(\text{fp } x_+^\alpha)' = \alpha \text{fp } x_+^{\alpha-1}, \quad \alpha \neq 0, -1, -2, -3, \dots$$

# Kapitel 5

## Fundamentallösningar till Laplace och värmeledningsoperatorerna

**Definition 5.1.** Låt  $P(D)$  vara en differentialoperator. En distribution  $E$  med  $P(D)E = \delta$ , kallas för en *fundamentallösning* till  $P$ .

□

I Exempel 3.2 såg vi att Heavisidefunktionen  $H$  är en fundamentallösning till  $d/dx$ . Något allmännare är  $H(x_1) \dots H(x_n)$  en fundamentallösning till  $\partial_1 \dots \partial_n$ . I det här kapitlet skall vi behandla Laplaceoperatoren

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2},$$

och värmeledningsoperatoren

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) u = \frac{\partial u}{\partial t} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

För att kunna göra detta behöver vi integrera partiellt, och påminner därför om

**Greens identitet.**

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx = \int_{\partial \Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma$$

där  $\partial/\partial n$  är den utåtriktade normalderivatan.

**Sats 5.1.**

$$E(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{\omega_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3, \end{cases}$$

är en fundamentallösning till Laplaceoperatoren i  $\mathbb{R}^n$ .

( $\omega_n$  är ytan av enhetsfären i  $\mathbb{R}^n$ .)

**Övning 5.1.** Beräkna  $\omega_n$  i termer av  $\Gamma$ -funktionen,

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt.$$

**Övning 5.2.** Visa att  $\Delta E(x) = 0$  om  $x \neq 0$ .

*Bevis.*

$$\langle \Delta E, \varphi \rangle = \langle E, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} E \Delta \varphi dx$$

$$\begin{aligned} \text{Övning 2} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} (E \Delta \varphi - \varphi \Delta E) dx = \text{Greens identitet} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| = \epsilon} \left( E \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial E}{\partial n} \right) d\sigma = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (I_\epsilon + II_\epsilon). \end{aligned}$$

Vi behandlar bara fallet  $n \geq 3$ , och lämnar fallet  $n = 2$  som Övning 3. Nu är

$$|I_\epsilon| \leq C \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right\|_\infty \frac{1}{\epsilon^{n-2}} \omega_n \epsilon^{n-1} \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0,$$

och eftersom  $\partial/\partial n = -\partial/\partial r$  gäller

$$\begin{aligned} II_\epsilon &= \int_{|x| = \epsilon} \varphi \frac{\partial E}{\partial r} d\sigma = -\frac{1}{(n-2)\omega_n} \int_{|x| = \epsilon} \varphi(x) \frac{-(n-2)}{|x|^{n-1}} d\sigma(x) \\ &= \frac{\varphi(0)}{\omega_n} \int_{|x| = \epsilon} \frac{d\sigma(x)}{\epsilon^{n-1}} + \frac{1}{\omega_n} \int_{|x| = \epsilon} (\varphi(x) - \varphi(0)) \frac{d\sigma(x)}{\epsilon^{n-1}} \\ &\rightarrow \varphi(0), \epsilon \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

**Sats 5.2.**

$$E(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right), & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

är en fundamentallösning till värmeledningsekvationen i  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

**Övning 5.4.**  $(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x)E(t, x) = 0$  om  $t \neq 0$ .

*Bevis.* Låt  $\phi(x) = E(x, \frac{1}{2})$ . När  $n = 1$  är detta tätheten för en stokastisk variabel som är  $N(0, 1)$ -fördelad och i allmänhet produkten av  $n$  sådana tätheter. Dessutom gäller  $E(x, t) = \phi_{\sqrt{2t}}(x)$  så  $\int E(x, t)dx = 1$  för alla  $t > 0$  och  $E \in L^1_{lok}(\mathbb{R}^{n+1})$ .

Nu gäller

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial E}{\partial t}, \varphi \right\rangle &= - \left\langle E, \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right\rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} - \int dx \int_{t>\epsilon} E \frac{\partial \varphi}{\partial t} dt \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int E(x, \epsilon) \varphi(x, \epsilon) dx + \iint_{t>\epsilon} \varphi \frac{\partial E}{\partial t} dx dt \right\}, \end{aligned}$$

och

$$\langle \Delta_x E, \varphi \rangle = \langle E, \Delta_x \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{t>\epsilon} E \Delta_x \varphi dx dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iint_{t>0} \Delta_x E \varphi dx dt$$

Så

$$\begin{aligned} \left\langle \left( \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) E, \varphi \right\rangle &= \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \int E(x, \epsilon) \varphi(x, \epsilon) dx + \iint_{t>\epsilon} \varphi \left( \frac{\partial E}{\partial t} - \Delta_x E \right) dx dt \right\} = \\ &= \text{Övning 4} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int E(x, \epsilon) \varphi(x, \epsilon) dx. \end{aligned}$$

Eftersom  $E(x, t) = \phi_{\sqrt{2t}}(x)$  är en approximativ identitet bör vi ha

$$I_\epsilon = \int E(x, \epsilon) \varphi(x, \epsilon) dx \rightarrow \varphi(0), \quad \epsilon \rightarrow 0.$$

Detta följer inte direkt av Sats 1.4 eftersom  $\phi(x)$  inte har kompakt stöd och  $\varphi(x, \epsilon)$  beror på  $\epsilon$ . Men variabelbytet  $x = \sqrt{2\epsilon} y$  ger

$$I_\epsilon = \int \phi(x) \varphi(\sqrt{2\epsilon}, \epsilon) dx .$$

Nu gäller  $\phi \in L^1$  och  $|\varphi(\sqrt{2\epsilon}, \epsilon)| \leq \|\varphi\|_\infty$  så dominerad konvergens ger

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} I_\epsilon = \int \phi(x) \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \varphi(\sqrt{2\epsilon}, \epsilon) dx = \int \phi(x) \varphi(0, 0) dx = \varphi(0) .$$

□

**Övning 5.5.** Visa att  $\frac{1}{\pi z}$  är en fundamentallösning till  $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$  i  $\mathbb{C}$ .

**Övning 5.6.** Bestäm  $\frac{\partial}{\partial z} \log |z|$  och  $\Delta \log |z|$  i  $\mathbb{C}$ .

**Övning 5.7.** H 3.3.9

**Övning 5.8.** H 3.3.11

**Övning 5.9.** H 3.3.12

# Kapitel 6

## Distributioner med kompakt stöd

**Sats 6.1.** *Antag att  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  har kompakt stöd. Då finns en entydig utvidgning av  $u$  till  $C^\infty(\Omega)$  som uppfyller att  $u(\varphi) = 0$  om stöd  $u$  och stöd  $\varphi$  är disjunkta.*

*Om  $K$  är en kompakt mängd som innehåller en omgivning av stöd  $u$ , så gäller*

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi\|_K, \quad \varphi \in C^\infty(\Omega). \quad (6.1)$$

*Bevis.* Tag  $\chi \in C_0^\infty(K)$  med  $\chi = 1$  i en omgivning av stöd  $u$ . Om  $\varphi \in C_0^\infty$  så gäller enligt Sats 2.12

$$u(\varphi) = u(\chi\varphi + (1 - \chi)\varphi) = u(\chi\varphi) + u((1 - \chi)\varphi).$$

Så

$$u(\varphi) = u(\chi\varphi), \quad \varphi \in C^\infty$$

definierar alltså en utvidgning av  $u$ . (1) följer med Leibnitz regel.

Antag omvänt att  $u$  är någon utvidgning till  $C^\infty$ . Villkoret på stödet ger att  $u((1 - \chi)\varphi) = 0$  och alltså är  $u(\varphi) = u(\chi\varphi)$  och utvidgningen är entydig.  $\square$

**Anmärkning 6.2.** Övning 2.6 visar att man inte (alltid) kan ta  $K = \text{stöd } u$  i (1).  $\square$

**Övning 6.10.** Formulera och bevisa en omvändning till Sats 1.

Vi kan alltså identifiera distributioner med kompakt stöd med de linjära funktionaler på  $C^\infty(\Omega)$  som uppfyller (1). Dessa distributioner betecknas  $\mathcal{E}'(\Omega)$ .



# Kapitel 7

## Konvergens av distributioner

**Definition 7.1.** En följd  $u_j \in \mathcal{D}'(\Omega)$  konvergerar mot  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  om

$$u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi),$$

för varje testfunktion  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ . Vi betecknar detta med  $u_j \rightarrow u$  i  $\mathcal{D}'$ .  $\square$

Om  $u_j \rightarrow u$  i  $\mathcal{D}'$ , så gäller också  $\partial^\alpha u_j \rightarrow \partial^\alpha u$  i  $\mathcal{D}'$  för varje multiindex  $\alpha$ . Vi skriver  $u = \sum u_j$  i  $\mathcal{D}'$  om partialsummorna konvergerar i  $\mathcal{D}'$ . Vi kan då derivera termvis,  $\partial^\alpha(\sum u_j) = \sum \partial^\alpha u_j$ .

**Anmärkning 7.2.** Konvergens i  $\mathcal{D}'$  är ett "svagt" villkor, t.ex. gäller  $f_j \rightarrow f$  i  $\mathcal{D}'$  om  $f_j \rightarrow f$  i  $L^p$ .  $\square$

**Övning 7.1.** Visa det.

**Definition 7.3.**  $u_j \in \mathcal{D}'(\Omega)$  är en Cauchyföljd i  $\mathcal{D}'(\Omega)$  om  $u_j(\varphi)$  är en Cauchyföljd för varje  $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ .

**Sats 7.4.**  $\mathcal{D}'(\Omega)$  är fullständigt.

Eftersom  $u_j(\varphi)$  är en Cauchyföljd i  $\mathbb{C}$  så existerar

$$u(\varphi) = \lim_{j \rightarrow \infty} u_j(\varphi),$$

och definierar en linjär funktional på  $\mathcal{D}(\Omega)$ . Svårigheten är att visa att  $u$  är en distribution, dvs. uppfyller normolikheten (2.1). Detta är en konsekvens av Banach-Steinhaus sats.

Låt  $K$  vara en kompakt mängd i  $\Omega$ . Vi skall studera  $X = X_K = C_0^\infty(K)$ . Vi inför en metrik på  $X$  genom

$$d(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_k 2^{-k} \frac{\|\varphi_1 - \varphi_2\|_k}{1 + \|\varphi_1 - \varphi_2\|_k},$$

där  $\|\varphi\|_k = \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|$  och låter  $\|\varphi\| = d(\varphi, 0)$ .

**Övning 7.2.** Visa att  $X$  är fullständigt.

Antag att  $s > 0$  och tag  $N = N_s$  så att  $\sum_{N+1}^{\infty} 2^{-k} < \frac{s}{2}$ . Om  $\|\varphi\|_N < \frac{s}{2}$  gäller

$$\|\varphi\| \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \|\varphi\|_k + \frac{s}{2} \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \|\varphi\|_N + \frac{s}{2} \leq \|\varphi\|_N + \frac{s}{2} < s,$$

och alltså

$$\{\varphi; \|\varphi\|_N < \frac{s}{2}\} \subset \{\varphi; \|\varphi\| < s\}. \quad (7.1)$$

### Banach-Steinhaus sats.

Låt  $\Lambda_\alpha$  vara en familj av begränsade (kontinuerliga) linjära funktionaler på  $X$ . Då gäller antingen

- 1) det finns  $C, N < \infty$  med  $|\Lambda_\alpha \varphi| \leq C \|\varphi\|_N$  för alla  $\varphi \in X$ ,
- eller
- 2)  $\sup |\Lambda_\alpha \varphi| = \infty$  för något  $\varphi \in X$ .

Vi kan nu slutföra beviset för Sats 4. Tag  $\varphi$  med stöd i  $K$ . Eftersom  $u_j(\varphi)$  konvergerar, kan inte 2) gälla. Alltså gäller 1), dvs.

$$|u(\varphi)| \leq \sup_j |u_j(\varphi)| \leq C \|\varphi\|_N \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \|\partial^\alpha \varphi\|_\infty.$$

□

Banach-Steinhaus sats är en konsekvens av

### Baires sats.

Antag att  $X$  är ett fullständigt metriskt rum. Låt  $V_1, V_2, \dots$  vara öppna och täta mängder i  $X$ . Då är  $\cap V_i$  icke-tomt.

*Bevis.* Låt  $B_r(\phi) = \{\varphi \in X; d(\varphi, \phi) < r\}$ . Eftersom  $V_i$  är öppna och täta kan vi succesivt välja  $\phi_i$  och  $r_i$  med  $r_i < \frac{1}{i}$  så att  $\overline{B_{r_1}(\phi_1)} \subset V_1$  och  $\overline{B_{r_i}(\phi_i)} \subset V_i \cap \overline{B_{r_{i-1}}(\phi_{i-1})}$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$

Om  $i, j \geq n$  så  $\phi_i, \phi_j \in \overline{B_{r_n}(\phi_n)}$  och alltså  $d(\phi_i, \phi_j) < \frac{2}{n}$ . Så  $\phi_n$  är en Cauchyföljd, och alltså konvergerar  $\phi_n \rightarrow \phi_0$  för något  $\phi_0 \in X$ . Men  $\phi_i \in \overline{B_{r_n}(\phi_n)}$  om  $i \geq n$ . Så  $\phi_0 \in \overline{B_{r_n}(\phi_n)} \subset V_n$ . Alltså  $\phi_0 \in \cap V_i$ . □

*Bevis av Banach-Steinhaus sats.* Låt  $\phi(\varphi) = \sup |\Lambda_\alpha \varphi|$ .  $\phi$  är nedåt halvkontinuerlig, så  $V_n = \{\varphi; \phi(\varphi) > n\}$  är öppen. Om något  $V_N$  inte är tätt, så finns  $\varphi_0, r$  med  $B_r(\varphi_0) \subset V_N^c$ . Enligt (7.1) finns  $s$  och  $k$  med

$$\{\varphi; \|\varphi - \varphi_0\|_k < s\} \subset V_N^c.$$

Så om  $\|\varphi\|_k < s$  är  $|\Lambda_\alpha(\varphi_0 + \varphi)| \leq N$ . Detta ger  $|\Lambda_\alpha \varphi| \leq |\Lambda_\alpha(\varphi_0 + \varphi)| + |\Lambda_\alpha \varphi_0| \leq 2N$  om  $\|\varphi\|_k < s$ . Homogenitet ger nu

$$|\Lambda_\alpha \varphi| \leq \frac{2N}{s} \|\varphi\|_k.$$

Å andra sidan om alla  $V_n$  är täta, så finns  $\varphi \in \cap V_n$ , dvs.  $\phi(\varphi) = \infty$  eller  $\sup_\alpha |\Lambda_\alpha \varphi| = \infty$ .  $\square$

**Sats 7.5.** Antag att  $u_j \rightarrow u_0$  i  $\mathcal{D}'(\Omega)$  och  $u_j \geq 0$ . Då konvergerar  $u_j$  mot  $u_0$  svagt som mått och  $u_0 \geq 0$ .

*Bevis.* Eftersom  $u_0$  är ett gränsvärde av positiva distributioner är  $u_0$  en positiv distribution. Enligt Sats 2.7 är  $u_0$  ett positivt mått. Om  $\chi \in C_0^\infty$  är 1 på  $K$ , gav beviset för Sats 2.7 uppskattningen

$$|u_j(\varphi)| \leq 2u_j(\chi) \|\varphi\|_\infty,$$

då  $\varphi \in C_0^\infty$  har stöd i  $K$ .

Eftersom  $u_j(\chi) \rightarrow u_0(\chi)$  är  $\sup_j |u_j(\chi)| \leq C$ , och vi får

$$|u_j(\varphi)| \leq C \|\varphi\|_\infty, \quad \varphi \in C_0^\infty, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

Genom gränsovergång, jämför Sats 2.5, gäller detta även då  $\varphi \in C_0$ .

Låt nu  $\varphi \in C_0$ . Det gäller att visa att  $u_j(\varphi) \rightarrow u_0(\varphi)$ ,  $j \rightarrow \infty$ . Tag  $\varphi_n \in C_0^\infty$  med  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  likformigt. Då gäller

$$\begin{aligned} |u_j(\varphi) - u_0(\varphi)| &\leq |u_j(\varphi) - u_j(\varphi_n)| + |u_j(\varphi_n) - u_0(\varphi_n)| + |u_0(\varphi_n) - u_0(\varphi)| \\ &= |u_j(\varphi - \varphi_n)| + |u_j(\varphi_n) - u_0(\varphi_n)| + |u_0(\varphi_n - \varphi)| \\ &\leq 2C \|\varphi - \varphi_n\| + |u_j(\varphi_n) - u_0(\varphi_n)|. \end{aligned}$$

och alltså

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} |u_j(\varphi) - u_0(\varphi)| \leq 2C \|\varphi - \varphi_n\|_\infty < \epsilon$$

om  $n$  är tillräckligt stort.  $\square$

**Övning 7.3.** Antag att  $f$  är analytisk i  $\Omega = I \times (0, \delta) \subset \mathbb{C}$ , där  $I$  är ett öppet intervall. Visa att om  $|f(z)| \leq C|\operatorname{Im}z|^{-N}$ , så existerar  $f(x + i0) = \lim_{y \rightarrow 0} f(x + iy)$  i distributionsmening och  $f(x + i0) \in \mathcal{D}'_{N+1}$ .

**Övning 7.4.** Beräkna

a)  $\frac{1}{x+i0} + \frac{1}{x-i0}$

och

b)  $\frac{1}{x+i0} - \frac{1}{x-i0}$ .

**Övning 7.5.** H 2.5

**Övning 7.6.** H 2.6

**Övning 7.7.** H 2.7

**Övning 7.8.** H 2.9

**Övning 7.9.** H 2.16

# Kapitel 8

## Faltning av distributioner

Om  $u \in L^1_{\text{lok}}$  och  $\varphi \in C_0^\infty$ , så är  $u * \varphi(x) = \int u(y)\varphi(x-y)dy$ . Detta motiverar följande

**Definition 8.1.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , så är

$$u * \varphi(x) = \langle u_y, \varphi(x-y) \rangle.$$

□

Med beteckningen  $\langle u_y, \varphi(x-y) \rangle$  menas att distributionen  $u$  skall verka på testfunktionen  $y \mapsto \varphi(x-y)$ . Ibland skriver vi  $\langle u, \varphi(x-\cdot) \rangle$  för samma sak.

**Anmärkning 8.2.** Denna definition kan också användas i fallet  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ ,  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ . □

**Sats 8.1.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , så gäller

- a)  $u * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- b)  $\text{stöd}(u * \varphi) \subset \text{stöd } u + \text{stöd } \varphi$
- c)  $\partial^\alpha(u * \varphi) = u * \partial^\alpha \varphi = (\partial^\alpha u) * \varphi$

*Bevis.* Vi visar först att  $u * \varphi$  är kontinuerlig. Så låt  $x \rightarrow x_0$ . Om  $|x-x_0| \leq 1$ , så har  $y \mapsto \varphi(x-y)$  stöd i en fix kompakt mängd. Dessutom gäller  $\partial_y^\alpha(\varphi(x-y) - \varphi(x_0-y)) \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow x_0$ , likformigt. Så  $\varphi(x-y) \rightarrow \varphi(x_0-y)$ , i  $\mathcal{D}$  när  $x \rightarrow x_0$ , och alltså  $u * \varphi(x) = \langle u_y, \varphi(x-y) \rangle \rightarrow \langle u_y, \varphi(x_0-y) \rangle = u * \varphi(x_0)$ ,  $x \rightarrow x_0$ .

För b), räcker det på grund av a) att visa att om  $x \notin \text{stöd } u + \text{stöd } \varphi$ , så är  $u * \varphi(x) = 0$ . Men om  $x \notin \text{stöd } u + \text{stöd } \varphi$ , så finns inget  $y \in \text{stöd } u$  med  $x-y \in \text{stöd } \varphi$ . Det finns alltså inget  $y \in \text{stöd } u$  och  $y \in \text{stöd } \varphi(x-\cdot)$ . Alltså är  $\text{stöd } u \cap \text{stöd } \varphi(x-\cdot) = \emptyset$  och  $u * \varphi(x) = 0$ .

Beviset för den andra likheten i c) är enkelt.

$$\begin{aligned}\partial^\alpha u * \varphi(x) &= \langle \partial^\alpha u_y, \varphi(x - y) \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_y, \partial_y^\alpha \varphi(x - y) \rangle = \\ &= \langle u_y, \varphi^{(\alpha)}(x - y) \rangle = u * (\partial^\alpha \varphi)(x).\end{aligned}$$

Den första likheten följer med induktion om vi kan visa den i specialfallet  $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$ . Vi skall alltså visa att

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (u * \varphi(x + he_1) - u * \varphi(x)) = u * \partial_1 \varphi(x).$$

Låt  $\phi_{x,h}(y) = \frac{1}{h}(\varphi(x + he_1 - y) - \varphi(x - y))$ . Då är  $\frac{1}{h}(u * \varphi(x + he_1) - u * \varphi(x)) = u(\phi_{x,h})$ . Men  $\phi_{x,h}(y) \rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x - y)$  i  $\mathcal{D}$ . Alltså gäller  $\partial^\alpha(u * \varphi)(x) = \lim_{h \rightarrow 0} u(\phi_{x,h}) = u_y(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x - y)) = u * \partial_1 \varphi(x)$ .

Eftersom a) följer från c) är satsen bevisad.  $\square$

**Övning 8.1.** Visa att  $\phi_{x,h}(y) \rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x - y)$  i  $\mathcal{D}$ .

**Övning 8.2.** Visa att faltningen av funktioner är associativ.

**Sats 8.2.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , så är  $(u * \varphi) * \psi = u * (\varphi * \psi)$ .

**Anmärkning 8.3.** Om  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ , räcker det att en av  $\varphi, \psi$  har kompakt stöd.  $\square$

*Bevis.* Vi har

$$\begin{aligned}u * (\varphi * \psi)(x) &= \langle u_y, \varphi * \psi(x - y) \rangle = \langle u_y, \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x - y - t) \psi(t) dt \rangle \stackrel{?}{=} \\ &\stackrel{?}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \langle u_y, \varphi(x - y - t) \rangle \psi(t) dt = \int_{\mathbb{R}^n} u * \varphi(x - t) \psi(t) dt \\ &= (u * \varphi) * \psi(x).\end{aligned}$$

För att se att  $\stackrel{?}{=}$  gäller, approximerar vi integralen med en Riemannsumma. Enligt Lemma 4 nedan konvergerar Riemannsumman mot faltningen i  $\mathcal{D}$  och alltså gäller  $\stackrel{?}{=}$ .  $\square$

**Lemma 8.4.** Om  $\varphi \in C_0^j(\mathbb{R}^n)$  och  $\psi \in C_0(\mathbb{R}^n)$  så

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \varphi(x - kh) \psi(kh) h^n \longrightarrow \varphi * \psi(x) \text{ i } C_0^j,$$

då  $h \rightarrow 0$ .

*Bevis av Lemma 4.* Summan har stöd i stöd  $\varphi + \text{stöd } \psi$ . Funktionen  $(x, y) \mapsto \varphi(x - y)\psi(y)$  är likformigt kontinuerlig. Så Riemannsumman konvergerar likformigt mot  $\varphi * \psi(x)$ . Eftersom  $\partial^\alpha(\varphi * \psi) = \partial^\alpha\varphi * \psi$  om  $|\alpha| \leq j$ , gäller detta även för derivatorna.  $\square$

**Sats 8.5 (Regularisering av distributioner.).** Låt  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $\varphi_\delta$  vara en approximativ identitet. Då gäller  $u * \varphi_\delta \rightarrow u$  i  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ ,  $\delta \rightarrow 0$ .

*Bevis.* Definiera  $\check{\psi}$  genom  $\check{\psi}(x) = \psi(-x)$ . Då är  $u(\psi) = u * \check{\psi}(0)$ . Så enligt Sats 2

$$\begin{aligned} u_\delta(\psi) &= u * \varphi_\delta(\psi) = (u * \varphi_\delta) * \check{\psi}(0) = \\ &= u * (\varphi_\delta * \check{\psi})(0). \end{aligned}$$

Men eftersom  $\varphi_\delta$  är en approximativ identitet, så gäller  $\varphi_\delta * \check{\psi} \rightarrow \check{\psi}$  i  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ,  $\delta \rightarrow 0$ . Vi får

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} u_\delta(\psi) = \lim_{\delta \rightarrow 0} u * (\varphi_\delta * \check{\psi})(0) = u * \check{\psi}(0) = u(\psi).$$

$\square$

**Övning 8.3.** Låt  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ . Visa att det finns  $C_0^\infty$ -funktioner  $u_n$  med  $u_n \rightarrow u$  i  $\mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $n \rightarrow \infty$ .

**Exempel 8.6.** Ett alternativt bevis för att  $u$  är konstant om  $u' = 0$ .

Låt  $u_\delta = u * \varphi_\delta \in C^\infty$ . Då är  $u'_\delta = u' * \varphi_\delta = 0 * \varphi_\delta = 0$ . Så  $u_\delta = C_\delta$ . Men  $u_\delta \rightarrow u$  i  $\mathcal{D}'$ , så  $C_\delta \rightarrow C$  för någon konstant  $C$  och  $u = C$ .  $\square$

**Övning 8.4.** Låt  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ . Visa

- Om  $u' \geq 0$ , så är  $u$  en växande funktion.
- Om  $u'' \geq 0$ , så är  $u$  en konvex funktion.

**Exempel 8.7.** Harmoniska funktioner.

Om  $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$  uppfyller  $\Delta u = 0$ , säger vi att  $u$  är en harmonisk funktion. Harmoniska funktioner uppfyller medelvärdesegenskapen,

$$u(x) = \frac{1}{|S_r(x)|} \int_{S_r(x)} u(y) d\sigma(y).$$

**Sats 8.8 (Weyls lemma.).** Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $\Delta u = 0$ , så är  $u \in C^\infty$  och  $\Delta u = 0$  klassiskt.

*Bevis.* Låt  $\varphi_\delta$  vara en approximativ identitet,  $\varphi(x) = \varphi(|x|)$ ,  $\varphi \geq 0$  och  $\int \varphi = 1$ . Sätt  $u_\delta = u * \varphi_\delta$ . Då är  $u_\delta \in C^\infty$  och  $\Delta u_\delta = (\Delta u) * \varphi_\delta = 0 * \varphi_\delta = 0$ . Så  $u_\delta$  uppfyller medelvärdesegenskapen. Därför är

$$\begin{aligned} u_\delta * \varphi(x) &= \int_0^\infty r^{n-1} \varphi(r) dr \int_{S^{n-1}} u_\delta(x - r\omega) d\sigma(\omega) \\ &= \omega_n u_\delta(x) \int_0^\infty r^{n-1} \varphi(r) dr = u_\delta(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy = u_\delta(x). \end{aligned}$$

Så  $u_\delta = u_\delta * \varphi$ . Låt nu  $\delta \rightarrow 0$ . Vi får  $u = u * \varphi \in C^\infty$  och  $\Delta u = \Delta u * \varphi = 0 * \varphi = 0$ .  $\square$

Vi skall nu definiera faltningen av två distributioner. Vi vill göra det så att associativiteten bevaras. För att det skall gå bra, antar vi att åtminstone en av distributionerna har kompakt stöd.

**Definition 8.9.** Antag att  $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , och minst en har kompakt stöd. Då är  $u * v$  den (entydigt bestämda) distribution, som uppfyller

$$(u * v) * \varphi = u * (v * \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

$\square$

Är detta en definition?

Vi observerar först att  $u * (v * \varphi)$  är väldefinierat. Om  $v$  har kompakt stöd så  $v * \varphi \in \mathcal{D}$  och  $u * (v * \varphi)$  är definierat enligt Definition 1.1. Annars har  $u$  kompakt stöd och  $v * \varphi \in C^\infty$  så  $u * (v * \varphi)$  är definierat enligt Anmärkning 1.2.

Att det finns högst en distribution  $U = u * v$  är också klart. För om det fanns två sådana distributioner  $U$  och  $\tilde{U}$  så gäller  $U * \varphi = u * (v * \varphi) = \tilde{U} * \varphi$  och alltså  $U(\varphi) = U * \check{\varphi}(0) = \tilde{U} * \check{\varphi}(0) = \tilde{U}(\varphi)$ .

För att visa existensen, skall vi studera avbildningen  $\varphi \mapsto u * \varphi$ .

**Proposition 8.10.** Låt  $T\varphi = u * \varphi$ . Då gäller

- Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , så är  $T$  en kontinuerlig linjär avbildning  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ .
- Om  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ , så är  $T$  en kontinuerlig linjär avbildning  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  och  $C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ .

*Bevis.* Vi bevisar a) och lämnar b) som övning. Vi antar alltså att  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  och skall visa att  $\partial^\alpha(u * \varphi_j) \rightarrow 0$  likformigt på kompakter. Eftersom  $\partial^\alpha \varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  då  $\varphi_j$  gör det, och  $\partial^\alpha(u * \varphi_j) = u * \partial^\alpha \varphi_j$ , kan vi anta att



$\alpha = 0$ . När  $x$  ligger i en kompakt mängd och alla  $\varphi_j$  har stöd i en fix kompakt mängd så har  $y \mapsto \varphi_j(x - y)$  också stöd i en fix kompakt mängd. Så

$$|u * \varphi_j(x)| = |u(\varphi_j(x - \cdot))| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi_j(x - \cdot)\|_\infty \longrightarrow 0, j \rightarrow \infty.$$

□

**Övning 8.5.** Bevisa Proposition 10 b).

Låt  $\tau_h$  vara translationsoperatoren,  $\tau_h \varphi(x) = \varphi(x - h)$ . Då gäller

**Proposition 8.11.** *Faltning och translation kommuterar.*

*Bevis.*

$$\begin{aligned} u * \tau_h \varphi(x) &= \langle u_y, \tau_h \varphi(x - y) \rangle = \langle u_y, \varphi(x - h - y) \rangle \\ &= u * \varphi(x - h) = \tau_h(u * \varphi)(x). \end{aligned}$$

□

En viktig omvändning av detta är

**Sats 8.12.** *Antag att  $T$  är en kontinuerlig linjär avbildning av  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$  in i  $C^\infty(\mathbb{R}^n)$  som kommuterar med translationer. Då finns en distribution  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  med*

$$T\varphi = u * \varphi, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

*Bevis.* Om  $T\varphi = u * \varphi$ , så är speciellt  $u(\varphi) = u * \check{\varphi}(0) = T \check{\varphi}(0)$  Definiera därför  $u$  genom

$$u(\varphi) = T \check{\varphi}(0).$$

Kontinuitetsantagandet medför att  $u$  är en distribution. Vidare är

$$\begin{aligned} u * \varphi(h) &= \langle u, \varphi(h - x) \rangle = \langle u, \tau_h \check{\varphi} \rangle = T((\tau_h \check{\varphi})^\vee)(0) \\ &= T(\tau_{-h} \varphi)(0) = \tau_{-h} T(\varphi)(0) = T\varphi(h). \end{aligned}$$

□

Vi ser nu att Definition 9 är en definition. Proposition 10 och 11 visar att  $\varphi \mapsto u * (v * \varphi)$ , uppfyller villkoren i Sats 12, och  $u * v$  är denna distribution.

□

**Anmärkning 8.13.** a) Om  $v \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ , så överensstämmer Definition 1 och 2.

b) Om både  $u$  och  $v$  har kompakt stöd så gäller  $(u * v) * \varphi = u * (v * \varphi)$  för alla  $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ . □

**Exempel 8.14.**  $u * \delta = u$  eftersom  $(u * \delta) * \varphi = u * (\delta * \varphi) = u * \varphi$ . □

**Sats 8.15.**

a)  $u * v = v * u$

b)  $\text{stöd}(u * v) \subset \text{stöd}u + \text{stöd}v$

c)  $u * (v * w) = (u * v) * w$ , om två av distributionerna har kompakt stöd.

*Bevis.* a) För att visa att två distributioner  $U$  och  $V$  är lika, räcker det att visa att  $U * (\varphi * \psi) = V * (\varphi * \psi)$ ,  $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ . Ty då är  $(U * \varphi) * \psi = U * (\varphi * \psi) = V * (\varphi * \psi) = (V * \varphi) * \psi$ , enligt Sats 2. Detta ger  $U * \varphi = V * \varphi$ , och  $U = V$ .

Nu är

$$\begin{aligned} (u * v) * (\varphi * \psi) &= u * (v * (\varphi * \psi)) = u * ((v * \varphi) * \psi) \\ &= u * (\psi * (v * \varphi)) = (u * \psi) * (v * \varphi). \end{aligned}$$

och

$$(v * u) * (\varphi * \psi) = (v * u) * (\psi * \varphi) = (v * \varphi) * (u * \psi) = (u * \psi) * (v * \varphi),$$

och a) följer.

b) På grund av kommutativiteten kan vi anta att  $v$  har kompakt stöd. Definiera  $\check{v}$  genom  $\langle \check{v}, \varphi \rangle = \langle v, \check{\varphi} \rangle$ . Om  $x \in \text{stöd}(u * v)$ , finns till varje  $\epsilon > 0$  ett  $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ ,  $\text{stöd} \varphi \subset \{y; |x - y| < \epsilon\} = O_\epsilon$ , med  $0 \neq u * v(\varphi) = u * v * \check{\varphi}(0) = u((v * \check{\varphi})^\vee) = u(\check{v} * \varphi)$ . Så  $E = \text{stöd}u \cap \text{stöd}(\check{v} * \varphi) \neq \emptyset$ . Låt  $y \in E$ . Då gäller  $y \in \text{stöd}u$  och  $y \in \text{stöd}\check{v} * \varphi$ , eller  $y = -z + x + \delta$ , där  $z \in \text{stöd}v$  och  $|\delta| < \epsilon$ . Så  $x = y + z - \delta \in \text{stöd}u + \text{stöd}v + O_\epsilon$ . Låt nu  $\epsilon \rightarrow 0$ .

c) Antag först att  $w$  har kompakt stöd. Då är  $w * \varphi \in \mathcal{D}$ , och vi får

$$((u * v) * w) * \varphi = (u * v) * (w * \varphi) = u * (v * (w * \varphi)).$$

Men vi har också

$$(u * (v * w)) * \varphi = u * ((v * w) * \varphi) = u * (v * (w * \varphi))$$

och alltså är  $u * (v * w) = (u * v) * w$ .

Om inte  $w$  har kompakt stöd, har både  $u$  och  $v$  det, och a) ger

$$\begin{aligned} u * (v * w) &= (v * w) * u = v * (w * u) = (w * u) * v \\ &= w * (u * v) = (u * v) * w. \end{aligned}$$

□

**Sats 8.16.**  $\partial^\alpha(u * v) = \partial^\alpha u * v = u * \partial^\alpha v$ .

*Bevis.* Om  $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  är  $\partial^\alpha u = \partial^\alpha \delta * u$ , ty

$$\partial^\alpha u * \varphi = u * \partial^\alpha \varphi = u * (\delta * \partial^\alpha \varphi) = u * (\partial^\alpha \delta * \varphi) = (u * \partial^\alpha \delta) * \varphi.$$

Vi får med hjälp av detta,

$$\partial^\alpha(u * v) = \partial^\alpha \delta * (u * v) = (\partial^\alpha \delta * u) * v = \partial^\alpha u * v.$$

Den andra likheten följer med hjälp av Sats 15 a). □

**Sats 8.17.** Antag att  $u \in \mathcal{D}'_k$  och  $v \in C_0^k$  (eller  $u \in \mathcal{E}'_k$ ,  $v \in C^k$ ). Då är  $u * v$  den kontinuerliga funktionen  $x \mapsto \langle u_y, v(x - y) \rangle$ .

*Bevis.* Om  $x \rightarrow x_0$ , så  $v(x - \cdot) \rightarrow v(x_0 - \cdot)$  i  $C_0^k$ . Men  $u$  är kontinuerlig på  $C_0^k$ , och vi får  $\langle u_y, v(x - y) \rangle \rightarrow \langle u_y, v(x_0 - y) \rangle$ , så  $h(x) = \langle u_y, v(x - y) \rangle$  är kontinuerlig. Vi får

$$\begin{aligned} h * \psi(x) &= \int h(x - t)\psi(t)dt = \int u * v(x - t)\psi(t)dt \\ &= (u * v) * \psi(x), \quad \psi \in \mathcal{D}, \end{aligned}$$

så  $h = u * v$ . □

**Övning 8.6.** Låt  $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$  med stöd i  $\{x \geq 0\}$ . Definiera  $u * v$ .

**Övning 8.7.** H 4.2.1

**Övning 8.8.** H 4.2.2

**Övning 8.9.** H 4.2.3

**Övning 8.10.** H 4.2.4

# Kapitel 9

## Fundamentallösningar

Låt

$$P = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial^\alpha$$

vara en differentialoperator med konstanta koefficienter och  $E$  en fundamentallösning till  $P$ , dvs.  $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$  och  $PE = \delta$ . Då gäller

$$P(E * f) = f, \quad f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), \quad (9.1)$$

och

$$E * Pu = u, \quad u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n). \quad (9.2)$$

så  $E$  är både vänster och högerinvers till  $P$  på  $\mathcal{E}'$ . (1) ger alltså en lösning;  $u = E * f$ ; till ekvationen  $Pu = f$  om  $f$  har kompakt stöd. (2) kan användas till att studera regularitet hos lösningar till  $Pu = f$ .

**Anmärkning 9.1.** I Kapitel 12 skall vi visa att varje differentialoperator med konstanta koefficienter har en fundamentallösning.  $\square$

I Kapitel 5 bestämde vi fundamentallösningar till Laplace och värmeledningsekvationerna. Ett annat exempel är att

$$E_k(x) = \begin{cases} (x_1 \dots x_n)^k / (k!)^n, & \text{alla } x_i > 0 \\ 0 & \text{f.ö.} \end{cases}$$

är en fundamentallösning till  $P_{k+1} = \partial_1^{k+1} \dots \partial_n^{k+1}$ . Med hjälp av detta kan vi bevisa

**Sats 9.2.** Om  $u \in \mathcal{E}'_m(\mathbb{R}^n)$ , så finns en kontinuerlig funktions  $f$  med

$$\partial_1^{m+2} \dots \partial_n^{m+2} f = u.$$

*Bevis.*  $E_{m+1}$  är en fundamentallösning till  $P_{m+2}$ . Så  $f = E_{m+1} * u$  satisfierar  $P_{m+2}f = u$ . Enligt Sats 8.17 är  $f$  kontinuerlig.  $\square$

Ett korrolarium till Sats 1, är följande representationssats för distributioner.

**Sats 9.3.** Om  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , så finns  $f_\alpha \in C(\Omega)$  med

$$u = \sum \partial^\alpha f_\alpha$$

i  $\mathcal{D}'$ . Summa är lokalt ändlig, och om  $u$  har ändlig ordning är summan ändlig.

*Bevis.* Välj en partition av enheten  $\psi_i \in C_0^\infty$  och  $\chi_i \in C_0^\infty$  med  $\chi_i = 1$  på stöd  $\psi_i$ . Detta kan göras så att  $\sum \chi_i$  är lokalt ändlig. Då gäller

$$u(\varphi) = \sum_i \psi_i u(\varphi) = \sum_i \chi_i u(\psi_i \varphi).$$

Nu har  $\chi_i u$  kompakt stöd, och alltså ändlig ordning. Sats 1 ger  $\chi_i u = \partial^{\alpha_i} f_i$ ,  $f_i \in C$ . Så

$$u(\varphi) = \sum_i \partial^{\alpha_i} f_i(\psi_i \varphi) = \sum_i (-1)^{|\alpha_i|} \int f_i \partial^{\alpha_i}(\psi_i \varphi).$$

Om vi beräknar  $\partial^{\alpha_i}(\psi_i \varphi)$  ger detta

$$u(\varphi) = \sum_i \sum_\alpha (-1)^{|\alpha|} \int f_{i,\alpha} \partial^\alpha \varphi = \sum_\alpha \sum_i \partial^\alpha f_{i,\alpha}(\varphi).$$

Sätt nu  $f_\alpha = \sum_i f_{i,\alpha}$ .  $\square$

För att studera regulariteten av lösningar till  $Pu = f$ , vill vi studera den mängd där  $u$  inte är  $C^\infty$ .

**Definition 9.4.** Singulära stödet till en distribution  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$  betecknas *singstöd*  $u$  och består av de punkter i  $\Omega$ , som inte har någon omgivning där  $u$  är  $C^\infty$ .  $\square$

singstöd  $u$  är den minsta slutna mängd, sådan att  $u$  är  $C^\infty$  i komplementet. Det är klart att  $\text{singstöd } u \subset \text{stöd } u$ .

**Sats 9.5.** Om  $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ , och minst en har kompakt stöd, så är

$$\text{singstöd}(u * v) \subset \text{singstöd } u + \text{singstöd } v.$$

*Bevis.* Sätt  $u_1 = u$  och  $u_2 = v$ . Låt oss först anta att båda distributionerna har kompakt stöd. Låt  $K_i = \text{sing stöd } u_i$ ,  $\Omega_i$  en omgivning till  $K_i$  och tag  $\psi_i \in C_0^\infty(\Omega_i)$  med  $\psi_i = 1$  på  $K_i$ . Då är

$$\begin{aligned} u_1 * u_2 &= (\psi_1 u_1 + (1 - \psi_1)u_1) * (\psi_2 u_2 + (1 - \psi_2)u_2) \\ &= \psi_1 u_1 * \psi_2 u_2 + \psi_1 u_1 * (1 - \psi_2)u_2 \\ &\quad + (1 - \psi_1)u_1 * \psi_2 u_2 + (1 - \psi_1)u_1 * (1 - \psi_2)u_2. \end{aligned}$$

Eftersom  $(1 - \psi_i)u_i \in C_0^\infty$ , är enligt Sats 8.1 de tre sista termerna  $C^\infty$ . Alltså är

$$\begin{aligned} \text{sing stöd}(u_1 * u_2) &= \text{sing stöd}(\psi_1 u_1 * \psi_2 u_2) \\ &\subset \text{stöd}(\psi_1 u_1 * \psi_2 u_2) \subset \text{stöd } \psi_1 + \text{stöd } \psi_2 \subset \Omega_1 + \Omega_2. \end{aligned}$$

Då  $\Omega_i \downarrow K_i$ , får vi påståendet.

Om inte båda distributionerna har kompakt stöd, kan vi enligt Sats 8.15 anta att  $u \notin \mathcal{E}'$ ,  $v \in \mathcal{E}'$ . För att studera singstöd  $(u * v)$  nära  $x$  skriver vi  $u = u_1 + u_2$  där  $u_1$  har kompakt stöd och  $u_2$  inte råkar en omgivning av  $\{x\}$  – stöd  $v$ . Då är  $\text{sing stöd}(u * v) \subset \text{sing stöd } u_1 * v \cup \text{sing stöd } u_2 * v$ . Men  $\text{sing stöd}(u_2 * v) \subset \text{stöd}(u_2 * v) \subset \text{stöd } u_2 + \text{stöd } v$ , som är disjunkt med en omgivning  $O_x$  av  $x$ . Så

$$\begin{aligned} \text{sing stöd}(u * v) \cap O_x &\subset \text{sing stöd}(u_1 * v) \cap O_x \\ &\subset (\text{sing stöd } u_1 + \text{sing stöd } v) \cap O_x = (\text{sing stöd } u + \text{sing stöd } v) \cap O_x, \end{aligned}$$

och satsen är bevisad. □

**Sats 9.6.** Om  $P$  har en fundamentallösning med singstöd  $E = \{0\}$ , så är singstöd  $u = \text{sing stöd } Pu$ ,  $u \in \mathcal{D}'$ .

**Anmärkning 9.7.** Omvändningen gäller också. Så om det finns en fundamentallösning med singulärt stöd i origo, så har alla det. □

*Bevis.*  $\text{sing stöd } Pu \subset \text{sing stöd } u$  gäller alltid, ty om  $u$  är  $C^\infty$ , så är också  $Pu$  det. För den omvända inklusionen observerar vi först att om  $u$  har kompakt stöd, så är  $u = E * Pu$  och enligt Sats 5 är

$$\text{sing stöd } u \subset \text{sing stöd } E + \text{sing stöd } Pu = \text{sing stöd } Pu.$$

Om  $u$  inte har kompakt stöd, så tag  $\psi \in C_0^\infty$  med  $\psi = 1$  på en öppen mängd  $\Omega$ . Då är

$$\text{sing stöd } \psi u \subset \text{sing stöd } P(\psi u).$$

Men på  $\Omega$  är  $P(\psi u) = Pu$  och  $\psi u = u$ , och resultatet följer. □

En differentialoperator  $P$  kallas *hypoelliptisk* om varje lösning  $u$  till  $Pu = f$  är  $C^\infty$  då  $f$  är det. Sats 6 visar alltså att  $P$  är hypoelliptisk om  $P$  har en fundamentallösning  $E$  med singstöd  $E = \{0\}$ . Laplace och värmeledningsoperatorerna är hypoelliptiska. I Kapitel 12 skall vi visa att alla elliptiska operatorer är hypoelliptiska. Laplaceoperatorn är elliptisk, men inte värmeledningsoperatorn.

**Övning 9.1.** Visa att  $P(\frac{d}{dx})$  har en fundamentallösning för varje polynom (av en variabel).

**Övning 9.2.** H 4.4.3

**Övning 9.3.** H 4.4.4

**Övning 9.4.** H 4.4.5

**Övning 9.5.** H 4.4.6

**Övning 9.6.** H 4.4.9

# Kapitel 10

## Fouriertransformen

Om  $u$  är en "snäll" funktion av en variabel med period  $T$  så kan  $u$  skrivas

$$u(x) = \sum_{\nu} c_{\nu} e^{2\pi i \nu x / T}. \quad (10.1)$$

Då är

$$u(x) e^{-2\pi i m x / T} = \sum_{\nu} c_{\nu} e^{2\pi i (\nu - m) x / T},$$

så integration över  $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$  ger (formellt)

$$T c_{\nu} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(x) e^{-2\pi i \nu x / T} dx$$

eller

$$c_{\nu} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(x) e^{-2\pi i \nu x / T} dx$$

$c_{\nu}$  kallas för Fourierkoefficienterna till  $u$ . (1) är inversionssatsen. Man kan också bevisa Parsevals relation,

$$\sum |c_{\nu}|^2 = \frac{1}{2\pi} \|u\|_2^2.$$

Hur skall detta generaliseras till  $\mathbb{R}^n$ ? Låt oss först betrakta fallet  $n = 1$ . Låt  $u \in C_0^{\infty}(\mathbb{R})$  och välj  $T$  så stort att stöd  $u \subset (-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$ . Låt  $u_T$  vara den periodiska utvidgningen av  $u$ ,

$$u_T(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u(x - kT).$$



Då är

$$c_T(\nu) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(x) e^{-i\frac{2\pi\nu}{T}x} dx.$$

Så för  $|x| < \frac{T}{2}$  ger (1)

$$u(x) = u_T(x) = \sum_{\nu} c_T(\nu) e^{2\pi i \frac{\nu}{T} x}.$$

Definiera nu

$$\widehat{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-i\xi x} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Vi observerar att  $c_T(\nu) = \frac{1}{T} \widehat{u}(\frac{2\pi\nu}{T})$ , så vi kan skriva

$$u(x) = \sum \frac{1}{T} \widehat{u}\left(\frac{2\pi\nu}{T}\right) e^{2\pi i \frac{\nu}{T} x} = \frac{1}{2\pi} \sum \frac{2\pi}{T} \widehat{u}\left(\frac{2\pi\nu}{T}\right) e^{i\frac{2\pi\nu}{T} x}.$$

Detta är en Riemannsumma till integralen

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\xi.$$

Så låter vi  $T \rightarrow \infty$ , får vi

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\xi. \quad (10.2)$$

Med lite noggrannhet i argumentet kan detta göras till ett bevis för (2) då  $u$  är en snäll funktion. Vi skall inte genomföra detta utan bevisa (2) (och dess generalisering till  $\mathbb{R}^n$ ) direkt. Teorin för Fourierserier blir sedan ett korollarium till teorin för Fouriertransformen.

**Definition 10.1.** För  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  definierar vi Fouriertransformen av  $f$  genom

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix\xi} dx,$$

där  $x\xi = \sum_1^n x_i \xi_i$ . Vi skriver ibland  $\mathcal{F}f$  istället för  $\widehat{f}$ .

□

Vi skall bevisa följande viktiga egenskaper hos Fouriertransformen.

I. Inversionssatsen. Om  $f$  och  $\widehat{f} \in L^1$  så är

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

II. Parseval. Om  $f \in L^1 \cap L^2$ , så är  $\|f\|_2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \|\widehat{f}\|_2$ .

III. Om  $f, g \in L^1$  så gäller  $(f * g)^\wedge = \widehat{f} \widehat{g}$ .

IV.  $\mathcal{F}(P(D)f)(\xi) = P(\xi)\widehat{f}(\xi)$  där  $D_j = -i\partial_j$ .

**Övning 10.1.** Bevisa Riemann-Lebesgues lemma: Om  $f \in L^1$  så är  $\widehat{f}$  kontinuerlig och  $\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0$  då  $|\xi| \rightarrow \infty$ .

**Övning 10.2.** Bevisa III och IV.

För att lösa differentialekvationen  $P(D)u = f$  kan vi använda I och IV. Fouriertransformering ger  $P(\xi)\widehat{u}(\xi) = \widehat{f}(\xi)$ . Så  $\widehat{u}(\xi) = \widehat{f}(\xi)/P(\xi)$  och  $u = \mathcal{F}^{-1}(\widehat{f}/P)$ . För att kunna använda denna metod "ofta", vill vi definiera Fouriertransformen av en distribution. Som motivering för definitionen, observerar vi att Fubinis sats ger

**Proposition 10.2.** Om  $f, g \in L^1$  så  $\int_{\mathbb{R}^n} f\widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}g$ .

**Övning 10.3.** Bevisa Proposition 2.

Så för en  $L^1$ -funktion gäller

$$\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}\varphi = \int_{\mathbb{R}^n} f\widehat{\varphi} = \langle f, \widehat{\varphi} \rangle.$$

Vi vill alltså definiera  $\widehat{u}$  då  $u \in \mathcal{D}'$  genom

$$\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle. \quad (10.3)$$

Men om  $\varphi \in \mathcal{D}$ ,  $\varphi \neq 0$ , så kan inte  $\widehat{\varphi}$  ha kompakt stöd och alltså gäller  $\widehat{\varphi} \notin \mathcal{D}$ . Därför är inte  $\langle u, \widehat{\varphi} \rangle$  definierat.

Vad skall vi då göra? Jo, vi betraktar en annan klass av testfunktioner  $\mathcal{S}$ , Schwartzklassen eller de snabbt avtagande funktionerna.

**Definition 10.3.**

(a)  $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  om  $\varphi \in C^\infty$  och  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi(x)| < \infty$  för alla  $k$  och  $\alpha$ .

(b)  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  om

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi_j(x)| \rightarrow 0$$

för all  $k$  och  $\alpha$ . □

**Definition 10.4.**

- (a) En *tempererad distribution* på  $\mathbb{R}^n$  är en linjär funktional på  $\mathcal{S}$  sådan att  $u(\varphi_j) \rightarrow 0$  då  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$ . Vi skriver  $u \in \mathcal{S}'$ .
- (b) En följd  $u_j \in \mathcal{S}'$  konvergerar mot  $u \in \mathcal{S}'$  om

$$u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi),$$

för varje testfunktion  $\varphi \in \mathcal{S}$ .

□

Vi skall visa att (3) är en riktig definition om  $u \in \mathcal{S}'$ . För att se detta skall vi först studera Fouriertransformen på  $\mathcal{S}$ . Vi börjar med följande

**Proposition 10.5.** Om  $f, g \in \mathcal{S}$  så gäller

- (a)  $\mathcal{F}(x^\alpha f(x)) = i^\alpha \partial^\alpha \widehat{f}$
  - (b)  $(\partial^\alpha f)^\wedge(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi)$
  - (c)  $(\tau_h f)^\wedge(\xi) = e^{-i\xi h} \widehat{f}(\xi)$
  - (d)  $\mathcal{F}(e^{ixh} f(x)) = \tau_h \widehat{f}$
  - (e)  $\widehat{f}_a(\xi) = \widehat{f}(a\xi)$
  - (f)  $(f(ax))^\wedge = (\widehat{f})_a$
  - (g)  $\int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g$
- och
- (h)  $\widehat{f} \in \mathcal{S}$ .

**Övning 10.4.** Bevisa Proposition 5.

**Sats 10.6 (Inversionsatsen).** Om  $f \in \mathcal{S}$  så gäller

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\xi} \widehat{f}(\xi) d\xi. \quad (10.4)$$

För att bevisa detta behöver vi hitta en funktion som uppfyller (3). Sedan följer (3) från Proposition 5. Vi väljer  $G(x) = e^{-|x|^2/2}$ .

**Lemma 10.7.**  $\widehat{G} = (2\pi)^{n/2}G$ .

*Bevis.* Fubinis sats visar att det räcker att behandla fallet  $n = 1$ .  $G$  uppfyller differentialekvationen

$$G'(x) + xG(x) = 0.$$

Fouriertransformerar vi denna ekvation ger Proposition 5 (a) och (b)

$$i\xi\widehat{G}(\xi) + i\widehat{G}'(\xi) = 0,$$

eller

$$\widehat{G}'(\xi) + \xi\widehat{G}(\xi) = 0.$$

Så  $\widehat{G}(\xi) = CG(\xi)$ . Sätter vi  $\xi = 0$ , får vi

$$C = \widehat{G}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

□

**Övning 10.5.**

a) Bevisa Lemma 1 med hjälp av Cauchys sats.

b) Bevisa Lemma 1 genom att låta  $\xi = \zeta \in \mathbb{C}$ , och beräkna  $\widehat{G}(i\eta)$ .

*Bevis av Sats 6.*  $\frac{1}{(2\pi)^n}(\widehat{G})_\delta$  är en approximativ identitet. Proposition 5 f) och g) ger

$$\frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)(\widehat{G})_\delta(x) dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi)G(\delta\xi) d\xi.$$

Låter vi  $\delta \rightarrow 0$ , får vi

$$f(0) = G(0) \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

**Övning 10.6.** Bevisa det.

Tillämpar vi detta på  $\tau_{-x}f$ , får vi

$$f(x) = \tau_{-x}f(0) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{-x}f)^\wedge(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi.$$

□

**Anmärkning 10.8.** Om vi bara antar att  $f \in L^1$  så

$$\frac{1}{(2\pi)^n} f * (\widehat{G})_\delta(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y) \widehat{G}_\delta(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} e^{-\delta^2|\xi|^2/2} d\xi.$$

Detta ger

$$f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} e^{-\delta^2|\xi|^2/2} d\xi,$$

med konvergens i  $L^1$ . Om speciellt  $\widehat{f} \in L^1$ , så gäller

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi \quad \text{n.ö.}$$

□

**Sats 10.9 (Plancherel).** Om  $\phi, \psi \in \mathcal{S}$  så är

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{\psi} = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\phi} \bar{\widehat{\psi}}.$$

**Korollarium 10.10 (Parseval).** Om  $\phi \in \mathcal{S}$  så

$$\|\phi\|_2 = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|\widehat{\phi}\|_2$$

.

*Bevis.* Proposition 2 g) ger

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi \widehat{\psi}_0 = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\phi} \psi_0.$$

Låt  $\widehat{\psi}_0 = \bar{\psi}$ . Då är enligt inversionsatsen

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\xi} \widehat{\psi}_0(\xi) d\xi = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix\xi} \bar{\psi}(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^n} \overline{\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\xi} \psi(\xi) d\xi} = \frac{1}{(2\pi)^n} \overline{\widehat{\psi}(x)}. \end{aligned}$$

Så  $\int_{\mathbb{R}^n} \phi \bar{\psi} = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\phi} \bar{\widehat{\psi}}$ . Korollariet följer om vi tar  $\psi = \phi$ . □

**Anmärkning 10.11.** Parsevals formel gäller också då  $\phi, \psi \in L^2$ . Vi skall visa det senare. □

För att visa att  $\widehat{u}$ , definierad genom  $\widehat{u}(\varphi) = u(\widehat{\varphi})$ , är en tempererad distribution behöver vi följande.

**Lemma 10.12.**  $\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$  kontinuerligt. dvs om  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$  så  $\widehat{\varphi}_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$ .

*Bevis.* Proposition 5 a) och b) ger  $\xi^\beta \partial^\alpha \widehat{\varphi}_j(\xi) = c\mathcal{F}(\partial^\beta(x^\alpha \varphi_j(x)))(\xi)$ .

Så

$$\begin{aligned} \sup_{\xi} |\xi^\beta \partial^\alpha \widehat{\varphi}_j(\xi)| &\leq c \sup_{\xi} \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\xi} \partial^\beta(x^\alpha \varphi_j(x)) dx \right| \\ &\leq c \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\beta(x^\alpha \varphi_j(x))| dx \rightarrow 0, \end{aligned}$$

då  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$ . □

Vi kan nu göra följande

**Definition 10.13.** Om  $u \in \mathcal{S}'$  är  $\widehat{u}$  den tempererade distribution som ges av

$$\widehat{u}(\varphi) = u(\widehat{\varphi}).$$

□

**Anmärkning 10.14.** Vi observerar att de två definitionerna vi har av  $\widehat{f}$  då  $f \in L^1$  sammanfaller. □

**Sats 10.15.** *Fouriertransformen är en kontinuerlig linjär bijektion av  $\mathcal{S}'$  på  $\mathcal{S}'$  med  $\widehat{\widehat{u}} = (2\pi)^n \check{u}$ .*

*Bevis.* Vi påminner om att  $\check{u}$  definieras genom  $\check{u}(\varphi) = u(\check{\varphi})$ , och  $u_j \rightarrow u$  i  $\mathcal{S}'$  betyder att  $u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi)$  för alla  $\varphi \in \mathcal{S}$ . Satsen är en enkel följd av motsvarande egenskaper på  $\mathcal{S}$ :

$$\widehat{\widehat{u}}(\varphi) = \widehat{u}(\widehat{\varphi}) = u(\widehat{\widehat{\varphi}}) = (2\pi)^n u(\check{\varphi}) = (2\pi)^n \check{u}(\varphi)$$

och

$$\widehat{u}_j(\varphi) = u_j(\widehat{\varphi}) \rightarrow u(\widehat{\varphi}) = \widehat{u}(\varphi)$$

om  $u_j \rightarrow u$  i  $\mathcal{S}'$ . □

**Exempel 10.16.** a) Ett mått med  $\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{-k} d\mu(x) < \infty$  för något  $k$  är en tempererad distribution.

b) Om  $f \in L^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , så  $f \in \mathcal{S}'$ .

(Bevis. Hölders olikhet)

c)  $\widehat{\delta} = 1$  och  $\widehat{1} = (2\pi)^n \delta$ .

(d)  $e^x$  är ingen tempererad distribution. □

**Proposition 10.17.** Om  $u \in \mathcal{S}'$  så gäller

a)  $(D_j u)^\wedge = \xi_j \widehat{u}$

b)  $(x_j u)^\wedge = D_j \widehat{u}$

c)  $(\tau_h u)^\wedge(\xi) = \exp(-ih\xi) \widehat{u}(\xi)$

och

d)  $\mathcal{F}(\exp(ixh)u) = \tau_h \widehat{u}$ .

*Bevis.* Det är lätt att se att  $D_j u, x_j u, \dots$  är tempererade distributioner. Formlerna följer sedan från Proposition 5. (Kom ihåg att  $D_j = -i\partial_j$ .)  $\square$

**Övning 10.7.** Visa att  $e^x \cos(e^x) \in \mathcal{S}'$ .

**Övning 10.8.** Visa att  $u \in \mathcal{S}'$  omm

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{k+|\alpha| \leq N} \sup(1 + |x|^2)^k |\partial^\alpha \varphi(x)|$$

för något  $N$ .

**Övning 10.9.** H 7.1.10

**Övning 10.10.** H 7.1.19

**Övning 10.11.** H 7.1.20

**Övning 10.12.** H 7.1.21

**Övning 10.13.** H 7.1.22

**Övning 10.14.** H 7.6.1

# Kapitel 11

## Fouriertransformen på $L^2$

Enligt Exempel 10.16b) så har  $f \in L^2$  en Fouriertransform definierad som en tempererad distribution.

**Sats 11.1.** Om  $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$  så  $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$  och

$$\|f\|_2 = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|\hat{f}\|_2.$$

Vidare ges  $\hat{f}$  av

$$\hat{f}(\xi) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq N} e^{-i\xi x} f(x) dx$$

med konvergens i  $L^2$ .

*Bevis.* Tag  $f_n \in C_0^\infty$ ,  $f_n \rightarrow f$  i  $L^2$ . Då är  $f_n$  en Cauchyföljd i  $L^2$ . Plancherels sats ger

$$\|\hat{f}_n - \hat{f}_m\|_2 = c \|f_n - f_m\|_2 \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty.$$

Så  $\hat{f}_n$  är också en Cauchyföljd i  $L^2$ . Men  $L^2$  är fullständigt så  $\hat{f}_n \rightarrow g$  i  $L^2$  för någon funktion  $g \in L^2$ . Men då gäller också  $\hat{f}_n \rightarrow g$  i  $\mathcal{S}'$ . Vidare så  $f_n \rightarrow f$  i  $\mathcal{S}'$ , och eftersom Fouriertransformen är kontinuerlig på  $\mathcal{S}'$  har vi  $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$  i  $\mathcal{S}'$ . Så  $g = \hat{f}$ . Vi får

$$\|\hat{f}\|_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\hat{f}_n\|_2 = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_2 = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|f\|_2.$$

Låt nu  $f_N = f\chi_{|x| \leq N}$ . Då gäller  $f_N \rightarrow f$  i  $L^2$  och  $f_N \in L^1$ . Så

$$\hat{f}_N(\xi) = \int_{|x| \leq N} e^{-ix\xi} f(x) dx,$$



och Plancherels sats ger

$$\|\hat{f} - \hat{f}_N\|_2 = c\|f - f_N\|_2 \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty,$$

och vi är klara.

□

# Kapitel 12

## Fouriertransformen och faltningar

Vi skall visa att under lämpliga villkor gäller  $(u * v)^\wedge = \widehat{u} \widehat{v}$ .

Vi börjar med att observera att  $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset C^\infty$ . Inklusionerna är kontinuerliga, dvs. om  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}$  så gäller  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$  och detta medför i sin tur att  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $C^\infty$ . Vidare är  $\mathcal{D}$  tätt i  $\mathcal{S}$  som är tätt i  $C^\infty$ . (Visa det!) Så

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

**Definition 12.1.** Om  $u \in \mathcal{S}'$  och  $\phi \in \mathcal{S}$  så definierar vi faltningen  $u * \phi$  genom  $u * \phi(x) = \langle u_y, \phi(x - y) \rangle$ .  $\square$

**Sats 12.2.** Om  $u \in \mathcal{S}'$  och  $\phi \in \mathcal{S}$  så gäller

(a)  $u * \phi \in C^\infty$  och  $\partial^\alpha(u * \phi) = \partial^\alpha u * \phi = u * \partial^\alpha \phi$

(b)  $u * \phi$  majoreras av ett polynom (så  $u * \phi \in \mathcal{S}'$ ) och  $(u * \phi)^\wedge = \widehat{\phi} \widehat{u}$ .

(c)  $u * (\phi * \psi) = (u * \phi) * \psi$  ( $\psi \in \mathcal{S}$ )

och

(d)  $\widehat{u} * \widehat{\phi} = (2\pi)^n (\phi u)^\wedge$ .

*Bevisskiss.* (a) Vi antar att  $n = 1$ . Den andra likheten bevisas på samma sätt som i Sats 8.1. Som i beviset av Sats 8.1 följer den första likheten om vi kan visa att

$$\frac{\phi(x+h) - \phi(x)}{h} \longrightarrow \phi'(x) \text{ i } \mathcal{S}.$$

Det är elementärt men jobbigt att göra det. Enklast är (nog) att Fouriertransformera.

(b) Enligt Övning 10.8 gäller

$$\begin{aligned}
|u * \phi(x)| &= |\langle u_y, \phi(x-y) \rangle| \\
&\leq C \sup_y \sum_{k+|\alpha| \leq N} (1+|y|^2)^k |\partial^\alpha \phi(x-y)| \\
&\leq C \sup_y \sum_{k+|\alpha| \leq N} (1+|x|^2)^k (1+|x-y|^2)^k |\partial^\alpha \phi(x-y)| \\
&\leq C(1+|x|^2)^N.
\end{aligned}$$

Vidare gäller för  $\psi \in \mathcal{D}$  att

$$\begin{aligned}
(u * \phi)^\wedge(\widehat{\psi}) &= (u * \phi)(\widehat{\psi}) = (2\pi)^n (u * \phi)(\check{\psi}) = (2\pi)^n \int u * \phi(x) \psi(-x) dx \\
&= (2\pi)^n \int_{-K} \langle u_y, \psi(-x) \phi(x-y) \rangle dx = \text{Approximera med Riemannsumma} = \\
&= (2\pi)^n \langle u_y, \int \psi(-x) \phi(x-y) dx \rangle = (2\pi)^n \langle u_y, \int \psi(x) \phi(-y-x) dx \rangle \\
&= (2\pi)^n \langle u_y, (\phi * \psi)^\vee \rangle = \langle u_y, (\phi * \psi)^\wedge \rangle = \widehat{u}((\phi * \psi)^\wedge) = \widehat{u}(\widehat{\phi\psi}) = \widehat{\phi} \widehat{u}(\widehat{\psi}).
\end{aligned}$$

Men  $\widehat{\mathcal{D}}$  är tätt i  $\mathcal{S}$ , och (b) följer.

(c) Från beviset av (b) får vi

$$u * \phi(\check{\psi}) = u((\phi * \psi)^\vee),$$

först för  $\psi \in \mathcal{D}$ , men på grund av kontinuiteten också för  $\psi \in \mathcal{S}$ . Detta kan skrivas

$$(u * \phi) * \psi(0) = u * (\phi * \psi)(0).$$

Det allmänna fallet följer om vi ersätter  $\psi$  med  $\tau_{-x}\psi$ .

(d) Från (b) har vi  $(\widehat{u * \phi})^\wedge = \widehat{\phi * \widehat{u}} = (2\pi)^{2n} \check{\phi} \check{\widehat{u}} = (2\pi)^{2n} (\phi u)^\vee = (2\pi)^n (\phi u)^\wedge$ .  
 Inversionsatsen ger  $\widehat{u * \phi} = (2\pi)^n (\phi u)^\wedge$ .

□

**Sats 12.3.** Om  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$  så  $\widehat{u} \in C^\infty$  och  $\widehat{u}(\xi) = u_x(e^{-ix\xi})$ .

*Bevis.* Låt  $\psi \in C_0^\infty$  vara 1 på en omgivning av stöd  $u$ . Då är  $\widehat{u} = (\psi u)^\wedge = (2\pi)^{-n} \widehat{u} * \widehat{\psi} \in C^\infty$  enligt Sats 1. Så

$$\begin{aligned}
\widehat{u}(\xi) &= \\
&= (2\pi)^{-n} \widehat{u} * \widehat{\psi}(\xi) = (2\pi)^{-n} \langle \widehat{u}_x, \widehat{\psi}(\xi-x) \rangle = (2\pi)^{-n} \langle \widehat{u}_x, \check{\psi}(x-\xi) \rangle \\
&= (2\pi)^{-2n} \langle \widehat{u}_x, \mathcal{F}^3 \psi(x-\xi) \rangle = (2\pi)^{-2n} \langle \widehat{u}_x, \tau_\xi \mathcal{F}^3 \psi(x) \rangle \\
&= (2\pi)^{-2n} \langle u_x, e^{-ix\xi} \mathcal{F}^4 \psi(x) \rangle = u_x(e^{-i\xi x} \psi(x)) = u_x(e^{-i\xi x}).
\end{aligned}$$

□

**Anmärkning 12.4.** Senare skall vi bevisa Paley-Wieners sats som ger mycket precisare information om  $\widehat{u}$  då  $u \in \mathcal{E}'$ . □

**Exempel 12.5.** Beräkna Fouriertransformen av  $\text{pv}\frac{1}{x}$ . □

*Metod 1.* Låt  $u = \text{pv}\frac{1}{x}$ . Då är  $u$  summan av en distribution i  $\mathcal{E}'$  och en  $L^2$ -funktion. Så

$$\widehat{u}(\xi) = \lim_{\substack{\epsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\epsilon < |x| < N} e^{-ix\xi} \frac{dx}{x}.$$

Om  $\xi > 0$  så ger variabelbytet  $y = x\xi$ ,

$$\widehat{u}(\xi) = \lim_{\substack{\epsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\epsilon < |x| < N} \frac{e^{-iy}}{y} dy = -i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy = -i\pi.$$

Om  $\xi < 0$ , får vi i stället  $\widehat{u}(\xi) = i\pi$ . Så

$$\widehat{u}(\xi) = -\pi \operatorname{sgn} \xi.$$

**Övning 12.1.** Visa att  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy = \pi$ .

*Metod 2.* Vi har  $x \text{pv}\frac{1}{x} = 1$  vilket ger  $i\widehat{u}' = 2\pi\delta$ . Så  $\widehat{u}' = -2\pi i\delta$  och  $\widehat{u} = -2\pi i(H + c)$ . Eftersom  $u$  är udda är  $\widehat{u}$  udda. Alltså är  $c = -\frac{1}{2}$  och

$$\widehat{u}(\xi) = -i\pi \operatorname{sgn} \xi.$$

I det sista argumentet använde vi att om  $u$  är udda så är också  $\widehat{u}$  det. Detta är klart om  $f \in L^1$  (enkelt variabelbyte).

**Definition 12.6.** En distribution är udda om  $\check{u} = -u$ . □

**Proposition 12.7.** Om  $u$  är en udda tempererad distribution så är dess Fouriertransform också udda.

*Bevis.* Vi har

$$\check{\widehat{u}}(\varphi) = \widehat{\check{u}}(\check{\varphi}) = u(\check{\check{\varphi}}) = u(\check{\varphi}) = \check{u}(\check{\varphi}) = -u(\check{\varphi}) = -\widehat{u}(\varphi).$$

□

**Anmärkning 12.8.** Avbildningen  $H\varphi = \text{pv}\frac{1}{x} * \varphi$  kallas Hilberttransformen, och är ett viktigt exempel på en singularär integraloperator. För Hilberttransformen gäller följande

**Sats 12.9.** Hilberttransformen är begränsad på  $L^p$ ,  $1 < p < \infty$ , och svag typ  $(1, 1)$ .

Exempel 1 och Plancherels sats bevisar detta då  $p = 2$ . □

Härnäst skall vi studera invariansegenskaper hos Fouriertransformen. Låt  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  vara en diffeomorfism. Om  $u$  är en funktion så gäller

$$\int u \circ F(x) \varphi(x) dx = \int u(y) \frac{\varphi}{|F'|} \circ F^{-1}(y) dy.$$

Så om  $u \in \mathcal{D}'$  definierar vi  $u \circ F$  genom

$$\langle u \circ F, \varphi \rangle = \langle u, \frac{\varphi}{|F'|} \circ F^{-1} \rangle$$

Speciellt om  $F = \Lambda$  är linjär så är

$$\langle u \circ \Lambda, \varphi \rangle = |\det \Lambda|^{-1} \langle u, \varphi \circ \Lambda^{-1} \rangle$$

□

**Definition 12.10.** En distribution  $u$  är radiell om  $u \circ O = u$  för alla ortogonala matriser  $O$ .

**Sats 12.11.** Om  $u$  är en radiell tempererad distribution så är  $\hat{u}$  radiell.

*Bevis.* Vi observerar först att om  $\varphi \in \mathcal{S}$  så är

$$\begin{aligned} \hat{\varphi} \circ O(\xi) &= \hat{\varphi}(O\xi) = \int e^{-ixO\xi} \varphi(x) dx \\ &= \int e^{-iO^*x\xi} \varphi(x) dx = \left[ \begin{array}{l} y = O^*x \\ x = Oy \end{array} \right] \\ &= \int e^{-iy\xi} \varphi(Oy) dy = (\varphi \circ O)^\wedge(\xi). \end{aligned}$$

Vi får nu

$$\begin{aligned} \langle \hat{u} \circ O, \varphi \rangle &= \langle \hat{u}, \varphi \circ O^{-1} \rangle = \langle u, (\varphi \circ O^*)^\wedge \rangle \\ &= \langle u, \hat{\varphi} \circ O^* \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \circ O^{-1} \rangle = \langle u \circ O, \hat{\varphi} \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle = \langle \hat{u}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

**Sats 12.12.** Om  $u$  är en tempererad distribution som är homogen av grad  $\alpha$  så är  $\hat{u}$  homogen av grad  $-n - \alpha$ .

*Bevis.* Enligt Definition 4.4 är  $u \in \mathcal{S}'$  homogen av grad  $\alpha$  om  $\langle u, \varphi_t \rangle = t^\alpha \langle u, \varphi \rangle$ . Därför gäller

$$\begin{aligned} \langle \widehat{u}, \varphi_t \rangle &= \langle u, \widehat{\varphi}_t \rangle = \langle u_\xi, \widehat{\varphi}(t\xi) \rangle = t^{-n} \langle u, (\widehat{\varphi})_{1/t} \rangle \\ &= t^{-(n+\alpha)} \langle u, \widehat{\varphi} \rangle = t^{-(n+\alpha)} \langle \widehat{u}, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

**Exempel 12.13.** En fundamentallösning till  $\Delta$  då  $n \geq 3$ . Om vi Fouriertransformerar

$$\Delta u = \delta,$$

får vi

$$-|\xi|^2 \widehat{u}(\xi) = 1.$$

En lösning är

$$\widehat{u}(\xi) = -\frac{1}{|\xi|^2}.$$

Observera att  $\frac{1}{|\xi|^2} \in L^1_{\text{lok}}(\mathbb{R}^n)$  om  $n \geq 3$ , och att  $\frac{1}{|\xi|^2}$  är radiell och homogen av grad  $-2$ . Så  $u$  är radiell och homogen av grad  $2 - n$ . Alltså är

$$u(x) = \frac{c_n}{|x|^{n-2}}.$$

*Argument.* Om  $n = 3$  så  $\frac{1}{|\xi|^2} \in L^1 + L^2$ , och  $u$  är en funktion. För  $n > 4$  så  $\frac{1}{|x|^{n-2}} \in L^1 + L^2$ , och vi kan argumentera som ovan med hjälp av inversionssatsen. Om  $n = 4$  gäller att  $u_\epsilon = \frac{1}{|x|^{2+\epsilon}} \in L^1 + L^2$  så dess Fouriertransform är en konstant gånger  $\frac{1}{|\xi|^{2-\epsilon}}$  och påståendet följer om vi låter  $\epsilon \rightarrow 0$ .

Ett alternativt sätt är Övning 4 nedan.

**Övning 12.2.** Bestäm  $c_n$ .

**Övning 12.3.** Vad händer då  $n = 2$ ?

**Övning 12.4.** Bestäm alla radiella distributioner i  $\mathbb{R}^n$  som är homogena av grad  $\alpha$ .

Ledning. Behandla först  $\mathbb{R}$ . Derivera  $\langle u, \varphi_t \rangle = t^\alpha \langle u, \varphi \rangle$  med avseende på  $t$ .

Varning. Var försiktig med  $-\alpha = n, n + 2, n + 4, \dots$

**Övning 12.5.** Vad är Fouriertransformen av  $\text{fp}|x|^\alpha$  i  $\mathbb{R}^n$ ?

**Övning 12.6.** Vad bör man mena med  $\text{fp}|x|^\alpha$  i  $\mathbb{R}^n$ ? Vad är dess Fouriertransform?

**Övning 12.7.** Bestäm en fundamentallösning till värmeledningsekvationen.

Ledning. Bestäm  $\mathcal{F}E(x, t)$  där  $\mathcal{F}$  är Fouriertransformen med avseende på  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Sats 12.14.** Om  $u \in \mathcal{S}'$  och  $v \in \mathcal{E}'$  så  $u * v \in \mathcal{S}'$  och

$$(u * v)^\wedge = \widehat{v} \widehat{u}.$$

*Bevis.* Om  $\varphi \in C_0^\infty$  så är

$$u * v(\varphi) = (u * v) * \check{\varphi}(0) = u * (v * \check{\varphi})(0) = u((v * \check{\varphi})^\vee) = u(\check{v} * \varphi).$$

För att se att  $u * v \in \mathcal{S}'$ , behöver vi visa att  $\check{v} * \varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$  när  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$ . Låt  $K$  vara en kompakt omgivning av stöd  $v$  och  $k$  ordningen av  $v$ . Då gäller

$$|\partial^\beta(\check{v} * \varphi_j)(x)| = |\langle v_y, \partial^\beta \varphi_j(y - x) \rangle| \leq C \sum_{|\gamma| \leq k} \sup_{y \in K} |\partial^{\beta+\gamma} \varphi_j(x - y)|.$$

Så

$$(1 + |x|^2)^\ell |\partial^\beta(\check{v} * \varphi_j)(x)| \leq C \sum_{|\gamma| \leq k} (1 + |x|^2)^\ell \sup_{y \in K} |\partial^{\beta+\gamma} \varphi_j(x - y)| \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty.$$

För att beräkna Fouriertransformen observerar vi att

$$\begin{aligned} (u * v)^\wedge(\varphi) &= u * v(\widehat{\varphi}) = u(\check{v} * \widehat{\varphi}) \\ &= (2\pi)^{-n} u(\widehat{v} * \widehat{\varphi}) = u((\widehat{v}\varphi)^\wedge) = \widehat{u}(\widehat{v}(\varphi)) = \widehat{v} \widehat{u}(\varphi). \end{aligned}$$

□

**Övning 12.8.** Beräkna  $(\frac{1}{1+x^2})^{*n}$  och  $(e^{-x^2})^{*n}$ .

**Övning 12.9.** H 7.1.6

**Övning 12.10.** H 7.1.7

**Övning 12.11.** H 7.1.9

**Övning 12.12.** H 7.1.11

**Övning 12.13.** H 7.1.18

**Övning 12.14.** H 7.1.28

# Kapitel 13

## Paley-Wieners sats

Om  $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$  vet vi att  $\hat{u} \in C^\infty$  och

$$\hat{u}(\xi) = u(e^{-ix\xi}).$$

Vi skall visa att  $\hat{u}$  kan utvidgas till en analytisk funktion i  $\mathbb{C}^n$ , dvs.  $\hat{u}(\zeta_1, \dots, \zeta_n)$  är analytisk i varje variabel. Vi börjar med en version av satsen för testfunktioner.

**Proposition 13.1.**

(a) Om  $\phi \in C_0^\infty$  och stöd  $\phi \subset \{x; |x| \leq R\}$ , så är

$$\hat{\phi}(\zeta) = \int e^{-ix\zeta} \phi(x) dx$$

en hel funktion med

$$|\hat{\phi}(\zeta)| \leq C_N (1 + |\zeta|)^{-N} e^{R|\operatorname{Im} \zeta|} \quad (13.1)$$

för alla  $N$ .

(b) Omvänt, om  $\hat{\phi}$  är hel och uppfyller (1), så gäller  $\phi \in C_0^\infty$  och stöd  $\phi \subset \{x; |x| \leq R\}$ .

*Bevis.* (a) Att  $\hat{\phi}$  är analytisk ser vi genom att derivera under integraltecknet. Vidare är om  $\zeta = \xi + i\eta$ ,

$$|\hat{\phi}(\zeta)| \leq \int e^{x\eta} |\phi(x)| dx \leq C e^{R|\eta|} \quad (13.2)$$

(1) följer nu om vi använder (2) på  $D^\alpha \phi$ .



(b) Vi observerar först att  $\phi \in C^\infty$ , eftersom vi kan derivera under integraltecknet i Fouriers inversionsformel på grund av att  $\hat{\phi}$  är snabbt avtagande. På grund av de snabba avtagandet och Cauchys sats kan vi byta integrationskontur och integrera över  $\{\zeta; \text{Im}\zeta_i = \eta_i\}$ . Vi får

$$|\phi(x)| = \left| (2\pi)^{-n} \int e^{ix(\xi+i\eta)} \hat{\phi}(\xi+i\eta) d\xi \right| \leq C e^{-x\eta} e^{R|\eta|}.$$

Sätter vi  $\eta = tx$ , får vi

$$|\phi(x)| \leq C e^{-t|x|(|x|-R)}.$$

Så om  $|x| > R$ , ser vi genom att låt  $t \rightarrow \infty$  att  $\phi(x) = 0$ . Så stöd  $\phi \subset \{x; |x| \leq R\}$ . □

För distributioner gäller

**Sats 13.2 (Paley-Wieners sats).**

(a) Om  $u$  är en distribution av ordning  $N$  med stöd i  $\{x; |x| \leq R\}$  så är  $\hat{u}$  en hel funktion och

$$|\hat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{R|\text{Im}\zeta|}. \quad (13.3)$$

(b) Omvänt, om  $\hat{u}$  är hel och uppfyller (3) för något  $N$ , så är  $u$  en distribution med stöd i  $\{x; |x| \leq R\}$ .

*Bevis.* (a) Att  $\hat{u}$  är hel följer av att

$$\frac{\partial}{\partial \zeta_i} \hat{u}(\zeta) = \frac{\partial}{\partial \zeta_i} u(e^{-ix\zeta}) = u\left(\frac{\partial}{\partial \zeta_i}(e^{-ix\zeta})\right).$$

Den sista likheten beror på att

$$\frac{e^{-ix(\zeta+\omega_i)} - e^{-ix\zeta}}{\omega_i} \rightarrow \frac{\partial}{\partial \zeta_i}(e^{-ix\zeta}) \text{ i } C^\infty, \quad \omega_i \rightarrow 0.$$

För att bevisa (3) fixerar vi  $\chi_\delta \in C_0^\infty$  med  $\chi_\delta = 1$  i en omgivning av  $\{x; |x| \leq R\}$  och stöd  $\chi_\delta \subset \{x; |x| < R+\delta\}$ . Vi kan välja  $\chi_\delta$  så att  $\|D^\alpha \chi_\delta\|_\infty \leq C\delta^{-|\alpha|}$ . Vi får

$$\begin{aligned} |\hat{u}(\zeta)| &= |u(e^{-ix\zeta})| = |u(\chi_\delta(x)e^{-ix\zeta})| \\ &\leq C_N \sup_{|\alpha| \leq N} \sum |D_x^\alpha(\chi_\delta(x)e^{-ix\zeta})| \\ &\leq C e^{(R+\delta)|\text{Im}\zeta|} \sum_{|\beta| \leq N} \delta^{-|\beta|} (1 + |\zeta|)^{N-\beta}. \end{aligned}$$

(3) följer om vi sätter  $\delta = \frac{1}{1+|\zeta|}$ .

(b) Den polynomiella tillväxten ger att  $\hat{u}$  och därmed  $u$  ligger i  $\mathcal{S}'$ . Låt  $\varphi_\delta \in \mathcal{S}$  vara en approximativ identitet och sätt  $u_\delta = u * \varphi_\delta$ . Då gäller  $u_\delta \in C^\infty$ ,  $u_\delta \rightarrow u$  då  $\delta \rightarrow 0$ , och

$$|\hat{u}_\delta(\zeta)| = |\hat{u}(\zeta)\hat{\varphi}(\delta\zeta)| \leq C_{M,\delta}(1 + |\zeta|)^{-M} \exp((R + c\delta)|\operatorname{Im}\zeta|).$$

Vi har använt (3) och (1) i Proposition 1. Vi kan nu använda Proposition 1 på  $u_\delta$  och får stöd  $u_\delta \subset \{x; |x| \leq (R + c\delta)\}$ . Detta ger, genom att låta  $\delta \rightarrow 0$ , stöd  $u \subset \{x; |x| \leq R\}$ .  $\square$

**Övning 13.1.** Antag  $u, v \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$  och  $u * v = 0$ . Visa att då är  $u = 0$  eller  $v = 0$ . Måste både  $u$  och  $v$  ha kompakt stöd?

**Övning 13.2.** H 7.1.40.

# Kapitel 14

## Existens av fundamentallösningar

Låt  $P(D)$  vara en differentialoperator med konstanta koefficienter i  $\mathbb{R}^n$ . Vi skall visa att  $P(D)$  har en fundamentallösning  $E$ .

Vi gör först en formell räkning. Genom att Fouriertransformera  $P(D)E = \delta$ , får vi  $P(\xi)\widehat{E}(\xi) = 1$  och  $\widehat{E}(\xi) = P(\xi)^{-1}$ . Nu är

$$\langle E, \varphi \rangle = \langle E, \check{\varphi} \rangle = (2\pi)^n \langle E, \widehat{\check{\varphi}} \rangle = (2\pi)^n \langle \widehat{E}, \check{\varphi} \rangle,$$

så det är naturligt att definiera  $E$  genom

$$\langle E, \varphi \rangle = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} P(\xi)^{-1} \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi.$$

Då gäller (formellt)

$$\begin{aligned} \langle P(D)E, \varphi \rangle &= \langle E, P(-D)\varphi \rangle = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} P(\xi)^{-1} (P(-D)\varphi)\widehat{(-\xi)} d\xi \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} P(\xi)^{-1} P(\xi) \widehat{\varphi}(-\xi) d\xi = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

Tyvärr fungerar inte detta alltid eftersom  $P(\xi)$  kan vara 0. Vi skall därför "skjuta kontur" och definiera  $\langle E, \varphi \rangle$  genom en integral över en mängd i  $\mathbb{C}^n$  som inte går genom något nollställe till  $P$ .

**Sats 14.1.** *Varje linjär differentialoperator med konstanta koefficienter har en fundamentallösning  $E \in \mathcal{D}'$ .*

*Bevis.* Låt  $m = \text{grad } P$ . Efter ett linjärt koordinatbyte så kan  $P$  skrivas

$$\begin{aligned} P(\xi) &= P_{\xi'}(\xi_n) = \xi_n^m + P_{m-1}(\xi')\xi_n^{m-1} + \dots + P_0(\xi') \\ &= (\xi_n - \alpha_1(\xi')) \dots ((\xi_n - \alpha_m(\xi')). \end{aligned}$$

Här är  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) = (\xi', \xi_n)$  och  $\alpha_i(\xi')$  är nollställena till  $P_{\xi'}(\xi_n)$ . Betrakta  $\text{Im } \alpha_i(\xi'), i = 1, 2, \dots, m$ . Vi kan välja  $\phi(\xi') \in \mathbb{R}$  så att  $|\phi(\xi')| \leq m+1$  och  $|\phi(\xi') - \alpha_i(\xi')| \geq |\phi(\xi') - \text{Im } \alpha_i(\xi')| \geq 1$ . Definiera nu  $\langle E, \varphi \rangle$  för  $\varphi \in \mathcal{D}$  genom

$$\langle E, \varphi \rangle = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} d\xi' \int_{\text{Im } \zeta_n = \phi(\xi')} P(\zeta)^{-1} \widehat{\varphi}(-\zeta) d\zeta_n.$$

Enligt Paley-Wieners sats så är  $\widehat{\varphi}(\zeta)$  en hel analytisk funktion och

$$|\widehat{\varphi}(\zeta)| \leq \frac{C}{(1 + |\zeta|)^N} \sum_{|\alpha| \leq N} \|D^\alpha \varphi\|_\infty.$$

Vidare är  $|P(\zeta)^{-1}| \leq 1$ , så om  $N$  är stort nog, får vi

$$|\langle E, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \|D^\alpha \varphi\|_\infty.$$

Så  $E \in \mathcal{D}'$ . Slutligen ser vi att

$$\begin{aligned} \langle P(D)E, \varphi \rangle &= \langle E, P(-D)\varphi \rangle \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} d\xi' \int_{\text{Im } \zeta_n = \phi(\xi')} P(\zeta)^{-1} (P(-D)\varphi)^\wedge(-\zeta) d\zeta_n \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} d\xi' \int_{\text{Im } \zeta_n = \phi(\xi')} \widehat{\varphi}(-\zeta) d\zeta_n \\ &= \text{Cauchys sats} = (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} d\xi' \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(-\xi_n) d\xi_n \\ &= (2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

□

**Övning 14.1.** Bestäm en fundamentallösning till Schrödingerekvationen

$$(D_t - \sum_1^n D_{x_i}^2)E = \delta.$$

( $D = -i\partial$ )

Ledning. Se Övning 10.14 och ledningen till Övning 12.7

# Kapitel 15

## Fundamentallösningar till elliptiska differentialoperatorer

Låt  $P(D)$  vara en differentialoperator med konstanta koefficienter. Polynomet  $P$  kan skrivas

$$P = P_m + P_{m-1} + \dots + P_0,$$

där  $P_k$  är ett polynom som är homogent av grad  $k$ . Vi säger att  $P(D)$  är *elliptisk* om  $P_m(\xi) \neq 0$  då  $\xi \neq 0$ ,  $\xi \in \mathbb{R}^n$ .

**Exempel 15.1.**  $\Delta$  och  $\bar{\partial}$  är elliptiska. Värmelednings och vågoperatorerna är inte elliptiska.  $\square$

**Sats 15.1.** Om  $P(D)$  är en elliptisk differentialoperator så finns en distribution  $E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  med singstöd  $E = \{0\}$  och  $P(D)E = \delta - \omega$ , för något  $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ .

**Korollarium 15.2.** Om  $P$  är elliptisk så är  $P$  hypoelliptisk.

*Bevis av korollariet.* Vi skall visa att  $u$  är  $C^\infty$  om  $P(D)u$  är det. Om  $u$  har kompakt stöd så är  $u = \delta * u = (P(D)E + \omega) * u = E * P(D)u + \omega * u \in C^\infty$ . Det allmänna fallet följer genom att betrakta  $\psi_n u$  där  $\psi_n \in C_n^\infty \in C_0^\infty$  och  $\psi_n = 1$  på  $\{|x| \leq n\}$  (jämför Sats 9.6)  $\square$

*Bevis av satsen.* Att  $P$  är elliptisk medför att  $|P_m(\xi)| \geq \delta > 0$  då  $|\xi| = 1$ . Homogeniteten ger därför

$$|P_m(\xi)| \geq \delta |\xi|^m.$$

Så om  $|\xi| > R$  och  $R$  är tillräckligt stort gäller därför

$$|P(\xi)| \geq c |\xi|^m.$$

Tag  $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  med  $\chi(\xi) = 1$  då  $|\xi| \leq R$ . Då är  $(1 - \chi)P^{-1}$  begränsad och alltså en tempererad distribution. Så vi kan definierar  $E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  genom

$$\widehat{E} = \frac{1 - \chi}{P}.$$

Då är

$$(P(D)E)^\wedge = P\widehat{E} = P\frac{1 - \chi}{P} = 1 - \chi = \widehat{\delta} - \chi.$$

Om vi definierar  $\omega$  genom  $\widehat{\omega} = \chi$ , så är  $\omega \in \widehat{\mathcal{D}} \subset \mathcal{S}$  och  $P(D)E = \delta - \omega$ . Det återstår att visa att  $E \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ . Observera att

$$(x^\beta D^\alpha E)^\wedge = cD^\beta(\xi^\alpha \frac{1 - \chi(\xi)}{P(\xi)}) = O(|\xi|^{-|\beta| - m + |\alpha|}), \quad |\xi| \rightarrow \infty.$$

Om vi tar  $|\beta|$  tillräckligt stort ser vi att  $(x^\beta D^\alpha E)^\wedge \in L^1$  så  $x^\beta D^\alpha E \in C$ . Så  $D^\alpha E \in C(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ , och vi är klara.  $\square$

# Kapitel 16

## Fourierserier

Låt  $u$  vara en distribution som är periodisk med period  $2\pi$  i varje variabel, dvs.

$$\langle u, \tau_{2\pi k}\varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle,$$

om  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Intuitivt är  $u$  bestämd av sina ”värden” på

$$T = \{x; 0 \leq x_i < 2\pi\}.$$

**Lemma 16.1.** *Om  $u$  är periodisk så  $u \in \mathcal{S}'$ .*

*Bevis.* Låt  $\psi \in C_0^\infty$  med  $0 \leq \psi \leq 1$  och  $\psi = 1$  på  $T$ . Sätt

$$\tilde{\psi}(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \psi(x - 2\pi k).$$

Då är  $\tilde{\psi}$  en periodisk  $C^\infty$ -funktion med  $\tilde{\psi} \geq 1$ . Så  $\phi = \psi/\tilde{\psi} \in C_0^\infty$  och

$$\sum_k \phi(x - 2\pi k) = 1.$$

Låt nu  $\varphi \in \mathcal{D}$ . Då är

$$\begin{aligned} \langle u, \varphi \rangle &= \langle u_x, \sum_k \phi(x - 2\pi k)\varphi(x) \rangle = \text{ändl. summa} \\ &= \sum_k \langle u_x, \phi(x - 2\pi k)\varphi(x) \rangle = \text{periodicitet} \\ &= \sum_k \langle u_x, \phi(x)\varphi(x + 2\pi k) \rangle = \langle u_x, \phi(x) \sum_k \varphi(x + 2\pi k) \rangle. \end{aligned}$$

Men om  $\varphi_j \rightarrow 0$  i  $\mathcal{S}$  så  $\phi(x) \sum_k \varphi(x + 2\pi k) \rightarrow 0$  i  $\mathcal{D}$  (Visa det!) Så högerledet definierar en utvidgning av  $u$  till  $\mathcal{S}'$ .  $\square$

För att beräkna  $\hat{u}$  visar vi först

**Sats 16.2 (Poissons summationsformel).** Om  $\varphi \in \mathcal{S}$  så är

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \widehat{\varphi}(2\pi k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \varphi(k).$$

*Bevis.* Låt  $u = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \delta_{2\pi k}$ . Då gäller  $\delta_{2\pi l} * u = u$  ty  $\delta_{2\pi l} * \delta_{2\pi k} = \delta_{2\pi(k+l)}$ . (Visa det!)

Så

$$(e^{-2\pi i l \xi} - 1)\hat{u} = 0.$$

Men  $e^{-2\pi i l \xi} - 1 \neq 0$  om  $\xi \notin \mathbb{Z}^n$ , så  $\hat{u}$  har stöd på  $\mathbb{Z}^n$ . Genom att välja olika  $l$  ser vi att nära origo gäller  $\xi_i \hat{u} = 0$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Så  $\hat{u} = c\delta_0$  där. Vidare är  $e^{-ikx}u = u$ , så  $\hat{u}$  är invariant under heltalstranslation. Vi får

$$\hat{u} = c \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \delta_k.$$

Detta betyder att

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \widehat{\varphi}(2\pi k) = c \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \varphi(k).$$

Om vi ersätter  $\varphi$  med en translation av  $\varphi$  får vi

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \widehat{\varphi}(2\pi k) e^{-2\pi i k x} = c \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \varphi(k + x).$$

Integration över  $\{x; 0 \leq x_i < 1\}$  ger

$$\widehat{\varphi}(0) = c \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = c\widehat{\varphi}(0)$$

och beviset är klart. □

Låt oss nu återvända till beräkningen av  $\hat{u}$  då  $u$  är periodisk. Om vi använder Poissons summationsformel på  $\varphi(y) = \psi(y)e^{-ixy}$  får vi eftersom  $\widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{\psi}(x + \xi)$ ,

$$\sum_k \widehat{\psi}(x + 2\pi k) = \sum_k \widehat{\varphi}(2\pi k) = \sum_k \varphi(k) = \sum_k e^{-ixk} \psi(k).$$

Från beviset av Lemma 1 har vi

$$\begin{aligned} \langle \hat{u}, \psi \rangle &= \langle u, \widehat{\psi} \rangle = \langle u, \phi(x) \sum_k \widehat{\psi}(x + k) \rangle \\ &= \langle u, \phi(x) \sum_k e^{-ixk} \psi(k) \rangle \\ &= \sum_k \psi(k) \langle u, \phi(x) e^{-ixk} \rangle. \end{aligned}$$



Alltså är  $\hat{u} = \sum_k c_k \delta_k$  där

$$c_k = \langle u, \phi(x)e^{-ixk} \rangle.$$

Om speciellt  $u$  är en funktion som är integrerbar på  $T$ , så är

$$\begin{aligned} c_k &= \langle u, \phi(x)e^{-ixk} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)\phi(x)e^{-ixk} dx \\ &= \sum_j \int_T u(x - 2\pi j)\phi(x - 2\pi j)e^{-2\pi i(x-j)k} dx \\ &= \int_T u(x)e^{-ixk} \sum_j \phi(x - 2\pi j) dx = \int_T u(x)e^{-ixk} dx. \end{aligned}$$

Så  $c_k$  är "våra gamla" Fourierkoefficienter. Inversionssatsen (Sats 10.6) ger

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k c_k e^{ikx} \quad \text{i } \mathcal{S}'.$$

Om  $u \in C^l$  så är  $c_k = O(|k|^{-l})$ ,  $|k| \rightarrow \infty$ , så summan är likformigt konvergent om  $l > n$  och vi har bevisat

**Sats 16.3.** Om  $u \in C^l(\mathbb{R}^n)$ ,  $l > n$ , och  $u$  är periodisk med period  $2\pi$  i varje variabel så är

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k c_k e^{ixk},$$

och serien konvergerar likformigt.

Vi avslutar detta kapitel med att bevisa

**Sats 16.4 (Plancherels sats).** Om  $u \in L^2(T)$  så

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k c_k e^{ixk} \quad \text{i } L^2,$$

och

$$\int_T |u|^2 dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k |c_k|^2.$$

Omvänt om  $\sum |c_k|^2 < \infty$  så är  $u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k c_k e^{ixk}$  en funktion i  $L^2(T)$  med Fourierkoefficienterna  $c_k$ .

*Bevis.* Om  $u \in C^{n+1}$ , så konvergerar serien likformigt. Vi får

$$\int_T |u|^2 dx = \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \sum_{k,l} c_k \bar{c}_l \int_T e^{ix(k-l)} dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum |c_k|^2.$$

Eftersom  $C^{n+1}$  är tätt i  $L^2$ , kan vi utvidga detta till  $u \in L^2$ . Tag  $u_n \in C^{n+1}$ ,  $u_n \rightarrow u$  i  $L^2$ . Då gäller också  $u_n \rightarrow u$  i  $\mathcal{S}'$  och  $\hat{u}_n \rightarrow \hat{u}$  i  $\mathcal{S}'$ . Men på grund av isometrin är  $\hat{u}_n$  en Cauchyföljd i  $l^2$ . Så  $\hat{u}_n \rightarrow \hat{u}$  i  $l^2$ . Alltså

$$\int_I |u|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I |u_n|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k |c_k(u_n)|^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum |c_k|^2.$$

Omvänt om  $\sum |c_k|^2 < \infty$  låt

$$u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_k e^{ixk} \text{ och } u_N(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ixk}.$$

Då gäller  $u_N \rightarrow u$  i  $L^2$  och  $\mathcal{S}'$  så

$$\hat{u} = \lim_{N \rightarrow \infty} \hat{u}_N = \sum c_k \delta_k.$$

□

**Anmärkning 16.5.** Om  $u$  är en funktion med perioden  $t$  så har  $u_t(x) = u(\frac{2\pi x}{t})$  perioden  $2\pi$  och vi kan på så sätt generalisera Fourierserier till funktioner med godtycklig period. □

**Övning 16.1.** H 7.2.1

**Övning 16.2.** H 7.2.5

**Övning 16.3.** H 7.2.8

**Övning 16.4.** Beräkna a)  $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$  b)  $\sum_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(n+a)^2}$  och c)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$ .

# Kapitel 17

## Några tillämpningar

### 17.1 Centrala gränsvärdessatsen.

Låt  $X, X_1, X_2, \dots$  vara oberoende likafördelade stokastiska variabler med  $E[X] = m$  och  $\text{Var}[X] = \sigma^2$ . Då gäller

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}y^2} dy. \quad (17.1)$$

Lite bakgrund: Till en stokastisk variabel  $X$  är associerat ett sannolikhetsmått  $\mu$  (vi skriver  $X \sim \mu$ ) genom

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x d\mu(y).$$

Om  $\mu_1$  och  $\mu_2$  är sannolikhetsmått, så definierar vi ett nytt sannolikhetsmått  $\mu_1 * \mu_2$  genom

$$\langle \mu_1 * \mu_2, \varphi \rangle = \int \varphi(x+y) d\mu_1(x) d\mu_2(y).$$

Då gäller  $(\mu_1 * \mu_2)^\wedge = \widehat{\mu}_1 \widehat{\mu}_2$ . (Visa det!) Om  $X \sim \mu_1$  och  $Y \sim \mu_2$  är oberoende, så är  $X + Y \sim \mu_1 * \mu_2$ .

*Bevis.* Vi kan anta att  $m = 0$  och  $\sigma = 1$ . Låt

$$S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}}$$

och

$$\mu^{n*} = \underbrace{\mu * \dots * \mu}_{n \text{ gånger}}.$$

Då är  $S_n \sim \mu_n$ , där

$$\langle \mu_n, \varphi \rangle = \int \varphi \left( \frac{x}{\sqrt{n}} \right) d\mu^{n*}(x),$$

och

$$\widehat{\mu}_n(\xi) = \left( \widehat{\mu} \left( \frac{\xi}{\sqrt{n}} \right) \right)^n.$$

Eftersom  $\text{Var}[X] < \infty$ , så är

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int e^{-ix\xi} d\mu(x)$$

en  $C^2$ -funktion med

$$\widehat{\mu}'(0) = -im = 0 \quad \text{och} \quad \widehat{\mu}''(0) = -\sigma^2 = -1.$$

Så

$$\widehat{\mu}(\xi) = 1 - \frac{1}{2}\xi^2 + o(\xi^2), \quad \xi \rightarrow 0,$$

och

$$\widehat{\mu}_n(\xi) = \left( \widehat{\mu} \left( \frac{\xi}{\sqrt{n}} \right) \right)^n = \left( 1 - \frac{1}{2n}\xi^2 + o\left(\frac{\xi^2}{n}\right) \right)^n \rightarrow e^{-\frac{\xi^2}{2}}, \quad n \rightarrow \infty,$$

för varje fixt  $\xi$ . Men eftersom  $|\widehat{\mu}(\xi)| \leq 1$  ger dominerad konvergens att

$$\widehat{\mu}_n(\xi) \rightarrow e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{i } \mathcal{S}'.$$

Med Fourierinversion får vi

$$\mu_n \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

i  $\mathcal{S}'$  och alltså i  $\mathcal{D}'$ . Men  $\mu_n$  är positiva mått och enligt Sats 7.4

$$\mu_n \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

svagt, och detta ger (1). □

## 17.2 Medelvärdesegenskapen för harmoniska funktioner

Om  $u \in C^\infty$  är harmonisk i en omgivning av  $\{|x| \leq 1\}$ , så gäller

$$u(0) = \frac{1}{\omega_n} \int_{S^{n-1}} u(y) d\sigma y.$$

**Anmärkning 17.1.** Weyls lemma visar att antagandet att  $u \in C^\infty$  är onödigt.  $\square$

*Bevis.* Definiera en distribution  $\Lambda$  genom

$$\langle \Lambda, \varphi \rangle = \int_{S^{n-1}} \varphi(y) d\sigma(y) - \omega_n \varphi(0).$$

$\Lambda \in \mathcal{E}'$ , så  $\widehat{\Lambda}$  är en hel funktion. Vidare är  $\Lambda$ , om därmed även  $\widehat{\Lambda}$ , radiell. Så  $\widehat{\Lambda}(\zeta) = G(|\zeta|)$ , där  $G(t) = \widehat{\Lambda}(t, 0, \dots, 0)$  är holomorf. Vidare är  $G$  jämn, så  $G(z) = F(z^2)$  för någon hel funktion  $F$ . Dessutom är  $F(0) = \widehat{\Lambda}(0) = \Lambda(1) = 0$ . Därför är

$$\frac{\widehat{\Lambda}(\xi)}{|\xi|^2} = \frac{F(|\xi|^2) - F(0)}{|\xi|^2}$$

restriktionen av en hel funktion. Enligt Paley-Wieners sats finns därför en distribution  $\mu \in \mathcal{E}'$  med  $\widehat{\mu}(\xi) = -F(|\xi|^2)/|\xi|^2$  och alltså

$$(\Delta\mu)\widehat{(\xi)} = -|\xi|^2\widehat{\mu}(\xi) = \widehat{\Lambda}(\xi).$$

Alltså är  $\Delta\mu = \Lambda$ . Detta ger

$$\langle \Lambda, u \rangle = \langle \Delta\mu, u \rangle = \langle \mu, \Delta u \rangle = \langle \mu, 0 \rangle = 0.$$

$\square$

## 17.3 Heisenbergs osäkerhetsrelation

Om  $f \in L^2(\mathbb{R})$  så gäller

$$\|xf(x)\|_2 \|\widehat{\xi f}(\xi)\|_2 \geq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \|f\|_2^2, \quad (17.2)$$

med likhet endast för  $f(x) = \exp(-kx^2)$ ,  $k > 0$ .

Kvantmekanisk bakgrund: Tillståndet hos en partikel är en funktion  $\psi \in L^2(\mathbb{R})$  med  $\|\psi\|_2 = 1$ . Vi tolkar

$$\int_E |\psi|^2$$

som sannolikheten att partikeln befinner sig i mängden  $E$ . En observerbar storhet  $A$  är en symmetrisk operator på ett lämpligt delrum av  $L^2$ . Medelvärde av  $A$  i tillståndet  $\psi$  är

$$E[A] = \int A\psi \cdot \bar{\psi} = \langle A\psi, \psi \rangle.$$

Att  $A$  är symmetrisk betyder att  $A = A^*$  och alltså gäller

$$\langle A\psi, \psi \rangle = \langle \psi, A^*\psi \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle = \overline{\langle A\psi, \psi \rangle},$$

så medelvärdet är reellt.

**Exempel 17.2.**

a) Läge.  $A\psi(x) = x\psi(x)$

b) Moment.  $B\psi = 2\pi i\psi'$ . □

Vi har

$$E[B] = \int B\psi \cdot \bar{\psi} = 2\pi i \int \psi' \bar{\psi} = \text{Plancherel} = \int \xi \widehat{\psi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} = \int \xi |\widehat{\psi}(\xi)|^2 d\xi.$$

Så vi kan tolka  $|\widehat{\psi}(\xi)|^2$  som tätheten för momentet.

Den allmänna formeln av Heisenbergs osäkerhetsrelation är

$$E[(A - E[A])^2]E[(B - E[B])^2] \geq \frac{1}{4}|E[AB - BA]|^2 \quad (17.3)$$

för godtyckliga  $A$  och  $B$ .

**Övning 17.1.** Visa att om  $A$  och  $B$  är läge och moment så gäller  $AB - BA = -2\pi i$ .

**Övning 17.2.** Visa att (2) medför (3), då  $A$  och  $B$  är läge och moment.

*Bevis.* Om  $f \in \mathcal{S}$  gäller

$$\begin{aligned} \|xf(x)\|_2 \|\xi \widehat{f}(\xi)\|_2 &= \|xf(x)\|_2 \|\widehat{f}'(\xi)\|_2 = \text{Parseval} \\ &= \sqrt{2\pi} \|xf(x)\|_2 \|f'(x)\|_2 \geq \text{Schwartz} \geq \sqrt{2\pi} \int |x \overline{f(x)} f'(x)| dx \\ &\geq (|x\bar{z}w| \geq x \operatorname{Re} \bar{z}w) \geq \sqrt{2\pi} \int x \frac{1}{2} (f(x)\overline{f'(x)} + \overline{f(x)} f'(x)) dx \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int x(|f(x)|^2)' = \text{Partiell integration} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int |f|^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

Beviset för att satsen gäller också för funktioner i  $L^2$ , och utredningen av när likhet gäller lämnas åt läsaren.  $\square$

## 17.4 Något om Sobolevolikheter

En fördel med distributionsteori är att vi kan hitta lösningar till problem som inte har några klassiska lösningar. Men ofta vill man att lösningarna skall vara funktioner. Det är därför naturligt att ställa frågan

*När är en distributionslösning en klassisk funktionslösning?*

Sobolevteori ger oss metod för att besvara den frågan. Här skall vi visa den enklaste satsen i Sobolevteorin,

**Sobolevs  $L^1$ -olikhet** *Låt  $f$  vara en integrerbar funktion på  $\mathbb{R}^n$ . Antag att distributionsderivatorna  $\partial^\alpha f$  också är integrerbara för alla  $|\alpha| \leq n$ . Då är  $f$  en begränsad kontinuerlig funktion och*

$$\|f\|_\infty \leq \sum_{|\alpha| \leq n} \|\partial^\alpha f\|_1. \quad (17.4)$$

*Om dessutom  $\partial^\alpha f$  är integrerbara för alla  $|\alpha| \leq n+k$  så är  $f$  en  $C^k$ -funktion.*

*Bevis.* Vi börjar med fallet  $n = 1$  och skall alltså visa att

$$\|f\|_\infty \leq C (\|f\|_1 + \|f'\|_1). \quad (17.5)$$

Om  $\varphi \in C_0^\infty$  så gäller

$$|\varphi(x)| = \left| \int_{-\infty}^x \varphi'(t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^x |\varphi'(t)| dt \leq \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi'(t)| dt.$$

Detta ger

$$\|\varphi\|_\infty \leq \|\varphi'\|_1. \quad (17.6)$$

Denna olikhet är skarpare än Sobolevs olikhet men vi har bevisat den under två starka extra villkor:  $C^\infty$  och kompakt stöd. (Funktionen 1 visar att (6) inte kan vara sann i allmänhet.)

Om  $f \in C^\infty$  inte har kompakt stöd väljer vi en följd av avhuggningsfunktioner  $\chi_n \in C^\infty$ ,  $\chi_n = 1$  då  $|x| \leq n$  och med  $\|\chi_n'\|_\infty \leq 1$ . Applicerar vi (6) på  $\varphi = \chi_n f$  får vi

$$\|\chi_n f\|_\infty \leq \|(\chi_n f)'\|_1 \leq \|\chi_n' f\|_1 + \|\chi_n f'\|_1 \leq \|f\|_1 + \|f'\|_1.$$

Eftersom  $n$  är godtyckligt följer (5) för  $C^\infty$ -funktioner.

Om  $f$  inte är  $C^\infty$  låter vi  $\phi_\delta$  vara en approximativ identitet. Då är  $f_\delta = \phi_\delta * f \in C^\infty$  och vi kan använda (5) på  $f_\delta$ . Vi får, eftersom  $\|\phi_\delta * f\|_1 \leq \|f\|_1$  och  $\|(\phi_\delta * f)'\|_1 = \|\phi_\delta * f'\|_1 \leq \|f'\|_1$ , att

$$\|\phi_\delta * f\|_\infty \leq C(\|f\|_1 + \|f'\|_1) .$$

Men  $\phi_\delta * f \rightarrow f$  n.ö. och (5) följer i det allmänna fallet.

Till sist använder vi (5) på  $f - f_\delta$  och får

$$\|f - f_\delta\|_\infty \leq \|f - \phi_\delta * f\|_1 + \|f' - \phi_\delta * f'\|_1 \rightarrow 0, \delta \rightarrow 0 .$$

Så  $f_\delta \rightarrow f$  likformigt och alltså är  $f$  en kontinuerlig funktion.

Det sista påståendet i satsen följer om vi använder vårt argument på funktionerna  $\partial^i f$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ .

Argumentet i högre dimensioner är snarlikt. Fallet  $n = 2$  visar hur det går till utan att notationen blir för krånglig. Nu gäller för  $\varphi \in C_0^\infty$  att

$$|\varphi(x, y)| = \left| \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \partial^{(1,1)} \varphi(s, t) ds dt \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\partial^{(1,1)} \varphi(s, t)| ds dt$$

och alltså

$$\|\varphi\|_\infty \leq \|\partial^{(1,1)} \varphi\|_1 .$$

När vi använder detta på  $\chi_n f$ ,  $f \in C^\infty$ , får vi eftersom  $\partial^{(1,1)}(\chi_n f) = \partial^{(1,1)} \chi_n f + \partial^{(1,0)} \chi_n \partial^{0,1} f + \partial^{(0,1)} \chi_n \partial^{1,0} f + \chi_n \partial^{(1,1)} f$ , att

$$\|f\|_\infty \leq \|f\|_1 + \|\partial^{1,0} f\|_1 + \|\partial^{0,1} f\|_1 + \|\partial^{(1,1)} f\|_1, f \in C^\infty .$$

Resten av argumentet fungerar likadant som i fallet  $n = 1$

□

**Anmärkning 17.3.** Beviset visar att det räcker att i (4) summera över  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  där varje  $\alpha_i$  bara antar värdena 0 eller 1. □

## 17.5 Minkowskis sats

Låt  $B$  vara en konvex mängd som är symmetrisk kring origo. Om  $|B| \geq 2^n$ , så innehåller  $B$  mer än en gitterpunkt.

*Bevis.* Vi antar att 0 är den enda gitterpunkten i  $B$ , och skall visa att då är  $|B| < 2^n$ . Låt  $f = \chi_B * \chi_B$ . Eftersom  $B$  är symmetrisk är  $\widehat{\chi}_B$  reell. Alltså är  $\widehat{f} = (\widehat{\chi}_B)^2 = |\widehat{\chi}_B|^2$ .



Vi observerar att om  $f(2i) \neq 0$ , dvs.

$$f(2i) = \int \chi_B(2i - x)\chi_B(x)dx \neq 0,$$

så finns ett  $x \in B$  med  $2i - x \in B$ . Men då är  $i = \frac{1}{2}(2i - x) + \frac{1}{2}x \in B$ , eftersom  $B$  är konvex. Alltså om  $f(2i) \neq 0$  så är  $i = 0$ . Vidare är

$$f(0) = \int \chi_B(-x)\chi_B(x)dx = \int |\chi_B|^2 dx = |B|.$$

Poissons summationsformel på gittern  $(2\mathbb{Z})^n$  och  $(\pi\mathbb{Z})^n$  blir

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}^n} f(2j) = 2^{-n} \sum_{j \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\pi j).$$

Detta ger

$$\begin{aligned} |B| = f(0) &= \sum_j f(2j) = 2^{-n} \sum_j \hat{f}(\pi j) \\ &= 2^{-n} \sum_j |\hat{\chi}_B(\pi j)|^2 = 2^{-n} \left( |B|^2 + \sum_{j \neq 0} |\hat{\chi}_B(\pi j)|^2 \right) \end{aligned}$$

Om vi kan visa att

$$\sum_{j \neq 0} |\hat{\chi}_B(\pi j)|^2 > 0,$$

så får vi  $|B| > 2^{-n}|B|^2$ , eller  $|B| < 2^n$ , och vi är klara.

Men om  $\hat{\chi}_B(\pi j) = 0$  då  $j \neq 0$ , så är

$$\chi(x) = \sum_j \chi_B(x + 2j)$$

konstant. Detta följer från Poissons summationsformel eftersom

$$\chi(x) = \sum_j \tau_{-x}\chi_B(2j) = 2^{-n} \sum_j e^{i\pi x j} \hat{\chi}_B(\pi j) = 2^{-n} \hat{\chi}_B(0).$$

Men detta är en motsägelse, ty

$$\chi(0) = 1 \neq 0 = \chi(1, 0, \dots, 0).$$

□

**Övning 17.3.** Beviset är "fel". Varför? Rätta till det!

# Sakregister

- $C_0^\infty$ , 6
- $\mathcal{D}(\Omega)$ , 11
- $\mathcal{D}'(\Omega)$ , 11
- $\mathcal{E}'(\Omega)$ , 32
- $L^2$ , 56
- $\mathcal{S}$ , 50
- $\mathcal{S}'$ , 51
  
- approximativa identiteter, 7
  
- Centrala gränsvärdessatsen, 75
  
- Diracmåttet, 18
- distribution, 11
- distributionsderivatan, 17
- divisionsproblemet, 25
  
- elliptisk, 69
  
- faltning, 8, 37
- Fourierkoefficienter, 48, 73
- Fourierserie, 49, 71
- Fouriertransformen, 48, 49
- fullständigt, 33
- fundamentallösning, 28, 44, 67
  
- harmoniska funktioner, 39, 77
- Heavisidefunktionen, 17
- Heisenbergs osäkerhetsrelation, 77
- Hilberttransformen, 60
- homogen, 23, 61
- hypoelliptisk, 47, 69
  
- inversionssatsen, 51
  
- kompakt stöd, 32
  
- konvergens, 33, 51
  
- Laplaceoperatorn, 29, 62
  
- mått, 11
- medelvärdesegenskapen, 77
- Minkowskis sats, 80
  
- Paley-Wieners sats, 64, 65
- Parsevals formel, 53, 56
- partition av enheten, 13
- periodisk, 71
- Plancherels sats, 53, 73
- Poissons summationsformel, 72
- positiv distribution, 12
- principalvärde, 24
  
- regularisering, 8, 39
  
- Schwartzklassen, 50
- singulära stödet, 45
- snabbt avtagande funktioner, 50
- Sobolevolikheter, 79
- stödet till en distribution, 14
  
- tempererad distribution, 51
- translation, 41
  
- udda, 60
  
- värmeledningsoperatorn, 29
  
- Weyls lemma, 39
  
- ändliga delen, 21