

# Riemannintegralen, definition och några resultat

Med hjälp av supremumbegreppet kan vi göra en mer naturlig definition av integrerbarhet och integralen av en integrerbar funktion.

Med beteckningarna i Persson-Böiers, sid. 286ff. sätter vi

$$\bar{I}(f) = \inf\{I(\Psi); \Psi \text{ en trappfunktion med } \Psi \geq f\}$$

och

$$\underline{I}(f) = \sup\{I(\Phi); \Phi \text{ en trappfunktion med } \Phi \leq f\}.$$

$\bar{I}(f)$  och  $\underline{I}(f)$  kallas för över- respektive underintegralen till  $f$  och vi gör följande definition.

**Definition 1.** En begränsad funktion på ett begränsat intervall  $[a, b]$  är (**Riemann**)**integrerbar** om  $\bar{I}(f) = \underline{I}(f)$ . Om  $f$  är integrerbar betecknas **integralen** av  $f$  över  $[a, b]$

$$\int_a^b f(x)dx$$

och är lika med detta gemensamma värde,

$$\int_a^b f(x)dx = \bar{I}(f) = \underline{I}(f).$$

**Sats 2.** Funktionen  $f$  är integrerbar om och endast om det för varje  $\epsilon > 0$  finns trappfunktioner  $\Phi$  och  $\Psi$  med

$$\Phi(x) \leq f(x) \leq \Psi(x) \text{ och } I(\Psi) - I(\Phi) < \epsilon.$$

*Bevis.* Om  $f$  inte är integrerbar så är  $\epsilon = \bar{I}(f) - \underline{I}(f) > 0$ . Så om  $\Phi$  och  $\Psi$  är trappfunktioner med  $\Phi(x) \leq f(x) \leq \Psi(x)$  gäller  $I(\Psi) \geq \bar{I}(f)$  och  $I(\Phi) \leq \underline{I}(f)$ . Detta ger

$$I(\Psi) - I(\Phi) \geq \bar{I}(f) - \underline{I}(f) = \epsilon.$$

Omvänt antar vi att  $f$  är integrerbar och att  $\epsilon > 0$ . Eftersom  $\bar{I}(f) = \inf\{I(\Psi); \Psi \text{ en trappfunktion med } \Psi \geq f\}$  finns en trappfunktion  $\Psi \geq f$  med  $I(\Psi) < \bar{I}(f) + \frac{\epsilon}{2}$ . På liknande sätt finns en trappfunktion  $\Phi(x) \leq f$  med  $I(\Phi) > \underline{I}(f) - \frac{\epsilon}{2}$ . Så

$$I(\Psi) - I(\Phi) < \bar{I}(f) + \frac{\epsilon}{2} - \left(\underline{I}(f) - \frac{\epsilon}{2}\right) = \epsilon.$$

□

**Sats 3.** Om  $f$  är monoton och begränsad på  $[a, b]$  så är  $f$  integrerbar.

*Bevis.* Vi bevisar satsen då  $f$  är växande. Beviset då  $f$  är avtagande är snarlikt. Ett alternativt sätt är att observera att om  $f$  är avtagande så är  $-f$  växande, och alltså integrerbar, och sen använda Övning 1.

Låt  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  där  $x_i = a + i \frac{b-a}{n}$ . Låt  $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ ,  $m_i = f(x_{i-1})$ ,  $M_i = f(x_i)$  och  $|I_i| = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$  vara längden av  $I_i$ . Observera att eftersom  $f$  är växande så gäller  $m_i \leq f(x) \leq M_i$  då  $x \in I_i$ .

Definiera  $\Psi$  och  $\Phi$  genom att  $\Psi(x) = M_i$  och  $\Phi(x) = m_i$  då  $x \in I_i$ . Då är  $\Phi$  och  $\Psi$  trappfunktioner och  $\Phi(x) \leq f(x) \leq \Psi(x)$ . Dessutom gäller

$$\begin{aligned} I(\Psi) - I(\Phi) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) |I_i| = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \\ &= \frac{b-a}{n} \left( f(x_1) - f(x_0) + f(x_2) - f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}) + f(x_n) - f(x_{n-1}) \right) \\ &= \frac{b-a}{n} (f(x_n) - f(x_0)) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) < \epsilon \end{aligned}$$

om  $n$  är tillräckligt stort. □

Det är lätt att se att om intervallet  $[a, b]$  kan delas upp i ändligt många intervall där  $f$  är monoton så är  $f$  integrerbar. Detaljerna överlämnas till den intresserade läsaren.

**Exempel 4.** Funktionen  $f$  definierad av

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{om } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{om } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

är inte integrerbar på  $[0, 1]$ .

Uppenbarligen gäller (Eller hur?)  $\bar{I}(f) = I(\Phi)$  där  $\Phi(x) = 1$  för alla  $x$ , och  $\underline{I}(f) = I(\Psi)$  där  $\Psi(x) = 0$  för alla  $x$ . Så  $\bar{I}(f) = 1 \neq 0 = \underline{I}(f)$ .

I Persson-Böiers bevisas att om  $f$  är kontinuerlig, eller något allmännare att  $f$  är kontinuerlig utom i ändligt många punkter, så är  $f$  integrerbar.

I själva verket gäller följande karakterisering av integrerbara funktioner.

**Sats 5.** *En begränsad funktion på  $[a, b]$  är integrerbar om och endast om  $\{x \in [a, b]; f \text{ inte är kontinuerlig i } x\}$  är en nollmängd.*

**Definition 6.** *En mängd  $N \subset \mathbb{R}$  är en nollmängd om det till varje  $\epsilon > 0$  finns uppräknligt (eller ändligt) många intervall  $I_i$  så att  $U \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$  och  $\sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |I_i| < \epsilon$ .*

Beviset av Sats 5 ligger (långt) utanför vår kurs men för att få en känsla för begreppet nollmängd ger vi följande

**Exempel 7.** *Om  $U$  är en uppräknlig mängd så är  $U$  en nollmängd.*

Låt  $x_1, x_2, \dots$  vara en uppräkning av  $U$  och  $\epsilon > 0$ . Låt  $I_i$  var intervallet med mittpunkt  $x_i$  och längd  $|I_i| = \frac{\epsilon}{2^n}$ . Då gäller  $U \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$  och  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \epsilon$  så  $U$  är en nollmängd.

**Övning 1.** Visa att om  $f$  är integrerbar så är  $-f$  också integrerbar.

**Övning 2.** Visa att  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$ .

**Övning 3.** Visa att en monoton funktion kan ha högst uppräknligt många diskontinuitetspunkter.

**Övning 4.** Visa att det finns en begränsad växande funktion på  $[0, 1]$  som har ett uppräknligt antal diskontinuiteter.