


Lösningar Tenta MMGF20

2014-03-14, Elin Götmark

① f kan definieras i origo om gränsvärdet
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ existerar. Vi väljer två olika
vägar in till origo: $\underline{x=y}$: $\frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$ när $x \rightarrow 0$.

$\underline{x=0}$: $\frac{0}{0+y^2} = 0 \rightarrow 0$ när $y \rightarrow 0$.



Resultatet blir olika, alltså
finns inte gränsvärdet, och
funktionen kan inte utvidgas till att
bli kontinuerlig i origo.

② Vi letar först stationära punkter i det inre
av området: $\begin{cases} f'_x = y - 3x^2y^2 = 0 \\ f'_y = x - 2x^3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(1 - 3x^2y) = 0 \\ x(1 - 2x^2y) = 0 \end{cases}$

$(x,y) = (0,0)$ är uppenbart en lösning. Antag att
 $y \neq 0$. Då följer $y = \frac{1}{3x^2}$ från första ekv.

Sätt in i ekv. 2: $x(1 - \frac{2x^2}{3x^2}) = x(1 - \frac{2}{3}) = 0$

$\Rightarrow x = 0$. Men om vi sätter in detta i ekv. 1
så får vi $y = 0$, dvs ingen ny lösning.

$f(0,0) = 0$ kandidat till extremvärde.

Nu tittar vi på de fyra bitarna av randens:

$$\underline{x = -1, -1 < y < 1}: f(-1, y) = -y + y^2 = g_1(y)$$

$$g_1'(y) = -1 + 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\text{kandidat: } f(-1, \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{-\frac{1}{4}}$$

$$\underline{x = 1, -1 < y < 1}: f(1, y) = y - y^2 = g_2(y)$$

$$g_2'(y) = 1 - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\text{kandidat: } f(1, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

$$\underline{y = -1, -1 \leq x \leq 1}: f(x, -1) = -x - x^3 = g_3(x)$$

$$g_3'(x) = -1 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = -\frac{1}{3} \quad \text{lös. saknas}$$

$$\underline{y = 1, -1 \leq x \leq 1}: f(x, 1) = x - x^3 = g_4(x)$$

$$g_4'(x) = 1 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{kandidat: } f(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}} = \boxed{\frac{2}{3\sqrt{3}}}$$

$$f(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 1) = -\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} = \boxed{-\frac{2}{3\sqrt{3}}}$$

Vi måste också kolla hörnpunkterna:

$$f(1, 1) = 1 - 1 = \boxed{0}$$

$$f(1, -1) = -1 - 1 = \boxed{-2}$$

$$f(-1, 1) = -1 + 1 = \boxed{0}$$

$$f(-1, -1) = 1 + 1 = \boxed{2}$$

Max: 2

Min: -2

3. Sätt $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
 $G(x, y, z) = y^2 + z^2$

Tangentlinjen är vinkelrät mot både ∇F och ∇G i $(-\sqrt{3}, 0, 1)$.

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z) \quad \nabla F(-\sqrt{3}, 0, 1) = (-2\sqrt{3}, 0, 2)$$

$$\nabla G = (0, 2y, 2z) \quad \nabla G(-\sqrt{3}, 0, 1) = (0, 0, 2)$$

$$\nabla F \times \nabla G = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

En $(0, 1, 0)$ är en riktning vektor för tangentlinjen. Linjen kan parametriseras som

$$(x(t), y(t), z(t)) = (-\sqrt{3}, t, 1).$$

4. Gör variabelbytet $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - 2y \end{cases}$

$$\frac{d(u, v)}{d(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3 \Rightarrow$$

$$\frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \frac{1}{3} \quad \text{Lös ut } x \text{ och } y: \begin{cases} x = \frac{1}{3}(2u + v) \\ y = \frac{1}{3}(u - v) \end{cases}$$

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{3}(2u + v) \cdot \frac{1}{3}(u - v) \cdot \frac{1}{3} \, dv \, du =$$

$$= \frac{1}{27} \int_0^1 \int_0^1 2u^2 - uv - v^2 \, dv \, du =$$

$$= \frac{1}{27} \int_0^1 \left[2u^2v - \frac{uv^2}{2} - \frac{v^3}{3} \right]_0^1 du =$$

$$= \frac{1}{27} \int_0^1 \left(2u^2 - \frac{u}{2} - \frac{1}{3} \right) du = \frac{1}{27} \left[\frac{2u^3}{3} - \frac{u^2}{4} - \frac{u}{3} \right]_0^1 =$$

$$= \frac{1}{27} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{27} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{27} \left(\frac{4-3}{12} \right) =$$

$$= \frac{1}{27 \cdot 12} = \underline{\underline{\frac{1}{324}}}$$

5. Arean är en graf över xz -planet.

Vi parametriserar den så här:

$$\pi(s, t) = (s, s^2 + t^2, t), \quad s^2 + t^2 \leq 1.$$

$$\pi'_s = (1, 2s, 0)$$

$$\pi'_t = (0, 2t, 1)$$

$$\pi'_s \times \pi'_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 2s \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2s \\ -1 \\ 2t \end{pmatrix}$$

$$|\pi'_s \times \pi'_t| = \sqrt{1 + 4s^2 + 4t^2}$$

$$\text{arean} = \iint_{s^2+t^2 \leq 1} \sqrt{1+4s^2+4t^2} \, ds dt = \left\{ \text{polära koord.} \right\} =$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} \, r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{(1+4r^2)^{3/2}}{3/2 \cdot 8} \right]_0^1 =$$

$$= \frac{\pi}{3 \cdot 2} \cdot 5^{3/2} = \underline{\underline{\frac{5\sqrt{5}\pi}{6}}}$$

6. Ytans kant är $1 - (x^2 + y^2)^2 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$. Enligt Stokes sats kan vi istället integrera över ytan $\gamma_2: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ som har samma kant. Dess normal är $N = (0, 0, 1)$ (ska vara uppåt riktad liksom γ 's normal).

$$\text{rot } u = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -yz \\ x^2 \\ z + y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ -y \\ 2x + z \end{pmatrix}$$

$$\iint_{\gamma_2} (\text{rot } u) \cdot N \, dS = \iint_{\gamma_2} 2x + z \, dS = *$$

γ_2 kan parametriseras med $(x, y, 0)$

$$* = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} 2x \, dx \, dy = \begin{cases} \text{polära} \\ \text{koord.} \end{cases} = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r \cos \theta \, r \, dr \, d\theta =$$

$$= 0 \quad \text{eftersom} \quad \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = 0.$$

7. a, b se boken s. 344 och 352

c. Ja. En potential är $U(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

8. Se boken s. 77 - 79.