

## 1 Förel. VII

### 1.1 Punktskattning

För att skatta väntevärdet för en fördelning är det lämpligt att använda Medelvärdet

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \xi_j. \text{ Vi tar nu väntevärdet av denna stok. var. :}$$

$$E(\bar{\xi}) = \dots = \mu$$

#### 1.1.1 V.v.r. och effektivitet

V.v.r. är en förkortning av **väntevärdesriktig**. Punktskattningen  $\bar{\xi}$  är v.v.r. ty  $E(\bar{\xi}) = \mu$ .

**Ex 1** Undersök om nedanstående stok. var. är v.v.r. för  $\xi_k$ ,  $k = 1, 2$  som är likafördelade med gemensamt v.v.  $\mu$ .

(a)  $0.5\xi_1 + 0.3\xi_2$

(b)  $0.6\xi_1 + 0.4\xi_2$

**Lösning:**

(a)  $E(0.5\xi_1 + 0.3\xi_2) = \dots = 0.8\mu$ . Alltså ej v.v.r.

(b)  $E(0.6\xi_1 + 0.4\xi_2) = \dots = \mu$ . Alltså v.v.r.

▪

**Ex 2** För två oberoende stok. var.  $\xi_1$  och  $\xi_2$  med samma  $\mu$  men med olika standardavvikelse 2.0 respektive 1.0. De observerade värdena är kända. Frågan är hur dessa skall användas för att få en så effektiv v.v.r. skattning som möjligt.

▪

### 1.2 Centrala gränsvärdessatsen

Vi har sett summan av två ober. stok. var. Som är diskreta.

**Ex 3** I ett tidigare exempel har vi  $\xi$  som antal datorer som säljs under en vecka i affären Datornörd. Vi antar vidare att frekvensfunktionen är

$x$	0	1	2
$P(\xi = x)$	0.3	0.4	0.3

Vi låter vidare  $\xi_1$ ,  $\xi_2$  och  $\xi_3$  vara antal sålda datorer under vecka 1, 2 respektive 3. Vi antar att dessa är oberoende och har samma fördelning d.v.s. som i tabellen ovan.

**Lösning:**

Det betyder att vi söker fördelningen hos summan  $\eta = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ . Det är självklart att  $\eta$  kan anta värdena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hur fördelar sig sannolikheterna för  $\eta$ ?

$$P(\eta = 0) = 0.3^3.$$

Fördelningen., d.v.s. frekvensfunktion (sannolikhetsfunktion) är från 0 till 6.

$$0.027, 0.108, 0.225, 0.28, 0.225, 0.108, 0.027$$

■

**Sats 1** (Centrala gränsvärdessatsen)

Låt  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  vara oberoende likafördelade stokastiska variabler med gemensamt väntevärde  $\mu$  och varians  $\sigma^2$ . oberoende. Sätt

$$\zeta = \sum_{k=1}^n \xi_k.$$

Då gäller för stora  $n$

$$\zeta \text{ approximativt har fördelningen } N(\mu, \sigma\sqrt{n}) \quad (1)$$

**Kommentarer**

- Det följer att  $\bar{\xi}$  har approximativt  $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ .
- Tumregel för approximationen är  $n \geq 30$ .

**Ex 4**

- Vad är sannolikheten att man i datoraffären Datornörd säljer fler än 54 datorer under ett år?
- Vad är sannolikheten att det säljs i genomsnitt högst 0.9 datorer i veckan?

Förutsett att försäljningen vecka för vecka är ober.

**Lösning:**

- Väntevärdet  $\mu = 1$  för försäljningen under en vecka. Motsvarande varians är

$$V = (0^2, 1^2, 2^2) \cdot (0.3, 0.4, 0.3) - 1^2 = 0.6, \sigma = \sqrt{0.6}.$$

Sannolikheten att man säljer fler än 54 datorer under ett år är

$$1 - \Phi\left(\frac{54 - 1 \cdot 52}{0.6 \cdot \sqrt{52}}\right) = 0.36$$

(b) Sannolikhetsfördelningen är  $N(1, \sqrt{0.6}/\sqrt{52}) \ni \zeta$  och vi söker sannolikheten

$$P := \Phi\left(\frac{0.9 - 1}{\sqrt{0.6}/\sqrt{52}}\right) = \Phi(-0.930949\dots) = 0.17594 \approx 0.18.$$

Svar (b) Sannolikheten att man säljer högst 0.9 datorer per vecka är 0.18.

■

**Ex 5** För en produkt har man fått följande värden:

$$47.72, 49.67, 46.7343, 49.15, 50.58, 49.29.$$

Det kan ses som en observerade mätvärden av en normalfördelad variabel  $\xi \in N(\mu, 1.1)$ . Standardavvikelsen är alltså känd. Producenten påstår att medianvärdet är 50.00. Testa detta med ett symmetriskt konfidensintervall i (a) och (b) på signifikansnivå

(a) 95%

(b) 99%

1. Slutsatser?

**Lösning:**

(a) 95%: Vi får observerad punktskattning  $\bar{\xi} = 48.8569$ . Det symmetriska intervallet är

$$\left[\bar{x} - \frac{\lambda_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{6}}, \bar{x} + \frac{\lambda_{\alpha/2}\sigma}{\sqrt{6}}\right]$$

Med

$$\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0.025} = \{\text{tabell}\} = 1.96$$

blir konfidensintervallet

$$\begin{aligned} \bar{x} - \frac{1.96 \cdot 1.1}{\sqrt{6}}, \bar{x} + \frac{1.96 \cdot 1.1}{\sqrt{6}} &= \\ [48.8567 - \frac{1.96 \cdot 1.1}{\sqrt{6}}, 48.8567 + \frac{1.96 \cdot 1.1}{\sqrt{6}}] &= [47.9765, 49.7368] \end{aligned}$$

(b) 99%: Här är ”kvantilen”

$$\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0.005} = 2.57583.$$

Motsvarande intervall är

$$[47.6999, 50.0134]$$

(c) I (a) gäller att  $50.00 \notin [47.9765, 49.7368]$  Det betyder att med 95% sannolikhet så är  $\mu \neq 50.00$ .

I (b) gäller att  $50.00 \in [47.6999, 50.0134]$ . Vi kan alltså med 99% inte påstå att  $\mu \neq 50.00$ .

**Kommentarer**

- Det som beskrivs i detta exempel är ett *hypotestest*. Att påstå att  $\mu \neq 50.00$
- Producentens påstående att  $\mu = 50.00$  är *nollhypotesen*  $H_0$ . *Etthypotesen*  $H_1$  är  $\mu \neq 50.00$ .
- I exemplet *förkastas*  $H_0$  på signifikansnivå 95% men *förkastas* inte på signifikansnivå 99%.
- *Innan* man ger konfidensintervallet har man en *intervallskattning*

$$\left[ \bar{\xi} - \frac{\lambda_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + \frac{\lambda_{\alpha/2} \cdot \sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (2)$$

**Ex 6** Ett byggprojekt av bostäder åt studenter består av två moment, lägga grund och sätta upp väggar och tak. Dessa moment är  $N(2.0, 0.4)$  och  $(N)(1.5, 0.3)$  i enheten 30 dagars perioder (d.v.s. 1.5 betyder  $1.5 \cdot 30 = 45$  dagar etc). Var är sannolikheten att byggtiden totalt tar mer än 120 dagar? Antag att de två momentens tidsåtgång är oberoende.

**Lösning:**

Låt de två momentens tidsåtgång vara  $\xi$  resp.  $\zeta$  och sätt  $x = 4.0$  (eftersom  $30 \cdot 4.0 = 120$ ).

Totala byggtiden är då

$$\xi + \zeta \in N(2.0 + 1.5, \sqrt{0.4^2 + 0.3^2}).$$

Den sökta sannolikheten är

$$1 - \Phi\left(\frac{4.0 - 3.5}{0.5}\right) = 0.158655 \approx 16\%.$$

Sannolikheten att byggprojektet tar mer än 120 dagar är 16%. ■

**1.3 Intervallskattning då  $\sigma$  okänd**

Vi gör nu det i fallet få  $\sigma$  måste skattas, d.v.s. är okänd. Vi punktskattar då

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2}$$

Vi antar att det finns ett  $c$ , sådant att vid en symmetrisk intervallskattning med konfidensgrad  $1 - \alpha$ , t

$$P\left(\bar{\xi} - k \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}} < \mu\right) = 1 - \alpha/2.$$

Detta kan skrivas om till en jämn funktion

$$P\left(\frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma^*/\sqrt{n}} < k\right) = 1 - \alpha/2.$$

Den *stokastiska variabeln*, obs! Både sälljare och nämnare är stok. var.

$$\frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma^*/n}$$

är, kan man visa, *t-fördelad med  $n-1$  frihetsgrader*. Denna fördelningsfunktion är tabellerad.

**Ex 7** Vid mätning av strålning från mobiltelefon har man följande stickprov (Enhet mr/h), som antas vara observerade värden från en normalfördening. 0.50 mr/h är rekommenderat maxvärde. Ett mobiltelefonföretag påstår att medelstrålningen är 0.45 mr/h.

$$\{0.4, 0.48, 0.6, 0.15, 0.5, 0.8, 0.5, 0.36, 0.16, 0.89\}.$$

Ge ett nedåt begränsat 99% konfidensintervall för strålningen.

**Lösning:**

(Observerat) medelvärde och standardavvikelse är  $\bar{x} = 0.484$  respektive  $\sigma_{obs}^* = s = 0.239824$ . Intervallet är

$$\left[\bar{x} - t_{n-1,0.99} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, +\infty\right].$$

$n = 10$ , så att tabellvärdet  $t_{9,0.99} = 2.9$  vilket ger intervallet  $[0.280, \infty)$ . Vi kan inte förkasta företagets hypotes att medelstrålningen är 0.45 mr/h, på 95% :s signifikansnivå. Om 0.45 hade varit t.v. om intervallets om intervallets nedre gräns hade vi förkastat företagets hypotes (nollhypotesen).

■

### Kommentarer

- Företagets hypotes, nollhypotesen  $H_0$  att  $\mu = 0.45$  ställs mot mothypotesen  $H_1$ , som här är att  $\mu > 0.45$ .  $H_0$  kan inte förkastas på 95%:s signifikansnivå.
- *t*-fördelningens frekvensfunktion beror på  $n$  och ser ut så här

$$f_n(x) = c_n \left(1 + \frac{x^2}{n-1}\right)^{-n/2}.$$

Med lite kunskaper om gränsvärde, kan man visa att

$$f_n(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} = \phi(x) \text{ då } n \rightarrow \infty$$

Standardnormalfördelningens frekvensfunktion.

- Om  $n$  stort ( $n \geq 30$ ) d.v.s. ett stickprov på en godtycklig fördelning blir det approximerande symmetriska konfidensintervallet

$$\left[ \bar{x} - \frac{\lambda_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{\lambda_{\alpha/2} \cdot s}{\sqrt{n}} \right].$$

Man använder  $\lambda_{\alpha/2}$  i stället för  $t_{n-1, \alpha/2}$  ty  $f_n(x) \approx \phi(x)$  för  $n \geq 30$ .