

# 1 Föreläsning III; Mer om sannolikhet

## 1.1 Betingad sannolikhet

Sannolikheten för en mängd/händelse påverkas av vad man vet eller inte vet om händelsen.

**Ex 1** Om du har en hobby, ett specialintresse, såsom musik eller sport, kan man få frågan, om du är bra i det som du har hobby. Vad svarar man på en sådan fråga? Kanske så här:

"Det beror vad man jämför med."

---

**Ex 2** För ett varumärke av billarm gäller följande.

Om larmet löser ut, är det 99% säkert att det är inbrott i bilen. Sannolikheten för att larmet löses ut under ett år är 0.001. Sannolikheten för ett inbrott under ett år är 0.2%.

Vilken sannolikhet är intressant för bilägaren? Går den sannolikheten att beräkna?

### Lösning:

Det är rimligt från bilägarens synvinkel, att larmet löses ut *om* det är inbrott. d.v.s. att  $P(L|I)$  är stor. Sannolikheterna vi har är

$$99\% = 0.99 = P(I|L), \quad P(I) = 0.002, \quad P(L) = 0.001.$$

Vi får från (??)

$$P(I \cap L) = P(L) \cdot P(I|L) = 0.00099 \text{ som ger att}$$

$$P(L|I) = \frac{P(I \cap L)}{P(I)} = \frac{0.00099}{0.002} = 0.495.$$

Alltså löses larmet ut i mindre än 50% av fallen med inbrott.

---

### Kommentarer

- Det rör sig alltså om ett överkänsligt larm i detta exempel.
- Hur kan sannolikheterna  $P(L|I)$  och  $P(I|L)$  vara så olika? I den första sannolikheten jämför vi med  $I$  och i den andra med  $L$ .

**Ex 3** I en tidningsartikel, stod det att 95% av alla tunga missbrukare ( $T$ ) har någon gång använt hasch ( $H$ ). I artikeln hävdades det att detta var en orsak till att bekämpa användningen av  $H$ .

Är det en rimlig slutsats?

### Lösning:

Vi tolkar den relativa frekvensen 0.95 som en betingad sannolikhet: Om man är  $T$ , så har man använt  $H$ , d.v.s.

$$P(H|T) = 0.95 = \frac{P(H \cap T)}{P(T)}.$$

Att  $H$  är farligt (inkörssport till  $T$ ) betyder att  $P(T|H)$  skall vara stor. Den sannolikheten kan skrivas

$$P(T|H) = \frac{P(H \cap T)}{P(H)}.$$

Täljarna har desamma men inte nämnarna. Vi vet inte vilka värden dessa har men det kan ju vara så att

$$P(T) = 0.005 \text{ och } P(H) = 0.1.$$

Då får vi

$$P(H \cap T) = P(H|T) \cdot P(T) = 0.95 \cdot 0.005 = 0.00475 \Rightarrow$$

$$P(T|H) = \frac{P(H \cap T)}{P(H)} = \frac{0.00475}{0.1} = 0.0475.$$

---

### Kommentarer

- Som i exemplet med billarmet rör det sig om två betingade sannolikheter som jämförs med  $P(T) = 0.005$  respektive  $P(H) = 0.1$ . Tydligt är  $H$  en mycket större mängd än  $T$ , d.v.s. betydligt fler använder  $H$  än är  $T$ .
- Illustration av händelser och sannolikheter.

Sannolikheten  $P(H|T)$  är stor och  $P(T|H)$  är liten.

## 1.2 Oberoende händelser

Vad innebär detta för två händelser  $A$  och  $B$  att  $P(A|B) = P(A)$ ? Det betyder att sannolikheten för  $A$  under förutsättning att  $B$  inträffat (VL) är densamma som sannolikheten för  $A$ , alltså oberoende av att  $B$  inträffat (eller ej).

**Ex 4** Antag att  $P(A) = 0.7 = P(A|B)$ , d.v.s. att sannolikheten påverkas inte av händelsen  $B$ . Det betyder att

$$0.7 = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \text{ som ger att } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

---

Resultatet ovan tas som definition av oberoende händelser.

**Definition 1.1** Två händelser  $A$  och  $B$  är *oberoende* om

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \tag{1}$$

**Ex 5** Givet följande sannolikheter

$$P(A) = \frac{1}{5}, \quad P(B^c) = \frac{3}{10} \text{ och } P(A \cap B) = \frac{7}{50}.$$

- Visa att  $A$  och  $B$  är oberoende.
- Gäller det att  $A^c$  och  $B^c$  är oberoende?

(c) Kan resultatet i (b) generaliseras?

**Lösning:**

$$(a) P(B) = 1 - P(B^c) = \frac{7}{10}.$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{5} \cdot \frac{7}{10} = \frac{7}{50} \text{ som ju är } P(A \cap B)$$

Och alltså är de oberoende.

(b)

$$\begin{aligned} P(A^c) \cdot P(B^c) &= (1 - P(A)) \cdot (1 - P(B)) = \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A) \cdot P(B) = \quad (2) \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{50} = \frac{6}{25}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c) &= P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)] \quad (3) \end{aligned}$$

Vi ser att det nästsista uttrycket i (2) är identiskt med (3).

(c) Resultatet i (b) kan alltså generaliseras, d.v.s.

$$A \text{ och } B \text{ oberoende} \iff A^c \text{ och } B^c \text{ oberoende.} \quad (4)$$

---

**Kommentarer**

- Även  $A$  och  $B^c$  samt  $A^c$  och  $B$  är oberoende, omm  $A$  och  $B$  oberoende.
- För två möten den ena ishockey Frölunda-Skellefteå och den andra fotboll Öis-Gais. Låt  $A$  vara mängden/händelsen att Frölunda vinner och  $B$  att Gais vinner. Det är rimligt att  $A$  och  $B$  är oberoende och p.s.s. att  $A^c$  och  $B$  är oberoende.
- Att  $A$  och  $B$  är oberoende är inte detsamma som att  $A$  och  $B$  är disjunkta. Om de är disjunkta följer det att  $A \subset B^c$  (Rita!).
- Att två händelser är disjunkta innebär att de inte kan inträffa samtidigt. Då är de verkligen beroende!
- Antag att två  $A$  och  $B$  är disjunkta. Eftersom de är disjunkta är  $A \cap B = \emptyset$  och  $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ . Om de är oberoende, är

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0 \text{ så att } P(A) = 0 \text{ eller } P(B) = 0.$$

För dessa händelser medför oberoende alltså att  $P(A) = 0$  eller  $P(B) = 0$ .

**Ex 6** (Exemplet med billarmet och inbrott)

(a) Är  $L$  och  $I$  (o-)beroende?

(b) Beräkna  $P(I^c|L)$ ...

1. ] Beräkna  $P(I^c|L)$ .

**Lösning:**

- (a) Är  $L$  och  $I$  (o-)beroende? Vi skall alltså beräkna  $P(I \cap L)$  och  $P(I) \cdot P(L)$  och se om dessa är lika. Alternativt kan vi kolla om  $P(I|L) = P(I)$ . Dessa har vi sedan tidigare:

$$P(I|L) = 0.99 \neq P(I) = 0.002.$$

Alltså beroende.

(b) Beräkna  $P(I^c|L)$ .

(c) Beräkna  $P(I^c|L)$ .

---