

## Vecka 3

### Markovkedjor och poissonprocesser

Större delen av den här veckan kommer att handla om markovkedjor, som är en sekvens av stokastiska variabler med en viss typ av beroende:

$X_0, X_1, X_2, \dots$  är en markovkedja om följande villkor gäller:

$$P(X_{n+1} = x | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_{n+1} = x | X_n = x_n).$$

Detta villkor kallas markovegenskapen. Ofta tänker man sig att man hoppar mellan olika tillstånd och att vid tid  $n$  befinner man sig i tillstånd  $X_n$  – då säger denna egenskap att "givet nuet beror vad som ska hända i framtiden bara på nuet och ej på det förflutna" ( $n+1 =$  framtid,  $n =$  idag,  $1, \dots, n-1 =$  förflutet). En övergångsmatrix innehåller sannolikheterna  $P_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ , där  $i$  och  $j$  är möjliga tillstånd (utfall).

På grupparbetet kommer vi att undersöka sk absorberande markovkedjor, dvs kedjor där det finns ett eller flera tillstånd som är absorberande på så sätt att förr eller senare så hamnar man i ett sådant tillstånd och då kommer man aldrig därifrån.

Veckans andra föreläsning kommer huvudsakligen att handla om poissonprocesser. Sådana processer kan användas för att modellera hur en viss händelse inträffar slumpmässigt i tiden, rummet etc, med en viss intensitet. Vi går här tillbaka till kapitel 3 och 4 i boken och tar upp två fördelningar: Poissonfördelningen eftersom antalet händelser i ett intervall har en sådan fördelning och exponentialfördelningen som är den kontinuerliga fördelning som avstånden mellan händelser har. Poissonprocesser är användbara inom tex telekommunikation och köteori.

#### Schema

- Måndag 15 sep: 13.15, sal HB1. Föreläsning, samt inlämning grupparbeten.
- Tisdag 16 sep: 10.00, sal ES51, ES52, ES53. Demonstrationsräkning, samt egen räkning.
- Onsdag 17 sep: 10.00, sal HA3. Föreläsning.
- Torsdag 18 sep: 10.00, sal MML4, MML5, MML6. Grupparbete 2 - Penney's Game.

#### Litteratur

- Markovkedjor:
  - Kap 11.1 i Grinstead & Snell (GS): Introduction To Probability (delas ut).
  - Utdelat material om *Absorberande markovkedjor*.
- Poissonprocesser: Kap 3.8 och 4.3 i Milton & Arnold (MA).

#### Övningar

På demonstrationsräkningen kommer övningar att väljas bland följande:

Kap 5, MA: 5, 15, 25, 26, 29, 37

Kap 11, GS: Avsnitt 11.1: 2, 7, 11; Avsn 11.2: 1, 19a


Följande övningar rekommenderas ni att räkna på egen hand:

Kap 11, GS: Avsnitt 11.1: 3,5; Avsnitt 11.2: 3

Kap 5, MA: 1, 4, 16, 35

Kap 3.8, MA (efter onsdag): 61, 62, 64, 70

Kap 4.3, MA (efter onsdag): 34, 35, 36, 37



Figur 1: Ett exempel på en markovkedja med tillståndsrum  $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ . Kedjan har ett s.k. absorberande tillstånd, om den vid något tillfälle hamnar i tillstånd 6 så kommer den att stanna där för alltid, dvs om för något  $n$ ,  $X_n = 6$ , så är  $X_m = 6$  för alla  $m \geq n$ . På varje pil finns sannolikheten för att den ska vandra just den vägen angiven.

Vi tolkar bilden på följande sätt. Om  $X_0 = 1$  så är sannolikheten  $1/2$  för att även  $X_1 = 1$  och  $1/2$  för att  $X_1 = 2$ . Om kedjan efter 2 steg befinner sig i tillståndet 7, dvs  $X_2 = 7$ , så kommer med sannolikheten 1  $X_3 = 2$ . Vi kallar dessa sannolikheter för övergångssannolikheter och betecknar dem med betingade sannolikheter, exempelvis  $P_{32} = P(X_{n+1} = 3|X_n = 2)$ .