

**Tentamen**  
**MVE300 Sannolikhet, statistik och risk**

2016-08-16 kl. 8:30 - 13:30

**Examinator:** Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers

**Telefonvakt:** Johan Jonasson, telefon: 0706-985223  
031-7723546

**Hjälpmittel:** Valfri miniräknare. Två blad (dvs fyra sidor) handskrivna anteckningar. Tabeller finns längst bak på tentamenstesen.

Denna tentamen utgör grunden för betygssättning. För betyg 3 krävs minst 18 poäng, för betyg 4 minst 27 poäng och för betyg 5 minst 36 poäng.

---

**1.** (6p) Kasta två vanliga sexsidiga tärningar.

- (a) Vad är sannolikheten att de två poängtalen är lika?
- (b) Vad är den betingade sannolikheten att poängtalen är lika givet att summan är 10?
- (c) Låt  $Y$  vara absolutbeloppet av skillnaden mellan poängtalen. Beräkna väntevärdet av  $Y$ .

**2.** (5p) Låt  $X$  vara en stokastisk variabel som har täthetsfunktionen

$$f(x) = Ke^{x-1}, \quad 1 < x < 3.$$

- (a) Bestäm konstanten  $K$ .
- (b) Beräkna väntevärdet av  $X$ .

**3.** (6p) Paret  $(X, Y)$  av stokastiska variabler har täthetsfunktionen

$$f(x, y) = \frac{5}{4} - xy, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1.$$

- (a) Bestäm marginalfördelningarna för  $X$  och  $Y$ .
- (b) Bestäm kovariansen för  $(X, Y)$ .
- (c) Är  $X$  och  $Y$  oberoende?

**4.** (6p) Ett jordbruk släpper ut nitrat i ett närliggande vattendrag. Vid en undersökning av floden mäts nitrathalten vid ett antal platser nedströms från jordbruken med resultaten

Avstånd (meter)	0	200	400	600	900
Nitrathalt (mg/l)	50	39	41	32	28

- (a) Gör en regression under antagandet att nitrathalten avtar linjärt med avståndet från jordbruken samt att avvikelserna från linjen kan antas vara normalfördelade med konstant varians. Skatta parametrarna i modellen. Kom ihåg att

$$s^2 = \frac{1}{n-2} \left( S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} \right).$$

- (b) Gör ett 95% konfidensintervall för lutningen hos regressionslinjen.
- (c) En badplats ligger 750 meter nedströms jordbruken. Gör ett 90% för vad nitrathalten är vid badplatsen.

5. (6p) Låt  $X_1, X_2, \dots, X_n$  vara ett stickprov på en fördelning som har fördelningsfunktionen

$$F(x) = 1 - \frac{1}{(1+x)^\mu}, \quad x > 0$$

där  $\mu > 0$  är en okänd parameter. Finn ML-skattningen  $\hat{\mu}$  av  $\mu$ . Bestäm också om denna skattning är väntevärdesriktig.

6. (5p) Låt  $X_1, X_2, \dots, X_n$  vara ett stickprov på en fördelning som har fördelningsfunktionen  $F(x)$ . Den empiriska fördelningsfunktionen givet stickprovet ges av

$$\hat{F}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{\{X_i \leq x\}}.$$

Antag att  $n = 400$  och att  $\hat{F}(7.3) = 0.34$ .

- (a) Hur många observationer  $X_i$  gjordes det sådana att  $X_i \leq 7.3$ ?
- (b) Gör ett approximativt 99% uppåt begränsat konfidensintervall för  $F(7.3)$ .

7. (6p) Ett stickprov på en okänd kontinuerlig fördelning gav de tio observationerna -14, 3, -7, -2, 8, 18, -6, -5, -8, 10.

- (a) Gör ett parameterfritt test av nollhypotesen  $m = 0$  på 5% signifikansnivå utan att göra några som helst antaganden om den okända fördelningen. (Här är  $m$  medianen för fördelningen.)
- (b) Antag att data kommer från en symmetrisk fördelning (så att  $m$  också är väntevärdet). Gör återigen att test av  $m = 0$  med lämplig testfunktion. Signifikansnivå 5%.

8. (6p) Att en stokastisk variabel  $Y$  har en betafördelning med parametrar  $a$  och  $b$  (positiva), skrivet  $Y \sim \beta(a, b)$ , betyder  $Y$  är kontinuerlig med täthetsfunktionen

$$f_Y(y) = Cy^{a-1}(1-y)^{b-1}, \quad 0 < y < 1,$$

där  $C$  är en normalisering konstant. Gör först en observation  $Y = y$  under åpriorifördelningen  $\beta(a, b)$  och låt sedan  $X$  vara binomialfördelad med parametrar  $n$  och  $y$ . Bestäm åposteriorifördelningen för  $Y$  givet att  $X = k$ . I fallet  $n = 2$  och  $k = 2$ , beräkna väntevärdet i åposteriorifördelningen.

Lycka till!  
Johan Jonasson

Tabell 1: Values of the cdf  $\Phi(x)$  of the standard normal distribution [e.g.,  $\Phi(1.41) = 0.921$ ]

$x$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.500	.504	.508	.512	.516	.520	.524	.528	.532	.536
0.1	.540	.544	.548	.552	.556	.560	.564	.568	.571	.575
0.2	.579	.583	.587	.591	.595	.599	.603	.606	.610	.614
0.3	.618	.622	.626	.629	.633	.637	.641	.644	.648	.652
0.4	.655	.659	.663	.666	.670	.674	.677	.681	.684	.688
0.5	.692	.695	.698	.702	.705	.709	.712	.716	.719	.722
0.6	.726	.729	.732	.736	.739	.742	.745	.749	.752	.755
0.7	.758	.761	.764	.767	.770	.773	.776	.779	.782	.785
0.8	.788	.791	.794	.797	.800	.802	.805	.808	.811	.813
0.9	.816	.819	.821	.824	.826	.829	.832	.834	.836	.839
1.0	.841	.844	.846	.848	.851	.853	.855	.858	.860	.862
1.1	.864	.867	.869	.871	.873	.875	.877	.879	.881	.883
1.2	.885	.887	.889	.891	.892	.894	.896	.898	.900	.902
1.3	.903	.905	.907	.908	.910	.912	.913	.915	.916	.918
1.4	.919	.921	.922	.924	.925	.926	.928	.929	.931	.932
1.5	.933	.934	.936	.937	.938	.939	.941	.942	.943	.944
1.6	.945	.946	.947	.948	.950	.951	.952	.952	.9545	.954
1.7	.955	.956	.957	.958	.959	.960	.961	.962	.962	.963
1.8	.964	.965	.966	.966	.967	.968	.969	.969	.970	.971
1.9	.971	.972	.973	.973	.974	.974	.975	.976	.976	.977
2.0	.977	.978	.978	.979	.979	.980	.980	.981	.981	.982
2.1	.982	.983	.983	.983	.984	.984	.985	.985	.985	.986
2.2	.986	.986	.987	.987	.988	.988	.988	.988	.989	.989
2.3	.989	.990	.990	.990	.990	.991	.991	.991	.991	.992
2.4	.992	.992	.992	.992	.993	.993	.993	.993	.993	.994
2.5	.994	.994	.994	.994	.995	.995	.995	.995	.995	.995
2.6	.995	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996
2.7	.996	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997
2.8	.997	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998
2.9	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.999	.999	.999

Tabell 2: Values of  $\Phi(x)$  commonly used in confidence intervals and tests, and the corresponding  $x$  values

$\Phi(x)$	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
$x$	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58

Tabell 3: Percentiles of the  $t$  distribution with DF degrees of freedom [e.g.,  $F_{t_7}(1.89) = 0.95$ ]

DF	0.95	0.975	0.99	0.995	DF	0.95	0.975	0.99	0.995
1	6.31	12.71	31.82	63.66	16	1.75	2.12	2.58	2.92
2	2.92	4.30	6.96	9.92	17	1.74	2.11	2.58	2.90
3	2.35	3.18	4.54	5.84	18	1.73	2.10	2.55	2.88
4	2.13	2.78	3.74	4.60	19	1.73	2.09	2.54	2.86
5	2.02	2.57	3.36	4.03	20	1.72	2.09	2.53	2.85
6	1.94	2.45	3.14	3.71	21	1.72	2.08	2.52	2.83
7	1.89	2.36	3.00	3.50	22	1.72	2.07	2.51	2.82
8	1.86	2.31	2.90	3.36	23	1.71	2.07	2.50	2.81
9	1.83	2.26	2.82	3.25	24	1.71	2.06	2.49	2.80
10	1.81	2.23	2.76	3.17	25	1.71	2.06	2.49	2.79
11	1.80	2.20	2.72	3.11	26	1.71	2.06	2.48	2.78
12	1.78	2.18	2.68	3.05	27	1.70	2.05	2.47	2.77
13	1.77	2.16	2.65	3.01	28	1.70	2.05	2.47	2.76
14	1.76	2.14	2.62	2.98	29	1.70	2.05	2.46	2.76
15	1.75	2.13	2.60	2.95	30	1.70	2.04	2.46	2.75

Tabell 4: Percentiles of the chi-square distribution with DF degrees of freedom [e.g.,  $F_{\chi^2_{20}}(10.85) = 0.05$ ]

DF	0.025	0.05	0.95	0.975	DF	0.025	0.05	0.95	0.975
1	0.001	0.004	3.84	5.02	16	6.91	7.96	26.30	28.84
2	0.05	0.10	5.99	7.38	17	7.56	8.67	27.59	30.19
3	0.22	0.35	7.82	9.34	18	8.23	9.39	28.87	31.53
4	0.48	0.71	9.49	11.14	19	8.91	10.12	30.14	32.85
5	0.83	1.14	11.07	12.83	20	9.59	10.85	31.41	34.17
6	1.24	1.64	12.59	14.45	21	10.28	11.60	32.67	35.48
7	1.69	2.17	14.07	16.01	22	10.98	12.34	33.92	36.78
8	2.18	2.73	15.51	17.54	23	11.69	13.09	35.17	38.08
9	2.70	3.32	19.92	19.02	24	12.40	13.85	36.42	39.36
10	3.25	3.94	18.31	20.48	25	13.12	14.61	37.65	40.65
11	3.82	4.58	19.68	21.92	26	13.84	15.38	38.88	41.92
12	4.40	5.23	21.03	23.34	27	14.57	16.15	40.11	43.19
13	5.01	5.89	22.36	27.74	28	15.31	16.93	41.34	44.46
14	5.63	6.57	23.68	26.12	29	16.05	17.71	42.56	45.72
15	6.26	7.26	25.00	27.49	30	16.79	18.49	43.77	46.98

Tabell 5: Percentiles of the  $F$  distribution with  $r$  and  $s$  degrees of freedom [e.g.,  $F_{F_{8,20}}(2.45) = 0.95$ ]

$s$	2.5 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	0.026	0.062	0.094	0.119	0.138	0.153	0.165	0.175	0.183	
3	0.026	0.065	0.100	0.129	0.152	0.170	0.185	0.197	0.207	
4	0.025	0.066	0.104	0.135	0.161	0.181	0.198	0.212	0.224	
5	0.025	0.067	0.107	0.140	0.167	0.189	0.208	0.223	0.236	
6	0.025	0.068	0.109	0.143	0.172	0.195	0.215	0.231	0.246	
7	0.025	0.068	0.110	0.146	0.176	0.200	0.221	0.238	0.253	
8	0.025	0.069	0.111	0.148	0.179	0.204	0.226	0.244	0.259	
9	0.025	0.069	0.112	0.150	0.181	0.207	0.230	0.248	0.265	
10	0.025	0.069	0.113	0.151	0.183	0.210	0.233	0.252	0.269	
12	0.025	0.070	0.114	0.153	0.186	0.214	0.238	0.259	0.276	
15	0.025	0.070	0.116	0.156	0.190	0.219	0.244	0.265	0.284	
16	0.025	0.070	0.116	0.156	0.191	0.220	0.245	0.267	0.286	
18	0.025	0.070	0.116	0.157	0.192	0.222	0.248	0.270	0.290	
20	0.025	0.071	0.117	0.158	0.193	0.224	0.250	0.273	0.293	
21	0.025	0.071	0.117	0.158	0.194	0.225	0.251	0.274	0.294	
24	0.025	0.071	0.117	0.159	0.195	0.227	0.253	0.277	0.297	
25	0.025	0.071	0.118	0.160	0.196	0.227	0.254	0.278	0.298	
27	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.255	0.279	0.300	
28	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.256	0.280	0.301	
30	0.025	0.071	0.118	0.161	0.197	0.229	0.257	0.281	0.302	

$s$	95 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	
3	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	
4	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	
5	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	
6	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	
7	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	
8	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	
9	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	
10	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	
12	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	
15	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	
16	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	
18	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	
20	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	
21	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	
24	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	
25	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	
27	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	
28	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	
30	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	

s	97.5 % percentile									
	r = 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	
3	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	
4	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	
5	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	
6	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	
7	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	
8	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	
9	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	
10	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	
12	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	
15	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	
16	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	
18	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	
20	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	
21	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	
24	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	
25	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	
27	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	
28	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	
30	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	

Tabell 6: Critical values  $c$  for the Wilcoxon signed rank test, where  $n$  is the sample size and  $C = n(n + 1) - c$  [e.g., if  $n = 20$ , then  $P(W \leq 61) = P(W \geq 149) \approx 0.05$ ]

n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$	n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$
5	0	1	15	18	41	48	171
6	1	3	21	19	47	54	190
7	3	4	28	20	53	61	210
8	4	6	36	21	59	68	231
9	6	9	45	22	67	76	253
10	9	11	55	23	74	84	276
11	11	14	66	24	82	92	300
12	14	18	78	25	90	101	325
13	18	22	91	26	99	111	351
14	22	26	105	27	108	120	378
15	26	31	120	28	117	131	406
16	30	36	136	29	127	141	435
17	35	42	153	30	138	152	465

Tabell 7: Critical values  $c$  for the Wilcoxon rank sum test, where  $m$  is the size of the smaller sample, and  $C = m(m + n + 1) - c$  [e.g., if  $m = 4$  and  $n = 8$ , then  $P(W \leq 16) = P(W \geq 36) \approx 0.05$ ]

$n$	$P(W \leq c)$	$m = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0.025	3									
	0.05	3									
3	0.025	3	3								
	0.05	6	7								
4	0.025	3	6	11							
	0.05	3	7	12							
5	0.025	3	7	12	18						
	0.05	4	8	13	20						
6	0.025	3	8	13	19	27					
	0.05	4	9	14	21	29					
7	0.025	3	8	14	21	28	37				
	0.05	4	9	15	22	30	40				
8	0.025	4	9	15	22	30	39	50			
	0.05	5	10	16	24	32	42	52			
9	0.025	4	9	15	23	32	41	52	63		
	0.05	5	11	17	25	34	44	55	67		
10	0.025	4	10	16	24	33	43	54	66	79	
	0.05	5	11	18	27	36	46	57	70	83	
11	0.025	5	10	17	25	35	45	56	69	82	97
	0.05	5	12	19	28	38	48	60	73	87	101