

Tentamen
MVE300 Sannolikhet, statistik och risk

2016-10-07 kl. 8:30 - 13:30

Examinator: Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers

Telefonvakt: Johan Jonasson, telefon: 0706-985223
031-7723546

Hjälpmaterial: Valfri miniräknare. Två blad (dvs fyra sidor) handskrivna anteckningar. Tabeller finns längst bak på tentamenstesen.

Denna tentamen utgör grunden för betygssättning. För betyg 3 krävs minst 18 poäng, för betyg 4 minst 27 poäng och för betyg 5 minst 36 poäng.

1. (6p) En urna innehåller sex röda och fyra gröna bollar. En annan urna innehåller åtta röda och två gröna bollar. Man tar först på måfå en boll ur den första urnan och stoppar i den andra. Sedan väljs på måfå en boll ur den andra urnan och läggs i den första. Vad är sannolikheten att

- (a) man flyttar en röd boll vid bågge tillfällena?
- (b) man efter de två förflyttningarna har lika många röda bollar i bågge urnorna?

2. (6p) Antag att $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ är ett stickprov på en tvådimensionell stokastisk variabel (X, Y) och att $\mathbb{E}[X^2]$, $\mathbb{E}[Y^2]$ och $\mathbb{E}[XY]$ alla är ändliga (så att varianserna och kovariansen är väldefinierade). Visa att

$$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i Y_i - \bar{X} \bar{Y})$$

är en väntevärdesriktig skattning av $\text{Cov}(X, Y)$.

3. (5p) Låt A och B vara två händelser med $\mathbb{P}(A) > 0$ och $\mathbb{P}(B) > 0$.

- (a) Visa med ett motexempel att det inte är allmänt sant att $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(B|A)$.
- (b) Ange ett tillräckligt och nödvändigt villkor för att $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(B|A)$.

4. (6p) Låt X_1, X_2, \dots, X_n vara en följd av oberoende slantsinglingar (dvs $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 0) = 1/2$).

- (a) Beräkna väntevärde och varians av

$$Y = \min\{n : X_n = 1, X_{n-1} = 0\}.$$

- (b) Beräkna väntevärde och varians av

$$Y = \min\{n : X_n = X_{n-1} = 1\}.$$

5. (6p) Visa med hjälp av centrala gränsvärdessatsen att för X Poissonfördelad med parameter λ gäller att

$$\mathbb{P}\left(\frac{X - \lambda}{\sqrt{\lambda}}\right) \rightarrow \Phi(x)$$

för alla x då $\lambda \rightarrow \infty$. Använd sedan detta till att konstruera en approximativt normalfördelad testfunktion för att testa $H_0 : \lambda_x = \lambda_y$ mot $H_A : \lambda_x \neq \lambda_y$ då X och Y är oberoende och Poissonfördelade med parametrar λ_x respektive λ_y och man vet att $\lambda_x, \lambda_y > 1000$. I testfunktionens nämnare går det bra att ersätta λ_x med X och analogt för Y .

6. (5p) Låt U och V vara oberoende stokastiska variabler, likformigt fördelade på $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Vad är sannolikheten att polynomet $x^2 + 2Ux + V$

- (a) har reella nollställen?
- (b) har endast ett nollställe (dvs en dubbelrot)?

7. (6p) Antag att X_{ij} , $i = 1, 2$, $j = 1, 2$ är oberoende och exponentialfördelade med parameter 1. Beräkna $\mathbb{E}[M]$ där $M = \min(X_{11} + X_{22}, X_{12} + X_{21})$.

(Detta är känt som det enklaste specialfallet av *the minimal assignment problem*.)

8. (5p) Låt X och Y vara oberoende och exponentialfördelade med parameter 1 och sedan, givet $X = x$ och $Y = y$, låt Z vara $\Gamma(2, x + y)$ -fördelad. Om man observerar $Z = z$, vad är den betingade fördelningen för $X + Y$?

Lycka till!
Johan Jonasson

Tabell 1: Values of the cdf $\Phi(x)$ of the standard normal distribution [e.g., $\Phi(1.41) = 0.921$]

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.500	.504	.508	.512	.516	.520	.524	.528	.532	.536
0.1	.540	.544	.548	.552	.556	.560	.564	.568	.571	.575
0.2	.579	.583	.587	.591	.595	.599	.603	.606	.610	.614
0.3	.618	.622	.626	.629	.633	.637	.641	.644	.648	.652
0.4	.655	.659	.663	.666	.670	.674	.677	.681	.684	.688
0.5	.692	.695	.698	.702	.705	.709	.712	.716	.719	.722
0.6	.726	.729	.732	.736	.739	.742	.745	.749	.752	.755
0.7	.758	.761	.764	.767	.770	.773	.776	.779	.782	.785
0.8	.788	.791	.794	.797	.800	.802	.805	.808	.811	.813
0.9	.816	.819	.821	.824	.826	.829	.832	.834	.836	.839
1.0	.841	.844	.846	.848	.851	.853	.855	.858	.860	.862
1.1	.864	.867	.869	.871	.873	.875	.877	.879	.881	.883
1.2	.885	.887	.889	.891	.892	.894	.896	.898	.900	.902
1.3	.903	.905	.907	.908	.910	.912	.913	.915	.916	.918
1.4	.919	.921	.922	.924	.925	.926	.928	.929	.931	.932
1.5	.933	.934	.936	.937	.938	.939	.941	.942	.943	.944
1.6	.945	.946	.947	.948	.950	.951	.952	.952	.9545	.954
1.7	.955	.956	.957	.958	.959	.960	.961	.962	.962	.963
1.8	.964	.965	.966	.966	.967	.968	.969	.969	.970	.971
1.9	.971	.972	.973	.973	.974	.974	.975	.976	.976	.977
2.0	.977	.978	.978	.979	.979	.980	.980	.981	.981	.982
2.1	.982	.983	.983	.983	.984	.984	.985	.985	.985	.986
2.2	.986	.986	.987	.987	.988	.988	.988	.988	.989	.989
2.3	.989	.990	.990	.990	.990	.991	.991	.991	.991	.992
2.4	.992	.992	.992	.992	.993	.993	.993	.993	.993	.994
2.5	.994	.994	.994	.994	.995	.995	.995	.995	.995	.995
2.6	.995	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996
2.7	.996	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997
2.8	.997	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998
2.9	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.999	.999	.999

Tabell 2: Values of $\Phi(x)$ commonly used in confidence intervals and tests, and the corresponding x values

$\Phi(x)$	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
x	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58

Tabell 3: Percentiles of the t distribution with DF degrees of freedom [e.g., $F_{t_7}(1.89) = 0.95$]

DF	0.95	0.975	0.99	0.995	DF	0.95	0.975	0.99	0.995
1	6.31	12.71	31.82	63.66	16	1.75	2.12	2.58	2.92
2	2.92	4.30	6.96	9.92	17	1.74	2.11	2.58	2.90
3	2.35	3.18	4.54	5.84	18	1.73	2.10	2.55	2.88
4	2.13	2.78	3.74	4.60	19	1.73	2.09	2.54	2.86
5	2.02	2.57	3.36	4.03	20	1.72	2.09	2.53	2.85
6	1.94	2.45	3.14	3.71	21	1.72	2.08	2.52	2.83
7	1.89	2.36	3.00	3.50	22	1.72	2.07	2.51	2.82
8	1.86	2.31	2.90	3.36	23	1.71	2.07	2.50	2.81
9	1.83	2.26	2.82	3.25	24	1.71	2.06	2.49	2.80
10	1.81	2.23	2.76	3.17	25	1.71	2.06	2.49	2.79
11	1.80	2.20	2.72	3.11	26	1.71	2.06	2.48	2.78
12	1.78	2.18	2.68	3.05	27	1.70	2.05	2.47	2.77
13	1.77	2.16	2.65	3.01	28	1.70	2.05	2.47	2.76
14	1.76	2.14	2.62	2.98	29	1.70	2.05	2.46	2.76
15	1.75	2.13	2.60	2.95	30	1.70	2.04	2.46	2.75

Tabell 4: Percentiles of the chi-square distribution with DF degrees of freedom [e.g., $F_{\chi^2_{20}}(10.85) = 0.05$]

DF	0.025	0.05	0.95	0.975	DF	0.025	0.05	0.95	0.975
1	0.001	0.004	3.84	5.02	16	6.91	7.96	26.30	28.84
2	0.05	0.10	5.99	7.38	17	7.56	8.67	27.59	30.19
3	0.22	0.35	7.82	9.34	18	8.23	9.39	28.87	31.53
4	0.48	0.71	9.49	11.14	19	8.91	10.12	30.14	32.85
5	0.83	1.14	11.07	12.83	20	9.59	10.85	31.41	34.17
6	1.24	1.64	12.59	14.45	21	10.28	11.60	32.67	35.48
7	1.69	2.17	14.07	16.01	22	10.98	12.34	33.92	36.78
8	2.18	2.73	15.51	17.54	23	11.69	13.09	35.17	38.08
9	2.70	3.32	19.92	19.02	24	12.40	13.85	36.42	39.36
10	3.25	3.94	18.31	20.48	25	13.12	14.61	37.65	40.65
11	3.82	4.58	19.68	21.92	26	13.84	15.38	38.88	41.92
12	4.40	5.23	21.03	23.34	27	14.57	16.15	40.11	43.19
13	5.01	5.89	22.36	27.74	28	15.31	16.93	41.34	44.46
14	5.63	6.57	23.68	26.12	29	16.05	17.71	42.56	45.72
15	6.26	7.26	25.00	27.49	30	16.79	18.49	43.77	46.98

Tabell 5: Percentiles of the F distribution with r and s degrees of freedom [e.g., $F_{F_{8,20}}(2.45) = 0.95$]

s	2.5 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	0.026	0.062	0.094	0.119	0.138	0.153	0.165	0.175	0.183	
3	0.026	0.065	0.100	0.129	0.152	0.170	0.185	0.197	0.207	
4	0.025	0.066	0.104	0.135	0.161	0.181	0.198	0.212	0.224	
5	0.025	0.067	0.107	0.140	0.167	0.189	0.208	0.223	0.236	
6	0.025	0.068	0.109	0.143	0.172	0.195	0.215	0.231	0.246	
7	0.025	0.068	0.110	0.146	0.176	0.200	0.221	0.238	0.253	
8	0.025	0.069	0.111	0.148	0.179	0.204	0.226	0.244	0.259	
9	0.025	0.069	0.112	0.150	0.181	0.207	0.230	0.248	0.265	
10	0.025	0.069	0.113	0.151	0.183	0.210	0.233	0.252	0.269	
12	0.025	0.070	0.114	0.153	0.186	0.214	0.238	0.259	0.276	
15	0.025	0.070	0.116	0.156	0.190	0.219	0.244	0.265	0.284	
16	0.025	0.070	0.116	0.156	0.191	0.220	0.245	0.267	0.286	
18	0.025	0.070	0.116	0.157	0.192	0.222	0.248	0.270	0.290	
20	0.025	0.071	0.117	0.158	0.193	0.224	0.250	0.273	0.293	
21	0.025	0.071	0.117	0.158	0.194	0.225	0.251	0.274	0.294	
24	0.025	0.071	0.117	0.159	0.195	0.227	0.253	0.277	0.297	
25	0.025	0.071	0.118	0.160	0.196	0.227	0.254	0.278	0.298	
27	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.255	0.279	0.300	
28	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.256	0.280	0.301	
30	0.025	0.071	0.118	0.161	0.197	0.229	0.257	0.281	0.302	

s	95 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	
3	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	
4	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	
5	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	
6	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	
7	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	
8	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	
9	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	
10	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	
12	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	
15	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	
16	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	
18	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	
20	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	
21	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	
24	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	
25	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	
27	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	
28	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	
30	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	

s	97.5 % percentile									
	r = 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	
3	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	
4	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	
5	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	
6	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	
7	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	
8	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	
9	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	
10	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	
12	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	
15	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	
16	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	
18	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	
20	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	
21	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	
24	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	
25	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	
27	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	
28	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	
30	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	

Tabell 6: Critical values c for the Wilcoxon signed rank test, where n is the sample size and $C = n(n + 1) - c$ [e.g., if $n = 20$, then $P(W \leq 61) = P(W \geq 149) \approx 0.05$]

n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$	n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$
5	0	1	15	18	41	48	171
6	1	3	21	19	47	54	190
7	3	4	28	20	53	61	210
8	4	6	36	21	59	68	231
9	6	9	45	22	67	76	253
10	9	11	55	23	74	84	276
11	11	14	66	24	82	92	300
12	14	18	78	25	90	101	325
13	18	22	91	26	99	111	351
14	22	26	105	27	108	120	378
15	26	31	120	28	117	131	406
16	30	36	136	29	127	141	435
17	35	42	153	30	138	152	465

Tabell 7: Critical values c for the Wilcoxon rank sum test, where m is the size of the smaller sample, and $C = m(m + n + 1) - c$ [e.g., if $m = 4$ and $n = 8$, then $P(W \leq 16) = P(W \geq 36) \approx 0.05$]

n	$P(W \leq c)$	$m = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0.025	3									
	0.05	3									
3	0.025	3	3								
	0.05	6	7								
4	0.025	3	6	11							
	0.05	3	7	12							
5	0.025	3	7	12	18						
	0.05	4	8	13	20						
6	0.025	3	8	13	19	27					
	0.05	4	9	14	21	29					
7	0.025	3	8	14	21	28	37				
	0.05	4	9	15	22	30	40				
8	0.025	4	9	15	22	30	39	50			
	0.05	5	10	16	24	32	42	52			
9	0.025	4	9	15	23	32	41	52	63		
	0.05	5	11	17	25	34	44	55	67		
10	0.025	4	10	16	24	33	43	54	66	79	
	0.05	5	11	18	27	36	46	57	70	83	
11	0.025	5	10	17	25	35	45	56	69	82	97
	0.05	5	12	19	28	38	48	60	73	87	101