TMA421/MSN222 Tentamen i stokastiska processer den 24/8 2007 fm i V

HJÄLPMEDEL: Resultatsammanfattning, beta, och projektstenciler.

LÄRARE: Patrik Albin. JOUR: Johan Tykesson.

Övningstentamen ger bonus vid denna tentamen enligt KursPM. Tentamensresultatet meddelas via email. Inlämnade svar skall motiveras.

`Uppgift 1.` Beräkna korskorrelationsfunktionen $\rho_{Z_1,Z_2}(s,t) = \mathbf{Cov}\{Z_1(s), Z_2(t)\} / \sqrt{\mathbf{Var}\{Z_1(s)\}\,\mathbf{Var}\{Z_1(t)\}}$ för $s,t \geq 0$ mellan $Z_1(t) = X(t)+Y(t)$ och $Z_2(t) = X(t)-Y(t)$ då $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ och $\{Y(t)\}_{t\geq 0}$ är oberoende Poissonprocesser med intensiteter $\lambda_X > 0$ resektive $\lambda_Y > 0$. **(5 poäng)**

`Uppgift 2` Beräkna $\mathbf{P}\{W(2) > W(1)+x\}$ för reella tal x då $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ är en standard Wienerprocess. **(5 poäng)**

`Uppgift 3` Bestäm kovariansfunktionen r_Y och spektraltätheten $\mathcal{P}_Y$ för utsignalen $\{Y(k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ från ett filter i diskret tid med impulssvar h_2 och insignal $\{X(k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$, då X i sin tur är utsignal från ett filter i diskret tid med impulssvar h_1 och diskret vitt brus som insignal. **(5 poäng)**

`Uppgift 4` Avgör om funktionen $r(t) = 1-t^2$ för $|t| \leq 1$ och $r(t) = 0$ för $|t| > 1$ är kovariansfunktion för någon svagt stationär process $\{X(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ i kontinuerlig tid. **(5 poäng)**

`Uppgift 5` Bestäm korsspektraltätheten mellan Hilberttransformen och derivatan av en deriverbar svagt stationär process $\{X(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ i kontinuerlig tid. **(5 poäng)**

`Uppgift 6 (projekt 1)` En Poisson-process $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ med intensitet 1 kan beskrivas som ett "halvt hagelbrus"

$$X(t) = \sum_{k=1}^{\infty} g\left(t - \sum_{j=1}^{k} \xi_j\right) \qquad \text{för} \quad t \geq 0,$$

där $\xi_1, \xi_2, \ldots$ är oberoende exp(1)-fördelade stokastiska variabler och $g(t)=1$ för $t \geq 0$ samt $g(t)=0$ för $t<0$.

`a` Förklara påståendet att Poisson-processen är ett halvt hagelbrus. **(1 poäng)**

`b` Hur kan man med hjälp av datorsimuleringar uppskatta sannolikheten

$$\mathbf{P}\{X(t)-t \geq 4 \text{ för något } t \in [0,10]\}. \qquad \textbf{(3 poäng)}$$

`c` Hur kan man simulera en Poisson-fördelad stokastisk variabel i dator? **(1 poäng)**

`Uppgift 6 (projekt 2)` `a` Hur kan man med hjälp av provtransmissioner uppskatta bitfelssannolikheten för ett digitalt kommunikationssystem. **(2.5 poäng)**

`b` Vad kan tänkas orsaka att den enligt deluppgift a skattade bitfelssannolikheten inte överensstämmer med den teoretiskt beräknade enligt projekt 2. **(1.5 poäng)**

c Beräkna variansen $\mathbf{Var}\{X(1)\}$ för en svagt stationär process $\{X(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ i kontinuerlig tid med spektraltäthet $\mathcal{P}_X(f)=1$ för $f\in\mathbb{R}$. **(1 poäng)**

Uppgift 6 (projekt 3) a Förklara hur man med hjälp av maximum likelihood metoden kan skatta värdet av parametern $\lambda > 0$ för ett datamaterial $x_1, \ldots, x_n$ av observationer $X_1, \ldots, X_n$ av en $\exp(\lambda)$-fördelning. **(1.5 poäng)**

b Vilken fördelning har den stokastiska variablen $\mathrm{e}^{-\lambda X}$ då X är en $\exp(\lambda)$-fördelad stokastisk variabel? **(1.5 poäng)**

c Betrakta en prismodell $S(t) = S(0)\,\mathrm{e}^{X(t)-X(0)+\mu t}$ där $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ är en stokastisk process som har stationära ökningar som dock ej är oberoende. Diskutera vilka nya svårigheter som uppstår med en sådan modell jämfört situationen i projekt 3 där $X(t)$ även har oberoende ökningar. Säg något om de praktiskt ekonomiska konsekvenser en sådan modell kan ha jämfört en model baserad på Lévy-processer (med oberoende stationära ökningar). **(2 poäng)**

Lycka till!

Lösningar till tentamen i stokastiska processer den 24/8

`Uppgift 1` Detta är övning 2.3 i Albins bok: se lösning där.

`Uppgift 2` Detta är övning 4.11 i Albins bok: se lösning där.

`Uppgift 3` Detta är övning 7.4 i Albins bok: se lösning där.

`Uppgift 4` Detta är övning 6.16 i Albins bok: se lösning där.

`Uppgift 5` Detta är övning 8.10 i Albins bok: se lösning där.

`Uppgift 6 (projekt 1)` `a` Det halva hagelbruset enligt uppgiften ger en process som ökar ett steg i taget med oberoende exp(1)-fördelade tidsmellanrum, vilket är precis hur Poisson processen beter sig!

`b` Enligt en smärre modifiering av lösningen till programmeringsuppgift 1 c.

`c` En Po(λ)-fördelad stokastisk variabel erhålles genom att simulera värdet $X(\lambda)$ för en Poisson-process $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ med intensitet 1.

`Uppgift 6 (projekt 2)` `a` Enligt uppgift 4 i projektet.

`b` Bruset är kanske inte normalfördelat, eller så är det inte helt "vitt".

`c` $\mathbf{Var}\{X(1)\} = r_X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}_X(f)\,df = \infty$.

`Uppgift 6 (projekt 3)` `a` $\frac{d}{d\lambda}\ln(\prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)) = \frac{d}{d\lambda}\sum_{i=1}^{n}\ln(\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x_i}) = \sum_{i=1}^{n}(\frac{1}{\lambda} - x_i) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1/\overline{x}$.

`b` $\mathbf{P}\{\mathrm{e}^{-\lambda X} \leq x\} = \mathbf{P}\{-\lambda X \leq \ln(x)\} = \mathbf{P}\{X \geq -\ln(x)/\lambda\} = 1 - F_X(\ln(x)/\lambda) = \mathrm{e}^{-\lambda(\ln(x)/\lambda)} = x$, så $\mathrm{e}^{-\lambda X}$ är likformigt fördelad över $[0, 1]$.

`c` Maximum likelihood metoden fungerar inte som tidigare eftersom log-inkrementen ej är oberoende. En modell där ökningarna ej är oberoende ger möjlighet att "titta in i framtiden", dvs. det kan finnas "free lunches".