

# Linjär algebra – övningar

Fredrik Bengzon

Modifierat av Stig Larsson, 2004-01-30

## A. Ortogonalprojektion

**Problem 1** Låt  $x = [1, -1, 0, 2]^T$  och  $y = [3, -1, 1, 1]^T$ .

- Beräkna  $x \cdot y$ .
- Bestäm vinkeln mellan vektorerna  $x$  och  $y$ .
- Beräkna vinkeln mellan vektorerna  $x - y$  och  $x + y$ .

**Problem 2** Låt  $e = [2, 1, 2, 1]^T$  och  $w = [1, 2, -3, 4]^T$ . Bestäm talet  $s$  så att vektorn  $se + w$  blir ortogonal mot  $e$ .

**Problem 3** Ortogonalisera följande vektorer med Gram-Schmidts metod.

$$v_1 = [1, 2, 3]^T, \quad v_2 = [3, 2, 1]^T.$$

**Problem 4** Låt  $e_1 = [2, 1, 0, 1]^T$ ,  $e_2 = [0, 2, 1, -2]^T$  och  $w = [1, 2, 1, 2]^T$ . Visa, att  $e_1$  och  $e_2$  är ortogonala och bestäm sedan talen  $s_1$  och  $s_2$ , så att vektorn  $s_1e_1 + s_2e_2 + w$  blir ortogonal mot både  $e_1$  och  $e_2$ .

**Problem 5** Låt  $V$  vara ett underrum till  $\mathbb{R}^m$  med dimensionen  $n < m$  och låt  $V$  spännas av kolonnerna i matrisen  $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Projektionsmatrisen  $P$  för ortogonal projektion på  $V$  ges av

$$P = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T.$$

Visa, att  $P = QQ^T$  om kolonnerna i  $Q$  är ortonormala. Avancerat: bevisa formeln för  $P$ .

**Problem 6** Låt

$$u = [1, 1, 1, 1]^T, \quad v = [1, -1, 1, -1]^T.$$

och låt  $V = S(u, v)$  vara vektorrummet som spänns upp av  $u$  och  $v$ .

- Verifiera att  $u$  och  $v$  är ortogonala.
- Normalisera  $u$  och  $v$  till längden 1. Dessa bildar en ON-bas för  $V$ .
- Bilda  $(4 \times 2)$  matrisen  $Q$  med vektorerna i ON-basen som kolonner. Beräkna  $Q^T Q$ . Beräkna projektionsmatrisen  $P = QQ^T$  för ortogonal projektion på  $V$ .
- Bestäm ortogonalprojektionerna  $Pw$  av vektorn  $w = [1, 2, 3, 4]^T$  på  $V$ . Beräkna  $(w - Pw) \cdot u$ .

**Problem 7** Ange ortogonalprojektionerna av  $u = [0, 4, 4, 0]^T$  på det underrum till  $\mathbb{R}^4$ , som genereras av vektorerna

$$e_1 = [1, 2, 3, 1]^T, \quad e_2 = [1, -2, 1, 0]^T.$$

## B. Egenvärden

**Problem 8** Visa, att  $x = [1, 0]^T$  är en egenvektor till

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Vilket egenvärde är associerat med denna egenvektor?

**Problem 9** Bestäm egenvärdena till matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 9 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

**Problem 10** Bestäm egenvärdena till matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Problem 11** Bestäm egenvärden och egenvektorer till

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

**Problem 12** Givet matriserna

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Visa, att multiplikationen  $P^T A P$  ger en diagonal matris  $D$ .

**Problem 13** Beräkna egenvärden  $\lambda$  och normaliserade egenvektorer  $x$  till

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 9 & 7 \end{bmatrix}.$$

**Problem 14** Visa, att om  $\lambda$  är ett egenvärde till  $A$ , så är  $1/\lambda$  ett egenvärde till  $A^{-1}$ .

**Svar 1**

a. 6

b.  $\pi/4$

c.  $\arccos(-1/\sqrt{5})$

**Svar 2**  $s = -1/5$

**Svar 3**  $u_1 = v_1/\|v_1\| = [1, 2, 3]^T/\sqrt{14}$ ,  $u_2 = [4, 1, -2]^T/\sqrt{21}$ .

**Svar 4**  $s_1 = -1$ ,  $s_2 = -1/9$

**Svar 5**  $Q$ :s kolonner är ortonormala dvs.  $Q^T Q = I$ . Projektionen blir

$$P = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T = Q I^{-1} Q^T = Q Q^T.$$

Observera att  $Q Q^T \neq I$  eftersom  $Q$  är av typ  $(m \times n)$ .

**Svar 6**

a. -

b. -

c.

$$Q = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

d.  $Pw = [2, 3, 2, 3]^T$

**Svar 7**  $\frac{2}{3}[1, 6, 5, 2]^T$

**Svar 8**  $\lambda = 2$

**Svar 9** Matrisen  $A$  är triangulär, då är även  $A - \lambda I$  triangulär,  $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(6 - \lambda)(9 - \lambda)(6 - \lambda)(4 - \lambda)$ , egenvärdena är lika med diagonalelementen: 1, 6, 9, 6 och 4.

**Svar 10** -1, 7 och 1.

**Svar 11**  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 5$  och t.ex.  $x_1 = [1, -1]^T$ ,  $x_2 = [0, 1]^T$ ,

**Svar 12**  $D = \text{diag}(-1, 3)$ . Kolonnerna i  $P$  är egenvektorena till  $A$ .

**Svar 13**  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 8$  och  $x_1 = [-1, 1]^T/\sqrt{2}$ ,  $x_2 = [1, 1]^T/\sqrt{2}$ .

**Svar 14** -