

## Tentamen för Matematisk överbryggingskurs

**Tid och plats:** 2017-06-08, kl 14:00-18:00, L. **Ansvarig:** Jacques Huitfeldt, 031-7721093.

**Betygsgränser:** 20, 30 resp. 40 poäng. Tentan omfattar totalt 50 poäng.

**Hjälpmedel:** Inga hjälpmedel tillåtna, utom bifogat formelblad.

---

**Uppgift 1.** Antag  $\hat{x}$  är en lösning till ekvationen  $f(x) = 0$  med  $f'(\hat{x}) \neq 0$ . Visa att om Newtons metod konvergerar mot  $\hat{x}$  så gäller att konvergensen är kvadratisk.

Uppgiften ger maximalt (8p)

**Uppgift 2.** Lamberts W-funktion  $W(x)$  definieras av ekvationen

$$x = W(x) \exp(W(x))$$

Vi skall rita grafen av  $W(x)$  över intervallet  $0 \leq x \leq 20$  på två olika sätt.

(a). Skriv en kod i MATLAB som använder `fzero` för att rita upp grafen av  $W(x)$ .

(b). Derivera ekvationen för funktionen  $W(x)$  så att vi får en differentialekvation för  $W(x)$ . Skriv den kod i MATLAB som behövs för att med hjälp av `ode45` lösa differentialekvationen och rita upp grafen av  $W(x)$ .

Hela uppgiften ger maximalt (8p)

**Uppgift 3.** Betrakta randvärdesproblemet

$$\begin{cases} u'' + \cos(x) u = \exp(x), & 0 < x < 1 \\ u'(0) = 1, \quad u(1) = 3 \end{cases}$$

(a). Gör en indelning av intervallet så att vi får  $n$  inre punkter. Skriv ned matrisekvationen vi får då vi i problemet ersätter derivator med differensapproximationer. Vi vill se matrisen och högerledsvektorn.

(b). Härled de differensapproximationer du använder i (a). Det skall framgå vilken noggrannhetsordning approximationerna har.

(c). Skriv den kod i MATLAB som behövs för att bygga upp matris och högerled från (a), samt beräkna lösningen och rita upp den. Matrisen skall lagras som en gles matris med `spdiags`. Även randvillkoren skall finnas med vid uppritningen.

Hela uppgiften ger maximalt (8p)

**Uppgift 4.** Betrakta följande linjära system av ODE

$$\begin{cases} \mathbf{u}' = \mathbf{A}\mathbf{u}, & t > 0 \\ \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

(a). Lös problemet med egenvärdesmetoden.

Fortsätter >>>

- (b). Härled formeln du använde i (a) utgående från att  $\mathbf{A}$  är diagonaliseringbar ( $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{V} = \mathbf{D}$ ).  
(c). Tag ett steg med Euler framåt med steglängden  $h = 0.1$ .

Hela uppgiften ger maximalt (8p)

**Uppgift 5.** Betrakta det icke-linjära ekvationssystemet

$$\begin{cases} x_1 + x_2^3 - 1 = 0 \\ x_1 \exp(x_1 x_2) + x_2 + 1 = 0 \end{cases}$$

- (a). Skriv systemet på kompakt form  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ . Vad blir  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$  och vad blir  $\mathbf{Df}(\mathbf{x})$ , dvs. beräkna derivatamatrisen.  
(b). Härled Newtons metod för ekvationen  $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ .  
(c). Tag ett steg med Newtons metod utgående från startapproximationen  $\mathbf{x}_0 = (1, 0)$  för hand, dvs. utför beräkningarna med papper och penna.  
(d). Skriv ned den kod i MATLAB som utgående från startapproximationen  $\mathbf{x}_0 = (1, 0)$  beräknar lösningen med Newtons metod.

Hela uppgiften ger maximalt (8p)

**Uppgift 6.** Betrakta följande tidsberoende problem

$$\begin{cases} u'_t = u''_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 5, 0 < t \leq T \\ u(0, t) = g(t), u'_x(5, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & 0 < x < 5 \end{cases}$$

där  $f(x, t) = 0.2x \exp(-0.2t)$  och  $g(t) = 1 + \sin(0.7t)$ .

- (a). Vi skall lösa problemet med linjemetoden. Skriv ned det begynnelsevärdesproblem vi får då vi approximerar  $x$ -derivatorna med differenskvoter. Vi vill ha svaret på vektorform.  
(b). Skriv ned den kod som i MATLAB behövs för att med `ode45` beräkna och sedan rita upp  $u(x, t)$  för  $0 < t \leq T$  med  $T = 25$ . Tänk på att även värdena vid  $x = 0$  och  $x = 5$  skall finnas med vid uppritningen.

Hela uppgiften ger maximalt (10p)

### Differensapproximationer

$$\begin{aligned}
 D_+ u(x) &= \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = u'(x) + \mathcal{O}(h), & D_- u(x) &= \frac{u(x) - u(x-h)}{h} = u'(x) + \mathcal{O}(h) \\
 D_0 u(x) &= \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} = u'(x) + \mathcal{O}(h^2) \\
 D_+ D_- u(x) &= \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} = u''(x) + \mathcal{O}(h^2) \\
 \frac{u(x+2h) - 2u(x+h) + 2u(x-h) - u(x-2h)}{2h^3} &= u'''(x) + \mathcal{O}(h^2) \\
 \frac{u(x+2h) - 4u(x+h) + 6u(x) - 4u(x-h) + u(x-2h)}{h^4} &= u^{(4)}(x) + \mathcal{O}(h^2)
 \end{aligned}$$

Taylorutveckling

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots \\
 &\quad + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n+1}(x) \\
 R_{n+1}(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} = \mathcal{O}((x-a)^{n+1})
 \end{aligned}$$

Taylorutveckling i två variabler

$$f(x, y) = f(a, b) + f'_x(a, b)h + f'_y(a, b)k + \frac{1}{2}(f''_{xx}(a, b)h^2 + 2f''_{xy}(a, b)hk + f''_{yy}(a, b)k^2) + \dots$$

där  $h = x - a$  och  $k = y - b$ .

Lite stolpar i MATLAB som stöd för minnet.

Elementära funktioner

```
abs(x), sqrt(x), exp(x), log(x), cos(x), sin(x), tan(x)
```

Matris- och vektorfunktioner

```
size(A), length(v)
sum(v), prod(v), max(v), min(v), sort(v), norm(v), dot(u,v)
```

Matrisuppbryggande funktioner

```
A=ones(m,n), A=zeros(m,n), A=eye(m,n), A=diag(d,k), A=spdiags(D,K,m,n)
```

Villkorssatser

if uttryck	if uttryck	if uttryck
satser	satser	satser
end	else	elseif uttryck
	satser	satser
	end	end

Repetitionssatser

while uttryck	for variabel=uttryck	for variabel=start:steg:slut
satser	satser	satser
end	end	end

Egna funktioner

```
function ut=funktionsnamn(parametrar)           handtagsnamn=@(parametrar) sats
    satser
```

Beräkningsfunktioner

```
x=fzero(f,x0), x=fminbnd(f,x0,x1), q=integral(f,a,b), [t,U]=ode45(f,tspan,u0)
x=A\b, [V,D]=eig(A), [V,D]=eigs(A,K,'SM')
x=fsolve(f,x0), x=fminunc(f,x0), q=integral2(f,a,b,c,d)
```

Grafik

```
x=linspace(a,b,n)
plot(x,y), plot3(x,y,z), quiver(u,v,du,dv,sc), quiver3(...)
[X,Y]=meshgrid(x,y)
surf(X,Y,Z), contour(X,Y,Z,lv)
```