

**Deltentamen
godkändelen, del 1**

MVE085 Flervariabelanalys V2

2010-09-18 kl. 8:30-11:30

Examinator: Thomas Wernstål, Matematiska vetenskaper, Chalmers

Telefonvakt: Thomas Wernstål , telefon: 0703 357 731

Hjälpmaterial: bifogat formelblad, ordlistan från kurswebbsidan, ej räknedosa

Tentamen på kursen består av tre delar; del 1 och del 2 av godkäntdelen samt överbetygssdelen. Denna deltenta täcker endast den första av dessa tre delar. För godkänt på tentamen som helhet krävs antingen 25 poäng på godkäntdelens två delar sammanlagt, eller att båda delarna är godkända var för sig. För godkänt på del 1 krävs minst 10 poäng, för godkänt på del 2 krävs 13 poäng. Erhälلن poäng på någon av delarna får ersätta poäng på motsvarande del på senare tentamen tills kursen ges nästa läsår. För godkänt på kursen skall också Matlabmomentet vara godkänt. För betyg 4 eller 5 krävs dessutom 33 resp. 42 poäng sammanlagt på tentamens alla delar.

Lösningar läggs ut på kursens webbsida första vardagen efter tentamensdagen. Tentan rättas och bedöms anonymt. Resultat meddelas i samband med undervisningen senast tre veckor efter tentamenstillfället.

Godkäntdelen, del 1

se uppgift 1:abc och 2 på nästa blad

Lycka till!
Thomas Wernstål

Formelblad för TMA043 och MVE085, 10/11

Trigonometri.

$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$$

$$\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$$

$$\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y))$$

$$\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y))$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}$$

Integralkatalog

$\int x^a dx$	=	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$, $a \neq -1$	$\int \frac{1}{x} dx$	=	$\ln x + C$
$\int \sin x dx$	=	$-\cos x + C$	$\int \cos x dx$	=	$\sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	=	$\tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	=	$-\cot x + C$
$\int e^x dx$	=	$e^x + C$	$\int a^x dx$	=	$\frac{a^x}{\ln a} + C$, $0 < a \neq 1$
$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx$	=	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$, $a \neq 0$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	=	$\ln f(x) + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{a-x^2}} dx$	=	$\arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + C$, $a > 0$	$\int \sqrt{a-x^2} dx$	=	$\frac{1}{2}x\sqrt{a-x^2} + \frac{a}{2} \arcsin \frac{x}{\sqrt{a}} + C$, $a > 0$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx$	=	$\ln x+\sqrt{x^2+a} + C$, $a \neq 0$	$\int \sqrt{x^2+a} dx$	=	$\frac{1}{2}(x\sqrt{x^2+a} + a \ln x+\sqrt{x^2+a}) + C$

Maclaurinutvecklingar

e^x	=	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	=	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$	=	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$
$\cos x$	=	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	=	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$
$(1+x)^\alpha$	=	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	=	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots$, $ x < 1$, $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k(k-1)\dots 1}$
$\ln(1+x)$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$	=	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$, $-1 < x \leq 1$
$\arctan x$	=	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}$	=	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$, $ x \leq 1$

Övrigt

Masscentrum (x_T, y_T, z_T) för Ω ges av $x_T = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dxdydz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dxdydz}$, analogt för y_T, z_T . $\rho(x, y, z)$ är densiteten.

Anonym kod	MVE085 Flervariabelanalys V2 2010-09-18	sid.nummer	Poäng
------------	---	------------	-------

Godkäntdelen: del 1

1. Till nedanstående deluppgifter skall korta lösningar redovisas, samt svar anges, på anvisad plats (endast lösningar och svar på detta blad, och på anvisad plats, beaktas).

- (a) Ange en parametrisering, på formen $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, till cirkeln med radie ρ centrerad i origo. (2p)

Lösning:

Svar:

- (b) Beräkna de partiella derivatorna till funktionen $f(x, y, z) = xy^2 \sin z$. (3p)

Lösning:

Svar:

- (c) Ange ekvation för tangentlinjen till nivåkurvan $f(x, y) = 0$, där $f(x, y) = 4x^2 - 16x + y^2 + 12$, i punkten $(6/5, 6/5)$. (3p)

Lösning:

Svar:

Till följande uppgift skall fullständig lösning redovisas på separat skrivpapper.
Motivera och förklara så väl du kan.

2. Låt $f(x, y) = xy^2 - 4x$. (6p)

- (a) Bestäm de kritiska punkterna till f och avgör om de är lokala minima, lokala maxima eller sadelpunkter.

- (b) Vad är största och minsta värdet av f på triangeln som begränsas av linjerna $y = 0$, $x + y = 3$ och $y - x = 3$?