

MVE275 Linjär algebra AT

Lösningarna skall presenteras på ett sådant sätt att räkningar och resonemang blir lätt att följa. Motivera dina svar.
 För godkänt på tentan krävs 25 poäng på tentamens första del (godkäntdelen). Bonuspoäng från 2017 räknas med, men maximal poäng på denna del är 32. För betyg 4 eller 5 krävs 33 poäng totalt varav minst 4 på överbetygsdelen, och för betyg 5 krävs 42 poäng totalt varav minst 6 på överbetygsdelen.

Examinator: Orsola Tommasi

Del 1: Godkäntdelen

1. Denna uppgift finns på separat blad på vilket lösningar och svar skall skrivas. Detta blad inlämnas tillsammans med övriga lösningar. (14p)

2. Låt

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 2 & 8 \\ 2 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4-t & 6 \end{bmatrix}$$

(1p)

- (a) Definiera vad som menas med kolonrummet till en matris. (1p)
 (b) Vad ska t ha för värde för att $\text{rank } A < 4$? (2p)
 (c) För detta värde på t , bestäm baser för kolonrummet och nollrummet till A . (3p)

3. Låt M vara matrisen

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

(2p)

- (a) Egenvärdarna till M är -2 och 4 . Bestäm alla egenvektorer till M . (1p)
 (b) Vad menas med en ortogonalt diagonalisering? (1p)
 (c) Är M ortogonalt diagonalisbar? I så fall, diagonalisera M ortogonalt. (3p)

4. Låt $a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ och $d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(3p)

- (a) En linjär avbildning T avbildar punkterna a , b , c och d till punkterna $[0 \ 0 \ 0]^T$, $[-5 \ -2 \ -4]^T$, $[2 \ 1 \ 2]^T$ och $[0 \ 0 \ 1]^T$ (i den ordningen). Hitta T :s standardmatris. (2p)
 (b) Punkterna a , b , c och d spänner tillsammans upp en parallelepiped. Hur många gånger större eller mindre blir parallelepeds volym när T verkar på den? (1p)
 (c) En annan avbildning avbildar a , b , c och d på dessa punkter istället: $[1 \ 0 \ 0]^T$, $[2 \ 1 \ 0]^T$, $[1 \ -1 \ 1]^T$ och $[3 \ 0 \ 0]^T$. Är avbildningen linjär? (1p)

Del 2: Överbetygssdelen

Poäng på dessa uppgifter kan inte räknas in för att nå godkäntgränsen. Normalt krävs för poäng på uppgift att man redovisat en fullständig lösningsgång, som i princip lett, eller åtminstone skulle kunnat leda, till målet.

5. (a) Låt V vara vektorrummet av alla funktioner $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ och U vara mängden av alla elementer i V som uppfyller $f(0) + f(1) = 0$. Visa att U är ett underrum av V . (3p)
- (b) Lös systemet av differentialekvationer
- $$\begin{aligned}x'_1(t) &= -4x_1(t) - 9x_2(t) \\x'_2(t) &= 3x_1(t) + 8x_2(t)\end{aligned}$$
- där $x_1(0) = -5$ och $x_2(0) = 3$. (3p)
6. Avgör vilka av följande påståenden som är sanna respektive falska. Alla svaren måste motiveras, rätt svar utan motivering belönas ej. Du får citera satser från boken i ditt resonemang. Om du hävdar att ett påstående är FALSKT så måste du även illustrera varför med ett exempel som motsäger påståendet.
- (a) Om A och B är $n \times n$ -matriser, så är $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. (2p)
- (b) Alla diagonaliseringbara matriser är inverterbara. (2p)
- (c) Det finns ingen 3×5 -matris A sådan att $\dim(\text{Nul } A) = \text{rank } A$. (2p)
7. (a) Bevisa att mängden av vektorer $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ i \mathbb{R}^n är linjärt beroende om $p > n$. (3p)
- (b) Om A är en inverterbar matris, bevisa att $(A^{-1})^{-1} = A$ och $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. (3p)

7(a): se Sats 1.9 i boken

Lycka till!
Orsola Tommasi

7(b): se Sats 2.6 i boken.

1. Till nedanstående uppgifter skall korta lösningar redovisas, samt svar anges, på anvisad plats (endast lösningar och svar på detta blad, och på anvisad plats, beaktas).

(a) Är vektorerna $u = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ och $w = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ linjärt beroende eller oberoende? (2p)

Lösning:

Vi vill veta om $c_1 u + c_2 v + c_3 w = \emptyset$ har en icke-trivial lösning.

Systemets koefficientmatris:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 - R_3 \\ R_2 \mapsto R_2 + 3R_3}} \left[\begin{array}{ccc} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 + R_3 \\ R_2 \mapsto R_2 - R_3}} \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

c_3 fri variabel
 c_3 finns
icke-triv.
lösningar

Svar: u, v, w är linjärt beroende..... (3p)

- (b) Beräkna inversen till matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Lösning:

$$[A | I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 - R_3 \\ R_2 \mapsto R_2 - 5R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 - 2R_3 \\ R_2 \mapsto R_2 - 5R_3}} [I | A^{-1}]$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \end{array} \right] = [I | A^{-1}]$$

Svar: $A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \end{array} \right]$

- (c) Låt

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 6 & 0 & -6 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

För vilka högerled b har systemet $Ax = b$ unik, inga, respektive oändligt många lösningar? (2p)

Lösning:

Gauß-eliminering.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & -3 & b_1 \\ 6 & 0 & -6 & b_2 \\ 2 & 1 & -1 & b_3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 - 2R_3 \\ R_2 \mapsto R_2 - 3R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -1 & b_1 - 2b_3 \\ 0 & -3 & -3 & b_2 - 3b_3 \\ 2 & 1 & -1 & b_3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \mapsto R_1 - R_2 \\ R_2 \mapsto R_2 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & b_3 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - 3b_1 + 3b_3 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 - 3b_1 + 3b_3 \end{array} \right]$$

lösbart om och endast om
 $b_2 - 3b_1 + 3b_3 = 0$
i så fall: x_3 är fri var

Svar: Om $b_2 - 3b_1 + 3b_3 \neq 0$ har systemet inga lösningar;

för $b_2 - 3b_1 + 3b_3 = 0$ finns det oändligt många lösningar.

Lösningen är aldrig unik.

Var god vänd!

- (d) En 2×2 -matrix A har egenvärdena -2 och -1 med egenvektorer $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ respektive $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Bestäm A . (3p)

Lösning:

A är diagonalisierbar: $A = PDP^{-1}$ där $D = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

$$\text{och } P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$P^{-1} = \frac{1}{3 \cdot 2 - 5 \cdot 1} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -10 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

Svar: $A = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$

- (e) Bestäm koordinaterna för vektorn $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ i basen $b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ och $b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. (2p)

Lösning:

Vi vill hitta c_1 och c_2 så att $c_1 b_1 + c_2 b_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Svar: Koordinaterna är $c_1 = -3$ och $c_2 = \frac{1}{2}$.

- (f) Ge ett exempel på en 2×2 -matris A som är ortogonal, dvs $A^T A = I$. Matrisen ska inte vara diagonal. (2p)

Lösning:

$A = [\alpha_1 \ \alpha_2]$ där $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ är en ON-bas till \mathbb{R}^2 .

T. ex. $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ger $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ som är en ON-matris.

Svar: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(2)

(a) Kolonrummet till en matris A är mängden av alla linjärkombinationen av A :s kolonner.

Ov: för $A = [a_1 \dots a_n]$ är kolonrummet

$$\text{Col } A = \text{Span}\{a_1, \dots, a_n\}$$

(b) rank A definieras som $\dim(\text{Col } A)$.

Gauß-eliminering:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 2 & 8 \\ 2 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4-t & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} R_1 \leftrightarrow R_1 - 2R_3 \\ R_2 \leftrightarrow R_2 - 2R_3 \\ R_4 \leftrightarrow R_4 - 3R_3 \end{array}} \begin{bmatrix} 0 & 8 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 4-t & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-t & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 \leftrightarrow R_3 - 2R_2 \\ R_4 \leftrightarrow R_4 - R_2 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3-t & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3-t & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 3-t=0 \\ \uparrow \\ t=3 \end{array}$$

Om $-t \neq 3$: rank $A = 4$

Om $t = 3$: rank $A = 3 < 4$ eftersom

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]_{x_3}$$

är en trappstegsform för A .

(c) Kol. 1, 2, 4 är pivotkolonner, så

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \right\} \text{ är en bas till Col } A.$$

Raderad. trappstegsformen för A är

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

\Rightarrow allmän lösning till $Ax = 0$ är

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{4}x_3 &= 0 \\ x_2 + \frac{1}{4}x_3 &= 0 \\ \vdots &= 0 \end{aligned}$$

$x = x_3 \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ så $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ bildar en bas för Nul A .

(3)

(a) Egenvektorer till $\lambda_1 = -2$ är lösningar, $x \neq 0$
till $Mx = -2x$, dvs $(M+2I)x = 0$

$$M+2I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2, x_3 \text{ fri} \end{array}$$

$$x = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Så: $v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ spänner upp egenrummet
till $\lambda_1 = -2$

Egenvektorer till $\lambda_2 = 4$:

$$M-4I = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 6 \\ 0 & 3 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_3 \text{ fri} \end{array}$$

$x = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ alla egenvektorer till $\lambda_2 = 4$ är
multipla av $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(b) M är ortogonalt diagonalisbar om
 $M = PDP^T$ där D är diagonal och P är
en ON-matris.

(c) M är ortogonalt diagonalisbar eftersom
A är symmetrisk (dvs $A = A^T$).

Kolumnerna av P måste bilda en ON-bas
av egenvektorer till M

$\lambda_1 = -2$: GS-processen: $\theta_1 = v_1$

$$v_1 \cdot v_1 = 4 + 1 = 5, \quad v_1 \cdot v_2 = 2 + 0 + 0 = 2$$

$$\theta_2 = v_2 - \frac{\theta_1 \cdot \theta_1}{\theta_1 \cdot v_2} \theta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{5} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 \\ -2/5 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Längd: $1 + 4 + 25 = 30$

$$\lambda_2 = 4 \quad \theta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |\theta_3| = \sqrt{1+4+1} = 6$$

Alltså: $M = PDP^T$ där

$$P = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{30} & 2/\sqrt{6} \\ 0 & 5/\sqrt{30} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

④

(a) Standardmatrisen är $[T(\epsilon_1) \ T(\epsilon_2) \ T(\epsilon_3)]$

$$\epsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix} = d + 2c \Rightarrow T(\epsilon_1) = T(d) + 2T(c) = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_2 &= b + \epsilon_1 = b + 2c + d \Rightarrow T(\epsilon_2) = T(b) + 2T(c) + T(d) = \\ &= \begin{bmatrix} -5 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\epsilon_3 = 2c \Rightarrow T(\epsilon_3) = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Standardmatrisen är $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix}$.

(b) Volumen blir multiplicerad med $|\det A|$.

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -(-1) \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 0 - (+1) \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = \\ &\quad \begin{array}{c} + \boxed{-} \\ \hline + \boxed{+} \\ + \boxed{+} \end{array} \\ &= (2 \cdot 4 - 5 \cdot 2) - 0 = -2 \end{aligned}$$

Dvs volymen blir 2 gånger större.

(c) Avbildningen kan inte vara linjär eftersom $a = \emptyset$ avbildas i $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \emptyset$.

(5)

- (a) Vi vill visa att U uppfyller de tre villkor för att vara ett underrum.
- (i) $\Phi \in U$ eftersom nollfunktionen $\Phi(t) = 0$ uppfyller $\Phi(0) + \Phi(1) = 0 + 0 = 0$.
- (ii) om φ_1, φ_2 ligger i U , så uppfyller $\varphi_1 + \varphi_2$
- $$(\varphi_1 + \varphi_2)(0) + (\varphi_1 + \varphi_2)(1) = \varphi_1(0) + \varphi_2(0) + \varphi_1(1) + \varphi_2(1)$$
- $$= \underbrace{\varphi_1(0) + \varphi_1(1)}_{\substack{\\ \text{O} \\ (\varphi_1 \in U)}} + \underbrace{\varphi_2(0) + \varphi_2(1)}_{\substack{\\ \text{O} \\ (\varphi_2 \in U)}} = 0$$
- Alltså ligger $\varphi_1 + \varphi_2$ i U .

- (iii) om $\varphi \in U$ och $c \in \mathbb{R}$, så gäller
- $$(c\varphi)(0) + (c\varphi)(1) = c\varphi(0) + c\varphi(1) = c(\underbrace{\varphi(0) + \varphi(1)}_{\substack{\\ \text{O} \\ (\varphi \in U)}})$$
- $$= c \cdot 0 = 0$$
- Alltså ligger $c\varphi$ i U .

Härmad är U ett underrum.

- (b) Systemet kan skrivas som $\dot{x} = Ax$
där $x = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$ och $A = \begin{bmatrix} -4 & -9 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$

Egenvärden till A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4-\lambda & -9 \\ 3 & 8-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda+1)(\lambda-5)$$

Så: $\lambda_1 = -1$ och $\lambda_2 = 5$ är egenvärdena.

Eigenvektorer:

$$\lambda_1 = -1 \\ A + I = \begin{bmatrix} -3 & -9 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad v_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ är en egenvektor}$$

$$\lambda_2 = 5: \\ A - 5I = \begin{bmatrix} -9 & -9 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ är en egenvektor.}$$

Allmän lösning till systemet är

$$x(t) = c_1 e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{5t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} -3c_1 - c_2 \\ c_1 + c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ på grund av begynnelsevillkoret}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & 14 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad c_1 = 1 \\ c_2 = 2$$

ellertså: lösningen är

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} + 2e^{5t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3e^{-t} - 2e^{5t} \\ e^{-t} + 2e^{5t} \end{bmatrix}.$$

6 (a) falskt

$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + BA + AB + B^2$ som är bara lika med $A^2 + 2AB + B^2$ om $AB = BA$.

Men $AB \neq BA$ för den mesta A, B

$$(t. ex. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix})$$

(b) Falskt. t.ex. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ är diagonalisierbar men inte inverterbar.

(c) Enligt Sats 2.14 gäller: $\text{rank } A + \dim \text{Nul } A = 5$ (= antalet av kolonner). Da $5 \neq 2 \text{rank } A$ kan $\text{rank}(A)$ och $\dim(\text{Nul } A)$ inte vara lika med varandra SAMT