

Tentamen
MVE301 Sannolikhet, statistik och risk

2017-10-06 kl. 8:30 - 13:30

Examinator: Johan Jonasson, Matematiska vetenskaper, Chalmers

Telefonvakt: Fanny Berglund, telefon: 031-7725325

Hjälpmaterial: Valfri miniräknare. Två blad (dvs fyra sidor) handskrivna anteckningar. Tabeller finns längst bak på tentamenstesen.

Denna tentamen utgör grunden för betygssättning. För betyg 3 krävs minst 18 poäng, för betyg 4 minst 27 poäng och för betyg 5 minst 36 poäng.

1. Slå två tärningar och låt X och Y vara de respektive poängen. Låt $Z = 2^{X-1} + Y$. Beräkna
 - (a) (2p) $\mathbb{P}(Z = 7)$,
 - (b) (2p) $\mathbb{E}[Z]$,
 - (c) (2p) $\text{Var}[Z]$.
2. (6p) Betrakta den vanliga linjära regressionsmodellen, dvs $(x_1, Y_1), \dots, (x_n, Y_n)$ är sådana att
$$Y_k = a + bx_k + \epsilon_k$$
där ϵ_k :na är oberoende och normalfördelade med väntevärde 0 och varians σ^2 och a , b och σ^2 är okända parametrar. Antag nu att man observerat data $(0, 1)$, $(2, 4)$ och $(3, 5)$ och $(5, y)$. Skattningen av b blev $\hat{b} = 2$. Ange värdet på y . Skatta också a och ge ett 95% konfidensintervall för b .

3. (6p) En stokastisk variabel X har täthetsfunktionen

$$f_\theta(x) = \frac{C(\theta)}{1+x}, \quad 0 < x < \theta$$

för en parameter $\theta > 0$. Bestäm $C(\theta)$ och bestäm fördelningsfunktionen för X .

Låt sedan X_1, X_2, \dots, X_n vara ett stickprov där X_k :na har samma fördelning som X och ge en ML-skattning av θ .

4. Betrakta ett mynt som vid slantsingling ger klave med den okända sannolikheten p . För att testa nollhypotesen att $p = 1/2$ mot alternativhypotesen att $p > 1/2$ singlas myntet 12 gånger.
 - (a) (2p) Hur många klave behöver man få för att förkasta nollhypotesen på 5% signifikansnivå?
 - (b) (2p) Om det korrekta värdet på p är $3/4$, vad är sannolikheten att nollhypotesen kommer att förkastas på 5% signifikansnivå?
 - (c) (2p) En Bayesiansk modell: om två mynt är sådana att mynt 1 ger klave med sannolikhet $1/2$ och mynt 2 ger klave med sannolikhet $3/4$, man väljer slumpmässigt ett av mynten på så sätt att mynt 1 väljs med sannolikhet 0.95 och sedan singlar det valda myntet 12 gånger, hur många klave behöver man då få för att den betingade sannolikheten att mynt 2 valdes ska överstiga $1/2$?

5. (5p) Låt X_1 och X_2 vara två oberoende normalfördelade stokastiska variabler, båda med väntevärde 0 och varians σ^2 . Det gäller att $\mathbb{P}(X_1 > 1) = 0.1$. Vad är σ^2 ?

Om det vidare gäller att korrelationskoefficienten $\rho(X_1, X_2) = 1/4$, vad är variansen av medelvärdet $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$ och vad är $\mathbb{P}(\bar{X} > 1)$?

6. (5p) Låt X_1, X_2, \dots vara oberoende och exponentialfördelade stokastiska variabler med parameter λ . Låt Y_1, Y_2, \dots ges av att $Y_n = I_{\{X_n > \ln n\}}$ och låt $Y = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n$. Visa att $\mathbb{E}[Y] = \infty$ om och endast om $\lambda \leq 1$.

7. (a) (2p) Låt först den stokastiska variabeln Θ vara $\beta(1, 3)$ -fördelad och singla sedan slantio gånger med ett mynt som ger klave med sannolikhet Θ . Vad är åposteriorifördelningen för Θ givet att det blev klave tre gånger?

- (b) (4p) Skapa två mynt, mynt 1 och 2, genom att låta sannolikheterna för klave för de båda mynten, Θ_1 och Θ_2 , ha apriorifördelningarna $\beta(1, 3)$ respektive $\beta(4, 1)$. Välj sedan ett av mynten på måfå och kasta det valda myntet två gånger. Vad är sannolikheten att mynt 1 valdes givet att båda kasten resulterade i klave? Vad är det betingade väntevärdet av Θ_1 givet att båda kasten resulterade i klave?

8. (5p) Antag att X har den momentgenererande funktionen

$$M(t) = \frac{1}{6}e^{2t} + \frac{1}{3}e^t + \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-2t}.$$

Vad är sannolikhetsfördelningen för X ?

Lycka till!
Johan Jonasson

Tabell 1: Values of the cdf $\Phi(x)$ of the standard normal distribution [e.g., $\Phi(1.41) = 0.921$]

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.500	.504	.508	.512	.516	.520	.524	.528	.532	.536
0.1	.540	.544	.548	.552	.556	.560	.564	.568	.571	.575
0.2	.579	.583	.587	.591	.595	.599	.603	.606	.610	.614
0.3	.618	.622	.626	.629	.633	.637	.641	.644	.648	.652
0.4	.655	.659	.663	.666	.670	.674	.677	.681	.684	.688
0.5	.692	.695	.698	.702	.705	.709	.712	.716	.719	.722
0.6	.726	.729	.732	.736	.739	.742	.745	.749	.752	.755
0.7	.758	.761	.764	.767	.770	.773	.776	.779	.782	.785
0.8	.788	.791	.794	.797	.800	.802	.805	.808	.811	.813
0.9	.816	.819	.821	.824	.826	.829	.832	.834	.836	.839
1.0	.841	.844	.846	.848	.851	.853	.855	.858	.860	.862
1.1	.864	.867	.869	.871	.873	.875	.877	.879	.881	.883
1.2	.885	.887	.889	.891	.892	.894	.896	.898	.900	.902
1.3	.903	.905	.907	.908	.910	.912	.913	.915	.916	.918
1.4	.919	.921	.922	.924	.925	.926	.928	.929	.931	.932
1.5	.933	.934	.936	.937	.938	.939	.941	.942	.943	.944
1.6	.945	.946	.947	.948	.950	.951	.952	.952	.9545	.954
1.7	.955	.956	.957	.958	.959	.960	.961	.962	.962	.963
1.8	.964	.965	.966	.966	.967	.968	.969	.969	.970	.971
1.9	.971	.972	.973	.973	.974	.974	.975	.976	.976	.977
2.0	.977	.978	.978	.979	.979	.980	.980	.981	.981	.982
2.1	.982	.983	.983	.983	.984	.984	.985	.985	.985	.986
2.2	.986	.986	.987	.987	.988	.988	.988	.988	.989	.989
2.3	.989	.990	.990	.990	.990	.991	.991	.991	.991	.992
2.4	.992	.992	.992	.992	.993	.993	.993	.993	.993	.994
2.5	.994	.994	.994	.994	.995	.995	.995	.995	.995	.995
2.6	.995	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996	.996
2.7	.996	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997	.997
2.8	.997	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998
2.9	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.998	.999	.999	.999

Tabell 2: Values of $\Phi(x)$ commonly used in confidence intervals and tests, and the corresponding x values

$\Phi(x)$	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
x	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58

Tabell 3: Percentiles of the t distribution with DF degrees of freedom [e.g., $F_{t_7}(1.89) = 0.95$]

DF	0.95	0.975	0.99	0.995	DF	0.95	0.975	0.99	0.995
1	6.31	12.71	31.82	63.66	16	1.75	2.12	2.58	2.92
2	2.92	4.30	6.96	9.92	17	1.74	2.11	2.58	2.90
3	2.35	3.18	4.54	5.84	18	1.73	2.10	2.55	2.88
4	2.13	2.78	3.74	4.60	19	1.73	2.09	2.54	2.86
5	2.02	2.57	3.36	4.03	20	1.72	2.09	2.53	2.85
6	1.94	2.45	3.14	3.71	21	1.72	2.08	2.52	2.83
7	1.89	2.36	3.00	3.50	22	1.72	2.07	2.51	2.82
8	1.86	2.31	2.90	3.36	23	1.71	2.07	2.50	2.81
9	1.83	2.26	2.82	3.25	24	1.71	2.06	2.49	2.80
10	1.81	2.23	2.76	3.17	25	1.71	2.06	2.49	2.79
11	1.80	2.20	2.72	3.11	26	1.71	2.06	2.48	2.78
12	1.78	2.18	2.68	3.05	27	1.70	2.05	2.47	2.77
13	1.77	2.16	2.65	3.01	28	1.70	2.05	2.47	2.76
14	1.76	2.14	2.62	2.98	29	1.70	2.05	2.46	2.76
15	1.75	2.13	2.60	2.95	30	1.70	2.04	2.46	2.75

Tabell 4: Percentiles of the chi-square distribution with DF degrees of freedom [e.g., $F_{\chi^2_{20}}(10.85) = 0.05$]

DF	0.025	0.05	0.95	0.975	DF	0.025	0.05	0.95	0.975
1	0.001	0.004	3.84	5.02	16	6.91	7.96	26.30	28.84
2	0.05	0.10	5.99	7.38	17	7.56	8.67	27.59	30.19
3	0.22	0.35	7.82	9.34	18	8.23	9.39	28.87	31.53
4	0.48	0.71	9.49	11.14	19	8.91	10.12	30.14	32.85
5	0.83	1.14	11.07	12.83	20	9.59	10.85	31.41	34.17
6	1.24	1.64	12.59	14.45	21	10.28	11.60	32.67	35.48
7	1.69	2.17	14.07	16.01	22	10.98	12.34	33.92	36.78
8	2.18	2.73	15.51	17.54	23	11.69	13.09	35.17	38.08
9	2.70	3.32	19.92	19.02	24	12.40	13.85	36.42	39.36
10	3.25	3.94	18.31	20.48	25	13.12	14.61	37.65	40.65
11	3.82	4.58	19.68	21.92	26	13.84	15.38	38.88	41.92
12	4.40	5.23	21.03	23.34	27	14.57	16.15	40.11	43.19
13	5.01	5.89	22.36	27.74	28	15.31	16.93	41.34	44.46
14	5.63	6.57	23.68	26.12	29	16.05	17.71	42.56	45.72
15	6.26	7.26	25.00	27.49	30	16.79	18.49	43.77	46.98

Tabell 5: Percentiles of the F distribution with r and s degrees of freedom [e.g., $F_{F_{8,20}}(2.45) = 0.95$]

s	2.5 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	0.026	0.062	0.094	0.119	0.138	0.153	0.165	0.175	0.183	
3	0.026	0.065	0.100	0.129	0.152	0.170	0.185	0.197	0.207	
4	0.025	0.066	0.104	0.135	0.161	0.181	0.198	0.212	0.224	
5	0.025	0.067	0.107	0.140	0.167	0.189	0.208	0.223	0.236	
6	0.025	0.068	0.109	0.143	0.172	0.195	0.215	0.231	0.246	
7	0.025	0.068	0.110	0.146	0.176	0.200	0.221	0.238	0.253	
8	0.025	0.069	0.111	0.148	0.179	0.204	0.226	0.244	0.259	
9	0.025	0.069	0.112	0.150	0.181	0.207	0.230	0.248	0.265	
10	0.025	0.069	0.113	0.151	0.183	0.210	0.233	0.252	0.269	
12	0.025	0.070	0.114	0.153	0.186	0.214	0.238	0.259	0.276	
15	0.025	0.070	0.116	0.156	0.190	0.219	0.244	0.265	0.284	
16	0.025	0.070	0.116	0.156	0.191	0.220	0.245	0.267	0.286	
18	0.025	0.070	0.116	0.157	0.192	0.222	0.248	0.270	0.290	
20	0.025	0.071	0.117	0.158	0.193	0.224	0.250	0.273	0.293	
21	0.025	0.071	0.117	0.158	0.194	0.225	0.251	0.274	0.294	
24	0.025	0.071	0.117	0.159	0.195	0.227	0.253	0.277	0.297	
25	0.025	0.071	0.118	0.160	0.196	0.227	0.254	0.278	0.298	
27	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.255	0.279	0.300	
28	0.025	0.071	0.118	0.160	0.197	0.228	0.256	0.280	0.301	
30	0.025	0.071	0.118	0.161	0.197	0.229	0.257	0.281	0.302	

s	95 % percentile									
	$r = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	
3	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	
4	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	
5	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	
6	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	
7	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	
8	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	
9	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	
10	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	
12	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	
15	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	
16	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	
18	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	
20	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	
21	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	
24	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	
25	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	
27	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	
28	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	
30	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	

s	97.5 % percentile									
	r = 2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	
3	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	
4	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	
5	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	
6	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	
7	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	
8	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	
9	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	
10	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	
12	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	
15	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	
16	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	
18	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	
20	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	
21	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	
24	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	
25	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	
27	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	
28	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	
30	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	

Tabell 6: Critical values c for the Wilcoxon signed rank test, where n is the sample size and $C = n(n + 1) - c$ [e.g., if $n = 20$, then $P(W \leq 61) = P(W \geq 149) \approx 0.05$]

n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$	n	0.025	0.05	$n(n + 1)/2$
5	0	1	15	18	41	48	171
6	1	3	21	19	47	54	190
7	3	4	28	20	53	61	210
8	4	6	36	21	59	68	231
9	6	9	45	22	67	76	253
10	9	11	55	23	74	84	276
11	11	14	66	24	82	92	300
12	14	18	78	25	90	101	325
13	18	22	91	26	99	111	351
14	22	26	105	27	108	120	378
15	26	31	120	28	117	131	406
16	30	36	136	29	127	141	435
17	35	42	153	30	138	152	465

Tabell 7: Critical values c for the Wilcoxon rank sum test, where m is the size of the smaller sample, and $C = m(m + n + 1) - c$ [e.g., if $m = 4$ and $n = 8$, then $P(W \leq 16) = P(W \geq 36) \approx 0.05$]

n	$P(W \leq c)$	$m = 2$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0.025	3									
	0.05	3									
3	0.025	3	3								
	0.05	6	7								
4	0.025	3	6	11							
	0.05	3	7	12							
5	0.025	3	7	12	18						
	0.05	4	8	13	20						
6	0.025	3	8	13	19	27					
	0.05	4	9	14	21	29					
7	0.025	3	8	14	21	28	37				
	0.05	4	9	15	22	30	40				
8	0.025	4	9	15	22	30	39	50			
	0.05	5	10	16	24	32	42	52			
9	0.025	4	9	15	23	32	41	52	63		
	0.05	5	11	17	25	34	44	55	67		
10	0.025	4	10	16	24	33	43	54	66	79	
	0.05	5	11	18	27	36	46	57	70	83	
11	0.025	5	10	17	25	35	45	56	69	82	97
	0.05	5	12	19	28	38	48	60	73	87	101