

Föreläsning 4: Kontinuerliga fördelningar

Matematisk statistik

David Bolin
Chalmers University of Technology
Mars 27, 2014



Slumpvariabler

Ofta vill vi beskriva utfallet av ett slumpmässigt försök som ett numeriskt värde och man kan då beskriva försöket med en slumpvariabel

Slumpvariabel

En stokastisk variabel (slumpvariabel) X är en funktion som tar element från Ω som argument och som returnerar ett reellt tal.

Vi kommer beteckna slumpvariabler med stora bokstäver, ofta X , Y och Z .

Diskreta slumpvariabler

En diskret slumpvariabel kan endast anta ett ändligt eller uppräknligt antal värden, i allmänhet någon delmängd av heltalen.

Sannolikhetsfunktionen

Sannolikhetsfunktion

Till en diskret stokastisk variabel X definierar vi sannolikhetsfunktionen $p(k)$ genom $p(k) = P(X = k)$.

Alla funktioner är inte sannolikhetsfunktioner. Eftersom de beskriver sannolikheter måste vi ha att

- $p(k) \geq 0$ för alla k .
- $\sum_{k=-\infty}^{\infty} p(k) = 1$.

Dessa två villkor är både nödvändiga och tillräckliga för att en funktion $p(k)$ ska vara en sannolikhetsfunktion. Genom att använda Kolmogorovs axiomsystem kan vi också visa att

$$P(m \leq X \leq n) = \sum_{k=m}^n p(k)$$

om m och n är heltal.

Fördelningsfunktioner

Fördelningsfunktioner

Låt X vara en diskret slumpvariabel. Dess fördelningsfunktion ges då av

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p_X(k),$$

För $F(x)$ gäller att

- $F(x)$ är växande.
- $F(x) \rightarrow 1$ då $x \rightarrow \infty$.
- $F(x) \rightarrow 0$ då $x \rightarrow -\infty$.

Fördelningsfunktionens värden är vad som brukar anges i tabeller av fördelningar, och den har några användbara egenskaper:

- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X > a) = 1 - F(a)$.
- För diskreta slumpvariabler gäller $p(m) = F(m) - F(m-1)$.

Bernoullifördelningen

Antag att vi gör ett försök som har sannolikhet p att lyckas och sätter

$$X = \begin{cases} 1, & \text{om försöket lyckas} \\ 0, & \text{om försöket misslyckas.} \end{cases}$$

Vi har då $p(1) = p$ och $p(0) = 1 - p$. Lite mer kompakt kan vi skriva fördelningen som $p(k) = p^k(1 - p)^{1-k}$.

Bernoullifördelningen

En stokastisk variabel X sägs vara Bernoullifördelad om den har sannolikhetsfunktion $p(k) = p^k(1 - p)^{1-k}$, $k=0,1$. Vi betecknar den som $\text{Be}(p)$.

Binomialfördelningen

Binomialfördelningen, förkortad $\text{Bin}(n, p)$, är en fördelning som beskriver antalet lyckade försök av totalt n stycken Bernoulli-försök.

Binomialfördelningen





En stokastisk variabel X sägs vara binomialfördelad, $\text{Bin}(n, p)$, om den har sannolikhetsfunktion

$$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (1)$$

där

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (2)$$

och $k! = k \cdot (k-1) \cdots 2 \cdot 1$.



Binomialfördelningen

$\text{Bin}(n, p)$ -fördelningen kan ses som summan av n $\text{Be}(p)$ variabler. Vidare inses då att $\text{Bin}(1, p)$ -fördelningen är den samma som $\text{Be}(p)$ -fördelningen och lite mer generellt kan vi skriva upp följande sats.

Sats

Om X_1 är $\text{Bin}(n_1, p)$ och X_2 är $\text{Bin}(n_2, p)$ samt att X_1 och X_2 är oberoende gäller att $X_1 + X_2$ är $\text{Bin}(n_1 + n_2, p)$ -fördelad.

Den geometriska fördelningen



Den geometriska fördelningen beskriver antalet försök fram till det första lyckade i en serie av Bernoulli-försök.

Geometrisk fördelningen

Slumpvariabeln X är geometriskt fördelad med parameter p om den har sannolikhetsfunktion

$$p_X(k) = (1 - p)^{k-1}p.$$

Att fördelningen ser ut som den gör inses enkelt eftersom vi för att få $X = k$ först måste få $k - 1$ misslyckade försök, som har sannolikhet $1 - p$, och sedan ett lyckat försök.



Poissonfördelningen

Poissonfördelningen är döpt efter Simeon Denis Poisson (1781-1840). Den används ofta för att beskriva fördelningen av antalet händelser av något slag som inträffar under ett tidsintervall, på en yta, eller i en volym.

Några exempel där denna fördelning passar bra är

- Räkna antalet radioaktiva partiklar som emitteras under en minut från ett radioaktivt material.
- Registrera antalet inkommande telefonsamtal till en telefonväxel under en timme.

Poissonfördelningen

Poissonfördelningen





En slumpvariabel X sägs vara Poissonfördelad med parameter μ om den har sannolikhetsfunktion

$$p(k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}$$

Vi använder ofta beteckningen $\text{Po}(\mu)$ för denna fördelning.

Summering av Poissonvariabler

Vi har vi att om X_1 är $\text{Po}(\mu_1)$ och X_2 är $\text{Po}(\mu_2)$ så gäller att $X_1 + X_2$ är $\text{Po}(\mu_1 + \mu_2)$.



Poissonfördelningen som gränsfördelning

Konceptuellt kan fördelningen ses som en gränsfördelning till binomialfördelningen om vi låter n gå mot oändligheten och p gå mot noll. Mer specifikt har vi

Sats

Då $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, och $np \rightarrow \mu$ så gäller för ett fixt heltal $k \geq 0$ att

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!} \quad (3)$$

I exemplen ovan kan vi tolka den här satsen som

- Det finns ett stort antal atomer (n) i materialet och sannolikheten (p) att en specifik atom ska emittera en partikel under just den tidsperioden är mycket liten.
- Ett stort antal personer kan, oberoende av varandra, ringa växeln, men för en specifik person är sannolikheten att denne ska ringa växeln mycket liten.