

## Modell

Vi har två oberoende stickprov.

Det ena består av  $n_1$  observationer från  $N(\mu_1, \sigma_1)$ -fördelningen. Dess medelvärde och varians är  $\bar{X}_1$  och  $S_1^2$ .

Det andra av  $n_2$  observationer från  $N(\mu_2, \sigma_2)$ -fördelningen. Dess medelvärde och varians är  $\bar{X}_2$  och  $S_2^2$ .

## Sats 10.1.1

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2})$$

Definition 10.2.1:  $F$ -fördelningen

Låt för  $i = 1, 2$ ,  $X_i^2$  vara oberoende  $\chi^2(\gamma_i)$ -variabler. Kvoten

$$\frac{X_1^2/\gamma_1}{X_2^2/\gamma_2}$$

är då  $F(\gamma_1, \gamma_2)$ -fördelad

## Sats 10.2.1

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

Test av  $H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$  mot  $H_1 : \sigma_1 > \sigma_2$  eller  $\sigma_1 \neq \sigma_2$

Under  $H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$  är teststatistikan  $S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

100(1 -  $\alpha$ )% confidence interval on  $\sigma_1/\sigma_2$

Utsagan

$$\frac{s_1/s_2}{\sqrt{f_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}}} \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq \frac{s_1/s_2}{\sqrt{f_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1}}}$$

har konfidensen 1 -  $\alpha$

## Exempel 10.2.2

Material A	Material B
$n_A = 25$	$n_B = 16$
$\bar{x}_A = 330$	$\bar{x}_B = 370$
$s_A^2 = 100$	$s_B^2 = 400$

Man önskar testa  $H_0 : \sigma_A = \sigma_B$  mot  $H_1 : \sigma_A \neq \sigma_B$

Teststatistikans värde är  $s_B^2/s_A^2 = 4$  (15 resp 24 frihetsgrader)

Ur tabell IX, sida 704-714, fås  $P(F_{15,24} > 2.108) = 0.05$

Vi kan alltså förkasta  $H_0 : \sigma_A = \sigma_B$  på nivån 10%

## Definition 10.3.1: Pooled variance

Då  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$  definierar vi

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

## Sats 10.3.1

The bounds for a 100(1 -  $\alpha$ )% confidence interval on  $\mu_1 - \mu_2$  are

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2, n_1+n_2-2} s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$$

provided  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$

 $T$  test statistic

1. Equal variances. The statistic

$$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

provided  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

2. Otherwise. The statistic

$$\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \approx t(\gamma)$$

provided  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ , where  $\gamma$  is called Smith-Satterthwaite Degrees of Freedom and is the integer part of

$$\frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

## Exempel 10.3.3

Material A	Material B
$n_1 = 10$	$n_2 = 16$
$\bar{x}_1 = 18\,900$	$\bar{x}_2 = 17\,500$
$s_1^2 = 1600$	$s_2^2 = 2500$

Man vill visa att  $\mu_1 > \mu_2$  och antager därför att  $\mu_1 = \mu_2$

Börja med  $s_2^2/s_1^2 = 2500/1600 = 1.5625$  (15 resp 9 frihetsgrader)

J.f.r med  $P(F_{15,9} > 2.340) = 0.10$

Det finns alltså ingen anledning att tro något annat än att  $\sigma_1 = \sigma_2$

Vi beräknar därför  $s_p^2 = \frac{9 \cdot 1600 + 15 \cdot 2500}{9 + 15} = 2162.5 = 46.50^2$

Teststatistikans utfall är  $\frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = 74.68$

Antalet frihetsgrader är  $\gamma = 9 + 16 = 24$

Ur tabell VI (sida 699-700) fås  $t_{0.01}(24) = 2.492$

$P$ -värdet är alltså  $< 0.01$

Slutsats:  $\mu_1 = \mu_2$  förkastas till förmån för  $\mu_1 > \mu_2$  på nivån 1%

## Exempel 10.4.1 (forts av ex 10.2.2)

Material A	Material B
$n_A = 25$	$n_B = 16$
$\bar{x}_A = 330$	$\bar{x}_B = 370$
$s_A^2 = 100$	$s_B^2 = 400$

Man vill visa att  $\mu_A > \mu_B$  och antager därför att  $\mu_A = \mu_B$

Det finns skäl att misstänka att  $\sigma_A \neq \sigma_B$  (j.f.r ex 10.2.2)

Teststatistikans utfall är  $\frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}} = 1.857$

Antal frihetsgrader fås ur  $\frac{(s_A^2/n_A + s_B^2/n_B)^2}{\frac{(s_A^2/n_A)^2}{n_A - 1} + \frac{(s_B^2/n_B)^2}{n_B - 1}} = 19.86$

Alltså,  $\gamma = 19$

Ur tabell fås  $t_{0.05}(19) = 1.729$ ,  $t_{0.025}(19) = 2.093$

$P$ -värdet är alltså  $< 0.05$ , men ej  $< 0.025$

Slutsats:  $\mu_A = \mu_B$  förkastas till förmån för  $\mu_A > \mu_B$  på nivån 5%

## Avsnitt 10.5: Parade data

Modell:  $X_i, Y_i$  för  $i = 1, \dots, n$  är oberoende N-fördelade och

$$E[X - Y] = \mu_d \text{ och } \text{Var}[X - Y] = \sigma_d^2$$

Beteckna med  $\bar{X}_d$  och  $S_d^2$  medelvärdet och variansen av differenserna  $X_i - Y_i$ ,  $i = 1, \dots, n$

Utsagan

$$\mu_d = \bar{x}_d \pm t_{\alpha/2, n-1} s_d / \sqrt{n}$$

har konfidensen  $1 - \alpha$

Under  $H_0 : \mu_d = 0$  är statistikan

$$\frac{\bar{X}_d}{S_d/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

## Exempel 10.5.1, 10.5.2

Program nr	Algorithm		Differens $x - y$
	gamla $x$	nya $y$	
1	8.05	0.71	7.34
2	24.74	0.74	24.00
3	28.33	0.74	27.59
⋮	⋮	⋮	⋮
10	8.54	0.72	7.82

Vi får  $\bar{x}_d = 14.409$  och  $s_d = 8.653$

Vi visar att  $\mu_d > 0$  genom att antaga att  $\mu_d = 0$  och jämföra utfallet av teststatistikan

$$\frac{\bar{x}_d}{s_d/\sqrt{n}} = 5.266$$

med  $t_{0.01,9} = 2.82$  ( $P$ -värdet är alltså  $< 1\%$ )